

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		嚔下障害	1
		呼吸困難	1
		電解質失調	1
		紅斑	1
		顔面浮腫	1
		胃癌	1
		胃腸出血	2
		消化管穿孔	1
		ヘマトクリット減少	2
		ヘモグロビン減少	2
		溶血性貧血	1
		頭痛	1
		聴覚障害	1
		肝機能異常	14
		B型肝炎	1
		ヘルペスウイルス感染	1
		带状疱疹	1
		高カリウム血症	1
		低γグロブリン血症	1
		低ナトリウム血症	1
		膿痂疹	1
		感染	1
		間質性肺疾患	2
		頭蓋内腫瘍出血	5
		白血球減少症	1
		気力低下	1
		肝障害	1
		肺障害	1
		リンパ球数減少	16
		リンパ球減少症	1
		メレナ	1
		無菌性髄膜炎	1
		多臓器不全	1
		骨髓異形成症候群	1
		悪心	4
		好中球減少症	3
		好中球数減少	22
		動悸	1
		急性肺炎	1
		汎血球減少症	4
		血小板数減少	39
		胸水	1
		肺炎	15
		嚔下性肺炎	8
		肺炎球菌性肺炎	1
		ブドウ球菌性肺炎	2
		総蛋白減少	3
		肺動脈血栓症	1
		肺塞栓症	3
		肺水腫	1
		肺結核	1
		腎盂腎炎	1
		発熱	5
		発疹	2
		紅斑性皮疹	1
		赤血球数減少	3
		腎不全	1
		急性腎不全	1
		呼吸不全	1
		敗血症	4
		敗血症性ショック	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		硬膜下血腫	1
		突然死	1
		自殺企図	1
		血小板減少症	3
		尿路感染	1
		心室細動	1
		嘔吐	5
		喘鳴	1
		白血球数減少	33
		白血球数増加	1
		脳浮腫	1
		全身健康状態低下	1
		嚔下不能	1
		深部静脈血栓症	2
		血中β-D-グルカン増加	1
		好中球百分率減少	1
		リンパ球百分率減少	3
		ブドウ球菌性敗血症	1
		胃腸粘膜障害	1
		中毒性皮疹	1
		肺の悪性新生物	1
		感染性腸炎	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	2