

ID	受理日	番号	報告者名	一般名	生物由来成分名	原材料名	原産国	含有区分	文献	症例	適正 使用 措置	感染症(PT)	出典	概要
												異型クローン フェルト・ヤコ ブ病	Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 1965-1970	スクレイピー-22L株に感染した神経芽細胞腫細胞および FUクローンフェルトヤコブ病病原体に感染した視床下部 GT細胞は直交配列で高密度な25nmウイルス様粒子を示 した。この粒子は膜に囲まれた不完全結晶で、A型レトロ ウイルス粒子クラスターや異常PPV原線維とは別に存在 し、形態学的にも異なっていた。またPPV抗体でラベルさ れず、ホルマーエスデル処理で増加しなかったことか ら、プリオンではなかった。この粒子は後期PPV脳病変を 誘発するTSE原因プリオンである可能性がある。
												HIV	ProMED- mail20070215.0569	カザフスタン南部において、新たにHIV感染症症例が記録 され、91例(小児)に増加した。地方病院の患者である0～ 5歳の小児である。このうちの8例は既に死亡した。また、 そこで治療を受けた母親13例も感染した。原因として、汚 染された血液の輸血や、器具やシリンジの再使用が考え られる。
69	2007/04/20	70069	持田製薬	ウロキナーゼ	ウロキナー ゼ	ヒト尿	中国	有効成分	有	無	無	ウイルス感染	CBS News/ Healthwatch 2006 年8月22日	中国Hunan省中部のChenzhou市でヒトポカウイルス感染 の6症例(全て1歳以下の乳幼児)が報告された。これは 新たに同定されたウイルスによる中国での最初の感染例 である。
												HIV	asahi.com 健康 2006年9月4日	日本人で初めてHIV2型の感染者が確認された。この男性 は過去に西アフリカで輸血を受けたことがあり、このとき の輸血が感染源とみられている。厚生労働省は「型だけ でなく、2型についても検査体制を徹底するよう通知した。
												HHV-8感染	N Engl J Med 2006; 355: 1331-1338	2000年12月から2001年10月に輸血を受けたウガンダの Kampalaの患者1811例のうち、輸血前にヒトヘルペスウィ ルス8型(HHV-8)血清陰性であった患者991例について 追跡調査を行った。そのうち43%(425例)にHHV-8血清陽 性血が輸血された。991例中41例にHHV-8セロコンバー ジョンが起こったが、セロコンバージョンのリスクは陰性血 を輸血された患者の方が陰性血を輸血された患者より有 意に高かった。
												クロスリジウ ム感染	第55回日本感染症 学会東日本地方会 総会 2006年10月 26-27日 016	胸部打撲後、心肺停止、混合性アシドーシス、胸部筋組 織の破綻像を伴う著明な気腫などを呈し、死亡した58歳 男性の、死亡直前に採取された皮下気腫穿刺液を調べ たところ、多数の偏性嫌気性有芽胞グラム陽性桿菌が検 出された。RNA遺伝子解析の結果、Clostridium chauvoei と同定された。本菌は複数の同定キットでは明らかにでき なかった。本菌は獣医学領域の病原菌として知られてい るが、ヒト感染症からの分離は初めてである。