

ID	受理日	番号	報告者名	一般名	生物由来成分名	原材料名	原産国	含有区分	文献	症例	適正 使用 措置	感染症(PT)	出典	概要
												BSE	ProMED-mail20061227.3621	70101に同じ
												リケッチア症	ProMED-mail20061130.3391	70101に同じ
106	2007/04/24	70105	CSLベーリング		ヒトアルブミン	ヒト血液	米国、ドイツ、オーストリア	添加物	有	無	無	HHV-8感染	N Engl J Med 2006; 355: 1331-1338	2000年12月から2001年10月に輸血を受けたウガンダのKampalaの患者1811例のうち、輸血前にヒトヘルペスウイルス8型(HHV-8)血清陰性であった患者991例について追跡調査を行った。そのうち43%(425例)にHHV-8血清陽性血が輸血された。991例中41例にHHV-8セロコンバージョンが起こったが、セロコンバージョンのリスクは陽性血を輸血された患者の方が陰性血を輸血された患者より有意に高かった。
												ウイルス感染	Transfusion 2006; 46: 1352-1359	全血輸血により、サルフォamyウイルス(SFV)感染が起こるかをアカゲザルを用いて調べた。自然感染ザル2匹の全血を、各々、レトロウイルスを持たないサル2匹に輸血したところ、1匹のドナーからのレシビエントでは感染し、もう1匹のドナーからのレシビエントは感染しなかった。ヒトでのSFV輸血伝播の可能性が示された。
												ウイルス感染	Transfusion 2007; 47: 162-170	輸血により、サルフォamyウイルス(SFV)感染が起こるかをアカゲザルを用いて調べた。感染ザルの血液を非感染ザルに輸血したところ、輸血されたザルの血液から8週後にプロウイルスDNAが検出され、その1週間後にセロコンバージョンが起こった。血しように中に検出限界下限のSFVが検出された。また感染29週目に唾液中にSFVが検出された。輸血によりSFVが感染することが初めて示された。
107	2007/04/24	70106	CSLベーリング		ヒトフィブリノゲン	ヒト血液	米国、ドイツ、オーストリア	有効成分	有	無	無	HHV-8感染	N Engl J Med 2006; 355: 1331-1338	70105に同じ