

ID	受理日	番号	報告者名	一般名	生物由来成分名	原材料名	原産国	含有区分	文獻	症例	適正 使用 措置	感染症(Pf)	出典	概要
113	2007/04/24	70112	CSLベーン ング		ウマコラーゲン	ウマアキレス 腱	フランス、ド イツ、ベル ギー、イタリ ア	支持体	無	無	無			
114	2007/04/25	70113	日本製薬	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	抗HBs抗体	人血液	米国	有効成分	有	無	無	HIV	日刊薬業 第12105 号 平成18年9月6日	日本人初のHIV-2感染者が確定された。男性は過去に西 アフリカに渡航し、現地で輸血した経験があるため、これ が感染経路と見られている。厚労省は、2型の検査も確実 に行い、検査漏れがないよう、各都道府県に通知した。
												異型クロイツ フェルト-ヤコ ブ病	厚生労働省 平成 18年8月24日	平成18年8月23日に開催された薬事・食品衛生審議会血 液事業部会安全技術調査会において、ヒト胎盤エキス(プ ラセンタ)注射剤使用者に対する献血制限措置を日本赤 十字社が実施することが了承された。
												マラリア	AABB Weekly Report 2006; 12(32): 10	2006年9月8日付けのKorea Timesによると、交通事故後 に輸血を受け、その後マラリアと診断された患者が、疑わ しい血液の流通を防ぐことができなかった韓国赤十字を 批判している。韓国赤十字は状況を知りながら、何の行 動も起こさず、その結果、不適切な血液製品が流通し続 けたとこのことである。輸血によるマラリア感染で既に1名の 患者が死亡している。
												HHV-8感染	N Engl J Med 2006; 355: 1331-1338	2000年12月から2001年10月に輸血を受けたウガンダの Kampalaの患者1811例のうち、輸血前にヒトヘルペスウィ ルス8型(HHV-8)血清陰性であった患者991例について 追跡調査を行った。そのうち43%(425例)にHHV-8血清陽 性血が輸血された。991例中41例にHHV-8セロコンバー ジョンが起こったが、セロコンバージョンのリスクは陽性血 を輸血された患者の方が陰性血を輸血された患者より高 意に高かった。