

| ID | 受理日 | 番号 | 報告者名 | 一般名 | 生物由来成分名 | 原材料名 | 原産国 | 含有区分 | 文献 | 症例 | 適正使用<br>措置 | 感染症(PT)                 | 出典                                               | 概要                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----|----|------|-----|---------|------|-----|------|----|----|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    |      |     |         |      |     |      |    |    |            | 異型クロイツ<br>フェルト-ヤコ<br>ブ病 | Proc Natl Acad Sci<br>2007; 104: 10998-<br>11001 | アミロイドを含有するフォアグラにアミロイド促進因子(AEF)活性があるかを調べた。市販のフォアグラから抽出したアミロイドA蛋白含有フィブリルを、二次性アミロイドーシスを起こすトランスジェニックマウス9匹に静脈内投与したところ全例で、また縫口投与した場合は8匹中5匹でアミロイドの組織沈着が見られた。一方、対照群では全く組織沈着は見られなかった。加齢によりフォアグラのAEF活性は弱まったが、消失しなかった。アミロイドーシスは伝播性で、プリオン関連疾患の感染性と類似する可能性がある。 |
|    |     |    |      |     |         |      |     |      |    |    |            | 異型クロイツ<br>フェルト-ヤコ<br>ブ病 | SEAC/Position<br>Statement 2007年6<br>月13日        | 英国保健省はSEACに歯科治療処置を介したvCJD伝播のリスク概算を目的とした初期研究の知見についての助言を求めた。初期研究では、歯科処置によるvCJD伝播のリスクが予想より高いことが示唆された。ガイダンスは今年初め歯科治療用器具の使い捨てを勧告した。公衆衛生上の影響についてのより綿密な考察と、さらなるリスク減少手段の特定のため、全ての歯科治療のリスクについて詳細で包括的な評価を早急に行うことも重要である。                                     |
|    |     |    |      |     |         |      |     |      |    |    |            | HIV                     | Lancet 2007; 369:<br>621-623                     | 2002年の国連レポートや米国家情報会議は、中国には約100～200万人のHIV/AIDS患者がおり、感染爆発の危機が迫っているとしたが、2006年までの生存患者数は65万人と見積もられた。感染病模の過大な予測から、中国では様々な問題が生じた。HIV/AIDS対策に多大な予算を掛けただけで、喫煙、結核などの健康問題への対策が十分ではなかった。中国でのHIV/AIDS対策はハイリスク地域を中心に行うべきである。                                    |
|    |     |    |      |     |         |      |     |      |    |    |            | HIV                     | Lancet 2007; 369:<br>623-625                     | 2006年末までに台湾CDCに13702名のHIV-1/AIDS感染者が報告された。2003年以降、HIV-1/AIDS感染生存者は急増し、台湾のHIV-1/AIDS感染者数は約3万人と推測され、台湾の感染率(2300万人中3万人; 1/767)は中国(13億人中65万人; 1/2000)よりも高い可能性が示された。リスク要因分析によると、静注薬物使用者の感染率は2005年には72.4%(2461/3399)であった。また垂直感染は2006年末までに19例が確定された。     |