

ID	受理日	番号	報告者名	一般名	生物由来成分名	原材料名	原産国	含有区分	文献	症例	修正 使用 措置	感染症(PT)	出典	概要
												異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病	Proc R Soc B 2007; 274: 1497-1503	英国人消費者のBSE感染したヒツジ肉への理論的曝露を 評価し、屠殺場での制御により達成されるリスク軽減を 見積もる数学モデルを構築した。その結果、1頭の感染ヒ ツジが感染ウシ1頭に比べ10～1000倍の感染物質をもた らすと予測された。また、英国でBSE感染が横行しているヒ ツジの群はわずか4群と95%の信頼度で推定した。組織検 査に基づいた戦略、12ヶ月齢制限および危険部位の拡大 よりも、6ヶ月齢制限および遺伝子型に基づいた戦略の方 が感染リスク軽減に更に有効と考えられた。
648	2007/10/24	70648	バイエル 薬品	オクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	ヒトトランス フェリン	ヒト血液	米国	製造工程	有	無	無	異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病	FDA/OBER 2007 年3月15日	70644に同じ
												バルボウィル ス	Transfusion 2007; 47: 883-889	70644に同じ
												異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病	Biochim Biophys Acta 2007; 1772: 598-609	70644に同じ
												異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病	Transfus Clin Biol 2006; 13: 312-316	70644に同じ
												異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病	FDA/OBER 2007年 5月30日	70644に同じ
												異型クロイツ フェルト・ヤコ ブ病	Transfusion 2007; 47: 1418-1425	70644に同じ
												C型肝炎	Transfusion 2007; 47: 1534-1539	70644に同じ