



№5 caption	picture	Narration
映像： ドイツ新聞を背景に 日本語テロップ		『一般に広く使われているある薬剤を妊娠中の女性が服用した場合、生まれてくる子供に重大な奇形を生じる可能性がある』 と警告する小児科医レント博士の報告が掲載されました。 秒
№6 caption	picture	Narration
映像： ドイツ新聞を背景に レント医師の写真		レント博士は、その薬剤とはサリドマイドであり、製造元の製薬会社は早急にサリドマイドを市場から回収すべきであると強く主張しました。 この警告の後、ヨーロッパ各国ではサリドマイドの回収が決定されました。 秒
№7 caption	picture	Narration
映像： 読売新聞を背景に テロップ 北海道大学医学部の 梶井医師 サリドマイド被害症例を 報告した記事 1962年8月の 読売新聞朝刊画像		日本では、北海道大学医学部の梶井医師によるサリドマイド被害症例の報告が昭和37年8月の読売新聞記事に掲載され、サリドマイドの危険性が広く世間に知れ渡りました。 秒
№8 caption	picture	Narration
映像： 朝日新聞を背景に テロップ サリドマイドを含有する 医薬品の販売停止と 回収を報じる記事 1962年9月14日の 朝日新聞朝刊画像		その後、日本でもサリドマイドを含有する医薬品の販売停止と回収が発表されました。 秒

No9	caption	picture	Narration
	映像: 被害児写真 提供「田村茂」 ↓ 柏森良二「サリドマイド物語」を引用し、各国の被害者数をグラフで提示 (日本、ドイツ、イギリス、ブラジルはナレーションとともに強調効果)		サリドマイドは、腕や脚だけではなく耳や心臓などにも重大な奇形を引き起こしました。日本では309人の被害児が生まれています。その当時のある統計によると、海外においても、ドイツ3049人、イギリス201人、さらに南米のブラジルでは99人の被害児が産まれたと言われています。死産を含めると世界の被害者総数はおおよそ5850症例と推定されています。 秒

No10	caption	picture	Narration
	映像: テロップ(黒バック) ↓ ブラジルの地図 ↓ テロップ	サリドマイドの製造販売が中止されたわずか数年後、… ↓ ブラジルでは、ハンセン病の症状を和らげる薬として、再びサリドマイドの使用が認められました。	サリドマイドの製造販売が中止されたわずか数年後、ブラジルでは、ハンセン病の症状を和らげる薬として、再びサリドマイドの使用が認められました。 秒

No11	caption	picture	Narration
	映像: ブラジルの地図(白黒) ↓ テロップ ↓ 被害児出生報告論文の図表示(テロップ) Teratology 54:273-277 (1996) ↓ 地球儀	患者やその家族、医師までもが、サリドマイドの危険性を十分に認識していませんでした。	しかし当時のブラジルでは、患者やその家族、医師までもが、サリドマイドの危険性を十分に認識していませんでした。医師の処方箋が無くても薬局で自由に購入できたため、確認されているだけで122人の被害児が誕生しました。 サリドマイドを使用する全ての人達への安全教育が行き届いていなかったこと、患者自身によるサリドマイドの管理がずさんであったために、悲しい被害が繰り返されたのです。 秒

No12	caption	picture	Narration
	映像: 診察室にて医師から説明を受ける外国人(ブラジル人)患者の映像		このため、ブラジル政府はサリドマイドの使用条件として、厳格な管理の下で、患者を登録し、許可された医師のみが使用できることとしました。 秒

№13 caption

picture

Narration

映像：
ブラジルの地図を
背景に英語論文表紙
↓
日本語テロップ



これによって被害者の数は減ったものの、
その後も
被害がなくなることはありませんでした。

2007年の調査報告では、
3例の新たなサリドマイド被害児の
誕生が報告されました。

秒

№14 caption

picture

Narration

映像：
男性から女性が
サリドマイドをもらうイラスト



治療中の夫から譲り受けた
サリドマイドを妊娠に気づかぬまま服用

この3例は、
サリドマイド治療を受けている夫から
譲り受けたサリドマイドを、
妊娠に気づかぬまま服用したこと。

秒

№15 caption

picture

Narration

映像：
母親から女性が
サリドマイドをもらうイラスト



治療中の母親から譲り受けた
サリドマイドを妊娠中に服用

サリドマイド治療を受けている
母親から譲り受けたサリドマイドを、
妊娠中に服用したこと。

秒

№16 caption

picture

Narration

映像：
女性が服用している
イラスト



サリドマイドを服用中の患者本人が妊娠

サリドマイドを服用中の患者本人が
妊娠してしまったことによって
引き起こされたものでした。


秒

№17 caption

picture

Narration

映像：
シーン14、15、16の
イラストを3分割で
もう一度見せる。



ブラジルで起こった事例は、サリドマイド被害が
遠い過去のものではなく、今も身近に起こってい
ることを示して
います。

また、患者、家族にサリドマイドの安全教育と家
庭での保管や管理が徹底されていたなら被害を
防げた事例でもあるのです。

秒

№18 caption

picture

Narration

映像：
被害児の写真
(提供「田村茂」)
↓
写真バックに
テロップ

妊娠している女性が服用すると
胎児に重い障害をもたらす可能性が
あります。

サリドマイドは、
例えばそれが一カプセルであった
としても、妊娠している女性が服用すると
胎児に重い障害をもたらす可能性があります。

秒

№19 caption

picture

Narration

映像：
被害児の写真
↓
写真バックに
テロップ

胎児への影響は、
まだ妊娠に気づいていない妊娠初期が
最も危険です。
↓

妊娠する可能性のある女性は、
妊娠していないことを確認した後で
なければサリドマイドを決して服用しては
いけません。

胎児への影響は、
まだ妊娠に気づいていない妊娠初期
が最も危険です。

したがって、妊娠する可能性のある女性は、
妊娠していないことを確認した後で
なければサリドマイドを決して服用しては
いけません。

秒

№20 caption

picture

Narration

映像：
被害児の写真
↓
写真バックに
テロップ

女性だけではありません。


男性も注意が必要です。
それは、サリドマイドを服用した
男性の精子・精液中にもサリドマイド
が
含まれている可能性があるからです。

女性だけではありません。

男性も注意が必要です。
それは、サリドマイドを服用した
男性の精子・精液中にもサリドマイドが
含まれている可能性があるからです。


秒

No21 caption	picture	Narration
映像： 被害児の写真 (提供「田村茂」) ↓ 写真バックに テロップ	もし、サリドマイドを服用した患者さんが妊娠していたら…、 または服用した患者さんのパートナーの方が妊娠していたら…。 ↓ サリドマイドを適切に保管していなかったために、もし、患者さん以外のご家族の方が誤ってサリドマイドを服用してしまったら…。	考えてみてください。 もし、サリドマイドを服用した患者さんが妊娠していたら、または服用した患者さんのパートナーの方が妊娠していたら。 サリドマイドを適切に保管していなかったために、もし、患者さん以外のご家族の方が誤ってサリドマイドを服用してしまったら。 秒
No22 caption	picture	Narration
映像： 白バックにテロップ	お腹の中の子どもに被害を及ぼさないために、サリドマイドを使用する方々は、サリドマイドの危険性を正しく理解し、安全に使用する必要があります。	お腹の中の子供に被害を及ぼさないために、サリドマイドを使用する方々は、サリドマイドの危険性を正しく理解し、安全に使用する必要があります。 秒
No23 caption	picture	Narration
映像： TERMSデータセンター内の映像 ↓ センター入室シーン ↓ タイトルテロップ	サリドマイドの教育と安全使用に関する管理システム	サリドマイドを製造・販売する藤本製薬は、サリドマイド被害が繰り返されることのないように、「サリドマイドの教育と安全使用に関する管理システム」、 秒
No24 caption	picture	Narration
映像： タイトルテロップ(英字)	TERMS Thalidomide Education and Risk Management System	略してタームスというシステムを作りました。 秒


No25	caption	picture	Narration
	映像： 医師・薬剤師・看護師 が MRにサリドマイドの危険性に関する説明を受けているシーン (パワーポイントを映し出して説明している) テロップ		このシステムでは、 サリドマイド治療に関わる全ての方々に サリドマイドの危険性と危険性を回避する 方法を知っていただき、 秒

No26	caption	picture	Narration
	映像： 医師から説明を受ける 患者さん(50-60歳代)		理解された方のみを登録します。 登録された方のみがサリドマイドを 使用または服用することができます。 秒

No27	caption	picture	Narration
	映像： タイトルテロップ 音楽： ジングル テロップが出ると同時に 短い音楽	サリドマイドの危険性回避のため： サリドマイドの 保管と管理 妊娠回避	サリドマイドの危険性を回避するために 重要なことはサリドマイドの保管と管理、 そして妊娠の回避を徹底することです。 まずは サリドマイドの保管と管理方法について 確認しましょう。 秒

No28 caption	picture	Narration
映像： 病院の薬局映像。 待合から見る薬局 の一般的映像。		秒

No29 caption	picture	Narration
映像： 薬剤師がサリドマイドを 薬局内の専用の金庫から サリドマイドを 取り出している。 ↓ 専用の帳簿に記載する。		病院では、他のお薬と区別し 鍵のかかる場所に保管し、 また、専用の出納帳に記入し、 数量の管理を厳格にしてください。 秒

No30 caption	picture	Narration
映像： 家庭内の映像		秒

No31 caption	picture	Narration
映像： 薬箱を食器棚に保管。 他の薬と保管してある 薬箱。→いずれも × ↓ 寝室内のタンスに保管。 → ○ 50-60歳代の患者		家庭では、ご家族の方が誤って服用する ことのないようにしてください。 他のお薬、食料品とは 区別し、子供の手の届かない場所に保管 してください。 秒

No32 caption

picture

Narration

映像：
50-60歳代患者が薬
を飲む。

↓
カプセルシートを
手から手へ渡す
手元のみ

シーンに赤い ×



サリドマイドは患者さんご自身のものです。

お薬を処方された患者さん以外の方に
サリドマイドを譲渡しないでください。

秒

No33 caption

picture

Narration

映像：
薬局内の個室で
残ったカプセルシートを
患者が(50-60歳代)、
薬剤師に
返却しているシーン



お薬を受け取った患者さん以外の方が誤って
服用することのないように、必要のなくなった
サリドマイドは家庭で保管せず
また ご自身で廃棄することなく
必ずお薬を受け取った病院の薬剤師に戻して
下さい。

秒

No34 caption

picture

Narration

映像：テロップ
ジングル
(No27と同じ音)

サリドマイドの危険性回避のため：

**サリドマイドの
保管と管理**

妊娠回避

次に、サリドマイドの危険性を回避するために
重要なことは、男女ともに妊娠の回避を徹底
することです。

秒

No35 caption

picture

Narration

映像：
医師と女性

診察室にて医師より説明
を受ける女性患者
(30-40歳代)



妊娠する可能性のある女性患者さんは、
毎回処方時に
必ず妊娠検査を受ける必要があります。

妊娠していないことを確認した後でなければ
サリドマイドによる治療を受ける
ことができません。

秒