

●ピルをのんではいけない人

以下の項目に当てはまる人は、ピルを使用してはいけないとされています。

- ①ピルを服用して過敏症を起こしたことのある人
- ②乳がん、子宮体がん、子宮頸がん、子宮筋腫およびその疑いのある人
- ③原因不明の性器出血のある人
- ④血栓性静脈炎、肺塞栓症、脳血管障害、冠動脈疾患にかかっている人、またはかかったことのある人
- ⑤35歳以上で1日15本以上タバコを吸う人
- ⑥前兆（閃輝暗点、星型闪光等）を伴う片頭痛のある人
- ⑦肺高血圧症又は心房細動を合併する心臓弁膜症の患者、亜急性細菌性心内膜炎の既往歴のある心臓弁膜症の人
- ⑧血管病変を伴う糖尿病の人（糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症等）

- ⑨血栓症素因のある人
- ⑩抗リン脂質抗体症候群のある人
- ⑪4週間以内に手術を予定している人、手術後2週間以内の人、産後4週間以内の人、および長期安静状態の人
- ⑫重症の肝障害のある人
- ⑬肝腫瘍のある人
- ⑭脂質代謝障害（高脂血症など）といわれたことのある人
- ⑮高血圧のある人（軽度の高血圧の人を除く）
- ⑯耳硬化症の人
- ⑰妊娠中に黄疸、持続的なかゆみ、または妊娠ヘルペスの症状があらわれたことのある人
- ⑱妊娠または妊娠している可能性のある人
- ⑲授乳中の人
- ⑳思春期前の人

●ピルの服用に注意が必要な人

以下の項目に当てはまる人は、ピルをのむにあたって注意が必要とされていますので、医師に相談しましょう。

- ①40歳以上の人
- ②家族に乳がんにかかった人がいる、または乳房にしこりのある人
- ③喫煙者
- ④肥満の人
- ⑤家族に血栓症にかかった人がいる人
- ⑥前兆を伴わない片頭痛のある人

- ⑦心臓弁膜症の人
- ⑧軽度の高血圧のある人
- ⑨糖尿病またはその疑いのある人
- ⑩ポルフィリン症の人
- ⑪肝障害のある人
- ⑫心臓・腎臓の病気にかかっている、またはかかったことのある人
- ⑬てんかんのある人
- ⑭テタニー（筋のけいれん）のある人