

27 加味解毒湯

〔成分・分量〕

黄連2、黄芩2、黄柏2、山梔子2、柴胡2、茵陳蒿2、竜胆2、木通2、滑石3、升麻1.5、甘草1.5、燈心草1.5、大黃1.5（大黃のない場合も可）

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

比較的体力があり、血色がよいものの次の諸症
小便がしぶって出にくいもの、痔疾（いぼ痔、痔痛、痔出血）

28 加味逍遙散

〔成分・分量〕

当帰3、芍薬3、白朮3（蒼朮も可）、茯苓3、柴胡3、牡丹皮2、山梔子2、甘草1.5-2、生姜1、薄荷葉1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症

《備考》

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

29 加味逍遙散加川芎地黃（加味逍遙散合四物湯）

〔成分・分量〕

当帰3-4、芍薬3-4、白朮3（蒼朮も可）、茯苓3、柴胡3、川芎3-4、地黃3-4、甘草1.5-2、牡丹皮2、山梔子2、生姜1-2、薄荷葉1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症

湿疹・皮膚炎・しみ、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}

《備考》

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

30 加味平胃散

〔成分・分量〕

蒼朮4-6(白朮も可)、陳皮3-4.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、神麹
2-3、山楂子2-3、厚朴3-4.5、甘草1-2、大棗2-3、麦芽2-3 (山楂子はなくても可)

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症
急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感

31 乾姜人参半夏丸

〔成分・分量〕

乾姜3、人参3、半夏6

〔用法・用量〕

- (1)散:1回1.5-5g 1日3回
- (2)湯:上記量を1日量とする

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続きみぞおちのつかえを感じるもの次の諸症
つわり、胃炎、胃腸虚弱

32 甘草瀉心湯

〔成分・分量〕

半夏5、黄芩2.5、乾姜2、人参2.5、甘草2.5-3.5、大棗2.5、黃連1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が
鳴るもの次の諸症
胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢

33 甘草湯

〔成分・分量〕

甘草2-8

〔用法・用量〕

- (1)散:1回0.5g 1日2回
- (2)湯:少しづつゆっくり飲む
- (3)外用:煎液で患部を温湿布する

〔効能・効果〕

激しいせき、口内炎、しわがれ声
外用:痔・脱肛の痛み

《備考》

注)体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注
意〉として記載する。】

- 34 甘麦大棗湯
- 〔成分・分量〕 甘草3-5、大棗2.5-6、小麦14-20
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るもの次の諸症
不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ
- 35 帰耆建中湯
- 〔成分・分量〕 当帰3-4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-4)、大棗3-4、芍薬5-6、
甘草2-3、黄耆2-4、膠飴20(膠飴はなくても可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症
虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患
- 36 桔梗湯
- 〔成分・分量〕 桔梗1-4、甘草2-8
- 〔用法・用量〕
- 湯
- 〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症
扁桃炎、扁桃周囲炎
- 37 帰脾湯
- 〔成分・分量〕 人参2-4、白朮2-4(蒼朮も可)、茯苓2-4、酸棗仁2-4、竜眼肉2-4、黃耆2-4、當帰2、
遠志1-2、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜1-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪いものの次の諸症
貧血、不眠症、神経症、精神不安
- 38 芍帰膠艾湯
- 〔成分・分量〕 川芎3、甘草3、艾葉3、當帰4-4.5、芍藥4-4.5、地黃5-6、阿膠3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症
痔出血、貧血、月經異常・月經過多・不正出血、皮下出血

39 萸帰調血飲

〔成分・分量〕

当帰2-2.5、地黄2-2.5、川芎2-2.5、白朮2-2.5(蒼朮も可)、茯苓2-2.5、陳皮2-2.5、烏
藥2-2.5、大棗1-1.5、香附子2-2.5、甘草1、牡丹皮2-2.5、益母草1-1.5、乾姜1-1.5、生
姜0.5-1.5(生姜はなくても可)

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用でき
月經不順、産後の神經症・体力低下

40 萘帰調血飲第一加減

〔成分・分量〕

当帰2、川芎2、地黄2、白朮2(蒼朮も可)、茯苓2、陳皮2、烏藥2、香附子2、牡丹皮2、
益母草1.5、大棗1.5、甘草1、乾姜1-1.5、生姜0.5-1.5(生姜はなくても可)、芍藥1.5、桃
仁1.5、紅花1.5、枳實1.5、桂皮1.5、牛膝1.5、木香1.5、延胡索1.5

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用でき
血の道症^注、月經不順、産後の体力低下

《備考》

注)血の道症とは、月經、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神經症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

41 韶声破笛丸

〔成分・分量〕

連翹2.5、桔梗2.5、甘草2.5、大黃1、縮砂1、川芎1、訶子1、阿仙葉2、薄荷葉4（大黃
のない場合も可）

〔用法・用量〕

(1) 散:1回2-3g 1日数回

(2) 湯

〔効能・効果〕

しわがれ声、咽喉不快

《備考》

注)体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

42 杏蘇散

[成分・分量]

蘇葉3、五味子2、大腹皮2、烏梅2、杏仁2、陳皮1-1.5、桔梗1-1.5、麻黃1-1.5、桑白皮1-1.5、阿膠1-1.5、甘草1-1.5、紫苑1

[用法・用量]

湯(原則として)

[効能・効果]

体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくむものの次の諸症
せき、たん、気管支炎

43 苦参湯

[成分・分量]

苦参6-10

[用法・用量]

水500-600mLで煮て250-300mLとし外用す。

[効能・効果]

ただれ、あせも、かゆみ

44 駆風解毒散(湯)

[成分・分量]

防風3-5、牛蒡子3、連翹5、荊芥1.5、羌活1.5、甘草1.5、桔梗3、石膏5-10

[用法・用量]

湯(本処方は冷やしてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)

[効能・効果]

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症
扁桃炎、扁桃周囲炎

45 荊芥連翹湯

[成分・分量]

當帰1.5、芍藥1.5、川芎1.5、地黃1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、荊芥1.5、防風1.5、薄荷葉1.5、枳殼(実)1.5、甘草1-1.5、白芷1.5-2.5、桔梗1.5-2.5、柴胡1.5-2.5(地黃、黃連、黃柏、薄荷葉のない場合も可)

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症
蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

46 鶏肝丸

[成分・分量]

鶏肝1具

鶏肝1具をとりゆでて乾燥し、山薬末(鶏肝の乾燥した量の2-3倍量をめやすとする。)を和しつつ細末とし糊丸とする。

[用法・用量]

丸:1回2g 1日3回

[効能・効果]

体力虚弱などの次の症状

虚弱体質

47 桂枝湯

[成分・分量]

桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力虚弱で、汗が出るもの次の症状

かぜの初期

48 桂枝加黃耆湯

[成分・分量]

桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、黃耆2-3

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力虚弱などの次の諸症

ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎

49 桂枝加葛根湯

[成分・分量]

桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1.6-2、葛根3.2-6

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状

かぜの初期

50 桂枝加厚朴杏仁湯

[成分・分量]

桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草1.6-2、厚朴1-4、杏仁1.6-4

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力虚弱などの次の諸症
せき、気管支炎、気管支ぜんそく

51 桂枝加芍薬生姜人参湯

[成分・分量]

桂皮2.4-4、大棗2.4-4、芍薬3.2-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5.5)、甘草1.6-2、人参2.4-4.5

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力虚弱などの次の諸症
みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み

52 桂枝加芍薬大黃湯

[成分・分量]

桂皮3-4、芍薬4-6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、大黃1-2

[用法・用量]

湯

[効能・効果]

体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症
便秘、しぶり腹^(注)

《備考》

注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、(効能・効果に関連する注意)として記載する。】

- 53 桂枝加芍薬湯
- 〔成分・分量〕 桂皮3-4、芍薬6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症
しぶり腹^{注)}、腹痛、下痢、便秘
- 《備考》 注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。
- 【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 54 桂枝加朮附湯
- 〔成分・分量〕 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工ブシ0.5-1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虛弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症
関節痛、神經痛
- 55 桂枝加竜骨牡蠣湯
- 〔成分・分量〕 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、竜骨3、牡蠣3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、疲れやすく、神經過敏で、興奮しやすいものの次の諸症
神經質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神經症
- 56 桂枝加苓朮附湯
- 〔成分・分量〕 桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工ブシ0.5-1、茯苓4
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虛弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに、動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症
関節痛、神經痛

57 桂枝人参湯

〔成分・分量〕

桂皮4、甘草3-4、人参3、乾姜2-3、白朮3(蒼朮も可)

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症

頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒

58 桂枝茯苓丸

〔成分・分量〕

桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍藥4

〔用法・用量〕

(1) 散: 1回2-3g 1日3回

(2) 湯

〔効能・効果〕

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

59 桂枝茯苓丸料加薏苡仁

〔成分・分量〕

桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍藥4、薏苡仁10-20

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症

にきび、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、月経不順、血の道症^{注)}

《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 60 啓脾湯
- 〔成分・分量〕
人参3、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、蓮肉3、山茱萸3、山楂子2、陳皮2、沢瀉2、大棗1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1(大棗、生姜はなくとも可)
- 〔用法・用量〕
(1) 散: 1回1-2g 1日3回
(2) 湯
- 〔効能・効果〕
体力虚弱で、瘦せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症
胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢
- 61 荊防敗毒散
- 〔成分・分量〕
荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、独活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼(又は枳実)1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、
- 〔用法・用量〕
湯
- 〔効能・効果〕
比較的体力があるものの次の諸症
急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎
- 62 桂麻各半湯
- 〔成分・分量〕
桂皮3.5、芍藥2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2)、甘草2、麻黃2、大棗2、杏仁2.5
- 〔用法・用量〕
湯
- 〔効能・効果〕
体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症
感冒、せき、かゆみ
- 63 鷄鳴散加茯苓
- 〔成分・分量〕
檳榔子3-4、木瓜3、橘皮2-3、桔梗2-3、茯苓4-6、吳茱萸1-1.5、蘇葉1-2、生姜1-1.5
(ヒネショウガを使用する場合3)
- 〔用法・用量〕
湯
- 〔効能・効果〕
体力中等度のものの次の諸症
下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛
- 64 堅中湯
- 〔成分・分量〕
半夏5、茯苓5、桂皮4、大棗3、芍藥3、乾姜3(生姜1でも可)、甘草1-1.5
- 〔用法・用量〕
湯
- 〔効能・効果〕
体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするものの次の諸症
慢性胃炎、腹痛

65 甲子湯

〔成分・分量〕

桂皮3-4、茯苓3-4、牡丹皮3-4、桃仁3-4、芍藥3-4、甘草1.5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ

《備考》

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

66 香砂平胃散

〔成分・分量〕

蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、甘草1-1.5、縮砂1.5-2、香附子2-4、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3、藿香1(藿香はなくても可)

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症
食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良

67 香砂養胃湯

〔成分・分量〕

白朮2.5-3、茯苓2.5-3、蒼朮2、厚朴2-2.5、陳皮2-2.5、香附子2-2.5、白豆蔻2(小豆蔻代用可)、人参1.5-2、木香1.5、縮砂1.5-2.5、甘草1.5-2.5、大棗1.5-2.5、生姜0.7-1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力虚弱などの次の諸症
胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振

68 香砂六君子湯

〔成分・分量〕

人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-6、陳皮2-3、香附子2-3、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、甘草1-1.5、縮砂1-2、藿香1-2

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

- 69 香蘇散
- 〔成分・分量〕 香附子3.5-4.5、蘇葉1-3、陳皮2-3、甘草1-1.5、生姜1-2
- 〔用法・用量〕
(1) 散: 1回1-2g 1日3回
(2) 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いものの次の諸症
かぜの初期、血の道症注)
- 《備考》
注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、(効能・効果に関連する注意)として記載する。】
- 70 厚朴生姜半夏人参甘草湯
- 〔成分・分量〕 厚朴3、ヒネショウガ3(生姜を使用する場合)、半夏4、人参1.5、甘草2.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、腹部膨満感のあるものの次の諸症
胃腸虚弱、嘔吐
- 71 五虎湯
- 〔成分・分量〕 麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10、桑白皮1-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、せきが強くできるものの次の諸症
せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み
- 72 牛膝散
- 〔成分・分量〕 牛膝3、桂皮3、芍薬3、桃仁3、当帰3、牡丹皮3、延胡索3、木香1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 比較的体力があるものの次の諸症
月経困難、月経不順、月経痛
- 73 五積散
- 〔成分・分量〕 茯苓2-3、蒼朮2-3(白朮も可)、陳皮2-3、半夏2-3、当帰1.2-3、芍薬1-3、川芎1-3、厚朴1-3、白芷1-3、枳殼(実)1-3、桔梗1-3、乾姜1-1.5、生姜0.3-0.6(ヒネショウガを使用する場合1-2)、桂皮1-1.5、麻黄1-2.5、大棗1-2、甘草1-1.2、香附子1.2 (生姜、香附子のない場合も可)
- 〔用法・用量〕 湯(原則として)
- 〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるものの次の諸症
胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒

- 74 牛車腎氣丸
- [成分・分量]
地黃5-8、山茱萸2-4、山藥3-4、沢瀉3、茯苓3-4、牡丹皮3、桂皮1-2、加工ブシ0.5-1、牛膝2-3、車前子2-3
- [用法・用量]
(1) 散: 1回2g 1日3回
(2) 湯
- [効能・効果]
体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)
- 75 吳茱萸湯
- [成分・分量]
吳茱萸3-4、大棗2-4、人参2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-6)
- [用法・用量]
湯
- [効能・効果]
体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症
頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり
- 76 五物解毒散
- [成分・分量]
川芎5、金銀花2、十葉2、大黃1、荊芥1.5
- [用法・用量]
湯
- [効能・効果]
体力中等度以上のものの次の諸症
かゆみ、湿疹・皮膚炎
- 77 五淋散
- [成分・分量]
茯苓5-6、当帰3、黄芩3、甘草3、芍藥1-2、山梔子1-2、地黃3、沢瀉3、木通3、滑石3、車前子3(地黃以下のない場合も可)
- [用法・用量]
湯
- [効能・効果]
体力中等度のものの次の諸症
頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

- 78 五苓散
- 〔成分・分量〕 沢瀉4-6、猪苓3-4.5、茯苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3
- 〔用法・用量〕
(1) 散: 1回1-2g 1日3回
(2) 湯
- 〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、のどが渴いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹^{注)}のものには使用しないこと)、暑氣あたり、頭痛、むくみ、二日酔
- 《備考》
注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 79 柴陷湯
- 〔成分・分量〕 柴胡5-8、半夏5-8、黄芩3、大棗3、人参2-3、甘草1.5-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、桔梗仁3、黃連1-1.5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出てたんが切れにくく、ときに胸痛があるものの次の諸症
せき、胸痛、気管支炎
- 80 柴胡加竜骨牡蠣湯
- 〔成分・分量〕 柴胡5、半夏4、茯苓3、桂皮3、大棗2.5、人参2.5、竜骨2.5、牡蠣2.5、生姜0.5-1、大黃1、黄芩2.5、甘草2以内(大黃、黄芩、甘草のない場合も可)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症
高血圧の随伴症状(動悸、不安、不眠)、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘
- 81 柴胡桂枝乾姜湯
- 〔成分・分量〕 柴胡6-8、桂皮3、桔梗根3-4、黄芩3、牡蠣3、乾姜2、甘草2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、冷え症、貧血氣味、神經過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるものの次の諸症
更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎
- 《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 82 柴胡桂枝湯
- 〔成分・分量〕 柴胡4-5、半夏4、桂皮1.5-2.5、芍薬1.5-2.5、黃芩1.5-2、人参1.5-2、大棗1.5-2、甘草1-1.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症
胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
- 83 柴胡清肝湯
- 〔成分・分量〕 湯:柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黄1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、栝樓根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5
散:柴胡2、他の生薬はすべて2.5
- 〔用法・用量〕 (1)散:1回2g 1日3回
(2)湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、疳の強い傾向(神經過敏)にあるものの次の諸症
神經症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虛弱児の体質改善
- 84 柴芍六君子湯
- 〔成分・分量〕 人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏4、陳皮2-3、大棗2、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、柴胡3-4、芍薬3-4
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、神經質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるものの次の諸症
胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神經性胃炎
- 85 柴朴湯
- 〔成分・分量〕 柴胡7、半夏5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黃芩3、大棗3、人参3、甘草2、茯苓4-5、厚朴3、蘇葉2-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔氣などを伴うものの次の諸症
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神經症、虛弱体質

- 86 柴苓湯
- 〔成分・分量〕 柴胡4-7、半夏4-5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗2.5-3、人参2.5-3、甘草2-2.5、沢瀉4-6、猪苓2.5-4.5、茯苓2.5-4.5、白朮2.5-4.5(蒼朮も可)、桂皮2-3
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときにはきけ、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症
水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ
- 87 左突膏
- 〔成分・分量〕 松脂800、黄蠅220、豚脂58、ゴマ油1000
- 〔用法・用量〕 外用
- 〔効能・効果〕 化膿性のはれもの
- 88 三黄散
- 〔成分・分量〕 大黄1-2、黄芩1、黄連1
- 〔用法・用量〕 散:1回0.8g 1日3回
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症^{注)}
- 《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】
- 89 三黃瀉心湯
- 〔成分・分量〕 大黄1-5、黄芩1-4、黄連1-4
- 〔用法・用量〕 湯:(振り出しの場合1/3量を用いる)
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるものの次の諸症
高血圧の随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安)、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症^{注)}
- 《備考》
注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 90 酸棗仁湯
- [成分・分量] 酸棗仁10-18、知母2-3、川芎2-3、茯苓2-5、甘草1
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症
不眠症、神経症
- 91 三物黃芩湯
- [成分・分量] 黃芩1.5-3、苦參3、地黃6
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度又はやや虚弱で、手足のほてりがあるものの次の諸症
湿疹・皮膚炎、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、不眠
- 92 滋陰降火湯
- [成分・分量] 当帰2.5、芍藥2.5、地黃2.5、天門冬2.5、麥門冬2.5、陳皮2.5、白朮あるいは蒼朮3、知母1-1.5、黃柏1-1.5、甘草1-1.5、大棗1、生姜1 (大棗、生姜はなくても可)
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるものの次の諸症
気管支炎、せき
- 93 滋陰至宝湯
- [成分・分量] 当帰2-3、芍藥2-3、白朮あるいは蒼朮2-3、茯苓2-3、陳皮2-3、柴胡1-3、知母2-3、香附子2-3、地骨皮2-3、麥門冬2-3、貝母1-2、薄荷葉1、甘草1
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力虚弱などの次の諸症
慢性のせき、たん、気管支炎
- 94 紫雲膏
- [成分・分量] 紫根100-120、当帰60-100、豚脂20-30、黃蠅300-400、ゴマ油1,000
- [用法・用量] 外用
- [効能・効果] ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

- 95 四逆散
- 〔成分・分量〕 柴胡2-5、芍薬2-4、枳実2、甘草1-2
- 〔用法・用量〕 (1) 散: 1回2-2.5g 1日3回
(2) 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるものの次の諸症
胃炎、胃痛、腹痛、神経症
- 96 四君子湯
- 〔成分・分量〕 人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓4、甘草1-2、生姜0.5-1、大棗1-2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力虚弱で、痩せて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいものの次の諸症
胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢、夜尿症
- 97 滋血潤腸湯
- 〔成分・分量〕 当帰4、地黄4、桃仁4、芍薬3、枳実2-3、梔2-3、大黃1-3、紅花1
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、皮膚にうるおいがないものの次の諸症
便秘、のぼせ、肩こり
- 98 七物降下湯
- 〔成分・分量〕 当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黄3-5、釣藤鈎3-4、黃耆2-3、黃柏2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重)
- 99 柿蒂湯
- 〔成分・分量〕 丁子1-1.5、柿蒂5、ヒネショウガ4(生姜を使用する場合1)
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 しゃっくり
- 《備考》
注) 体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

100 四物湯

〔成分・分量〕

当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黃3-5

〔用法・用量〕

- (1) 散: 1回1.5-2g 1日3回
- (2) 湯

〔効能・効果〕

体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体质で胃腸障害のないものの次の月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症^{注)}、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復

《備考》

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

101 炙甘草湯

〔成分・分量〕

炙甘草3-4、生姜0.8-1(ヒネショウガを使用する場合3)、桂皮3、麻子仁3-4、大棗3-7.5、人参2-3、地黃4-6、麥門冬5-6、阿膠2-3

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症
動悸、息切れ、脈のみだれ

102 芍薬甘草湯

〔成分・分量〕

芍薬3-8、甘草3-8

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

103 鶴鵠菜湯(三味鶴鵠菜湯)

〔成分・分量〕

海人草3-5、大黃1-1.5、甘草1-2

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

回虫の駆除

《備考》

注) 体力に関わらず、使用できる。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

- 104 蛇床子湯
〔成分・分量〕 蛇床子10、当帰10、威靈仙10、苦參10
〔用法・用量〕 水1,000mLを加えて濃縮し700mLとし外用する
〔効能・効果〕 ただれ、かゆみ、たむし
- 105 十全大補湯
〔成分・分量〕 人参2.5-3、黃耆2、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、當帰3-4、芍藥3、地黃3-4、川芎3、桂皮2-3、甘草1-2
〔用法・用量〕 湯(原則として)
〔効能・効果〕 体力虚弱などの次の諸症
病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
- 106 十味敗毒湯
〔成分・分量〕 柴胡2.5-3.5、桜皮(樸樹)2.5-3.5、桔梗2.5-3.5、川芎2.5-3.5、茯苓2.5-4、獨活1.5-3、防風1.5-3.5、甘草1-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、荊芥1-2、連翹2-3(連翹のない場合も可)
〔用法・用量〕
(1) 散:1回1.5-2g 1日3回
(2) 湯
〔効能・効果〕 体力中等度などの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症
化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫
- 107 潤腸湯
〔成分・分量〕 当帰3-4、熟地黃・乾地黃 各3-4(又は地黃6)、麻子仁2、桃仁2、杏仁2、枳實0.5-2、黃芩2、厚朴2、大黃1-3、甘草1-1.5
〔用法・用量〕
(1) 散:1回2-3g 1日3回
(2) 湯:上記量を1日量
〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるものの次の症状
便秘
- 108 蒸眼一方
〔成分・分量〕 白礬(明礬)2、甘草2、黃連2、黃柏2、紅花2
〔用法・用量〕 各生薬を混合後、水300mLを加え煎じて200mLとする。洗眼又は温湿布する。
〔効能・効果〕 ものもらい、ただれ目、はやり目

- 109 生姜瀉心湯
- [成分・分量] 半夏3.6-8、人参1.8-4、黄芩1.8-4、甘草1.8-4、大棗1.8-4、黄連0.6-1、乾姜0.6-2、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸症
食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭
- 110 小建中湯
- [成分・分量] 桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍藥6、甘草2-3、膠鯛20(マルツエキス、滋養糖可、水飴の場合40)
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症
小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き
- 111 小柴胡湯
- [成分・分量] 柴胡5-8、半夏3.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗2.5-3、人参2.5-3、甘草1-3
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症
食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状
- 112 小柴胡湯加桔梗石膏
- [成分・分量] 柴胡7、半夏5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、黄芩3、大棗3、人参3、甘草2、桔梗3、石膏10
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 比較的体力があり、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むものの次の諸症
のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎
- 113 小承気湯
- [成分・分量] 大黃2-4、枳実2-4、厚朴2-3
- [用法・用量] 湯
- [効能・効果] 比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状
便秘

- 114 小青竜湯
- 〔成分・分量〕 麻黄2-3.5、芍薬2-3.5、乾姜2-3.5、甘草2-3.5、桂皮2-3.5、細辛2-3.5、五味子1-3、半夏3-8
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るもの次の
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症
- 115 小青竜湯加杏仁石膏(小青竜湯合麻杏甘石湯)
- 〔成分・分量〕 麻黄2-4、芍薬2-3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮2-3、細辛2-3、五味子1.5-3、半夏3-6、杏仁4、石膏5-10
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症
気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき
- 116 小青竜湯加石膏
- 〔成分・分量〕 麻黄3、芍薬3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮3、細辛2-3、五味子2-3、半夏6-8、石膏2-5
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの
次の諸症
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒
- 117 椒梅湯
- 〔成分・分量〕 烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川棟子2、厚朴2、甘草2、乾姜2
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 回虫の駆除
- 《備考》 注)体力に関わらず、使用できる。
【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注
意〉として記載する。】
- 118 小半夏加茯苓湯
- 〔成分・分量〕 半夏5-8、ヒネショウガ5-8(生姜を用いる場合1.5-3)、茯苓3-8
- 〔用法・用量〕 湯
- 〔効能・効果〕 体力に関わらず使用でき、恶心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症
つわり、嘔吐、恶心、胃炎

119 消風散

〔成分・分量〕

当帰3、知母1-2、地黄3、胡麻1-1.5、石膏3-5、蝉退1-1.5、防風2、苦参1-1.5、蒼朮2-3(白朮も可)、荊芥1-2、木通2-5、甘草1-1.5、牛蒡子2

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強くて分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症
湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも

120 升麻葛根湯

〔成分・分量〕

葛根5-6、升麻1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、芍薬3、甘草1.5-3

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症
感冒の初期、湿疹・皮膚炎

121 逍遙散(八味逍遙散)

〔成分・分量〕

当帰3-4.5、芍薬3-4.5、柴胡3-4.5、白朮3-4.5(蒼朮も可)、茯苓3-4.5、甘草1.5-3、生姜0.5-1、薄荷葉1-2.1

〔用法・用量〕

湯

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症

冷え症、虚弱体质、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^{注)}、不眠症、神経症

《備考》

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴つて現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【注】表記については、効能・効果欄に記載するのではなく、〈効能・効果に関連する注意〉として記載する。】

122 四蒂湯

〔成分・分量〕

沢瀉4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、猪苓4

〔用法・用量〕

- (1) 散: 1回1-1.5g 1日2-3回
- (2) 湯

〔効能・効果〕

体力に関わらず使用でき、のどが渴いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症
暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ