

No	分類	農作物	試験 圃場数	試験条件			最大残留量 (ppm)	基準値 の選定	暴露評価の代表値 (平均値)		
				剤型	使用量・使用方法	回数				経過日数	
70	その他のハーブ	はっか(スベアミント) (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	8000倍散布 300L/10a	3回	7日	圃場A(3回,7日) HPLC	2.4	○	2.35
							7日	圃場B(3回,7日)	2.3		
		はっか(スベアミント) (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	<del>4000倍散布</del> (#) 300L/10a	3回	7日	圃場A(3回,7日) (#) HPLC	3.3	/	(適用外使用)
							7日	圃場B(3回,7日) (#)	4.0		
		タラゴン (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	4000倍散布 150L/10a	2回	14日	圃場A(2回,14日) HPLC	1.3	/	/
							14日	圃場B(2回,14日)	2.06		
		チャービル (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	8000倍散布 300L/10a	3回	21日	圃場A(3回,21日) HPLC	1.0	/	/
							21日	圃場B(3回,21日)	1.6		
		ディル (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	8000倍散布 300L/10a	3回	21日	圃場A(3回,21日) HPLC	< 0.5	/	/
							21日	圃場B(3回,21日)	0.46		
バジル (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	8000倍散布 300L/10a	3回	21日	圃場A(3回,21日) HPLC	1.9	/	/		
					21日	圃場B(3回,21日)	1.5				
みょうが (その他ハーブ) (花穂)	2	15%燻煙成型剤	くん煙処理(50g/400m <sup>3</sup> )	3回	1日	圃場A(3回,1日) HPLC	< 0.04	/	/		
					1日	圃場B(3回,1日→3日)	0.03				
マジョラム (その他ハーブ) (茎葉)	2	20%水溶剤	8000倍散布 300L/10a	3回	14日	圃場A(3回,14日) HPLC	0.5	/	/		
					14日	圃場B(3回,14日)	2.8				

(#) これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

△印は同作物群の試験中で最大の残留値であるが、暴露量評価には、平均値として残留量の高い試験成績を用いている。(基準設定の代表値の○印と同様の基準値(案)となる。)

最大残留量欄の「統一」、「GC」、「HPLC」等は分析の種類、「親」は親化合物 アセタミプリドのみの分析値を示す。

※印の試験は、適用拡大の申請によるものではないとされ、農薬登録の際の登録保留基準(5ppm)を超える試験成績として示されていることから、短期暴露量推計の試算も参照しつつ、今後、残留基準値の検討、農林水産省での使用方法の評価を行うこととする。

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「アセタミプリド」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。

アセタミプリド海外作物残留試験一覧表 (米国における作物残留試験結果)

No	分類	農作物	試験圃場	試験条件				最大残留量 (ppm)	
				剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
1-1	レタス	レタス (外側葉込) 1997年 アメリカ合衆国 ECD-GC法	6	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	7日 7日 7日 7日 7日	圃場A: 0.650 (5回、7日) 圃場B: 0.140 (5回、7日) 圃場C: 0.376 (5回、7日) 圃場D: 0.277 (5回、7日) 圃場E: 0.423 (5回、7日) 圃場F: 0.676 (5回、7日)	
		レタス (外側葉込)	2	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a	5回	7日 7日	圃場A: 0.061 (5回、7日) 圃場B: 0.257 (5回、7日)	
		レタス (外側葉を除く) 1997年 (アメリカ合衆国) ECD-GC法	6	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	7日 7日 7日 7日 7日	圃場A: 0.018 (5回、7日) 圃場B: 0.052 (5回、7日) 圃場C: < 0.01 (5回、7日) 圃場D: 0.060 (5回、7日) 圃場E: 0.170 (5回、7日) 圃場F: 0.274 (5回、7日)	
		レタス (外側葉を除く)	2	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a	5回	7日 7日	圃場A: 0.014 (5回、7日) 圃場B: 0.010 (5回、7日)	
		サラダ菜 1997年 (アメリカ合衆国) ECD-GC法	6	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	7日 7日 7日 7日 7日	圃場A: 0.606 (5回、7日) 圃場B: 0.298 (5回、7日) 圃場C: 0.412 (5回、7日) 圃場D: 0.959 (5回、7日) 圃場E: 0.868 (5回、7日) 圃場F: 0.116 (5回、7日)	
1-2		サラダ菜 1998年	2	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a	5回	7日 7日	圃場A: 0.106 (5回、7日) 圃場B: 0.457 (5回、7日)	
2	たまねぎ	たまねぎ (Bulb Onion) 2004年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	6	70%水和剤	0.148 Ib ai/A 12.69 g ai/10a 散布	4回	7日 7日 7日 7日 7日	圃場A: < 0.006 (5回、7日) 圃場B: < 0.006 (5回、7日) 圃場C: < 0.006 (5回、7日) 圃場D: 0.012 (5回、7日) 圃場E: < 0.006 (5回、7日) 圃場F: < 0.006 (5回、7日)	
3	ほうれんそう	ほうれん草 1997年 (アメリカ合衆国) ECD-GC法	5	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	7日 7日 7日 7日 7日	圃場A: 0.036 (5回、7日) 圃場B: 0.211 (5回、7日) 圃場C: 2.49 (5回、7日) 圃場D: 0.552 (5回、7日) 圃場E: 2.08 (5回、7日)	
		ほうれん草 1998年 (アメリカ合衆国)	3	70%水和剤	0.075 Ib ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	7日 7日 7日	圃場A: 0.031 (5回、7日) 圃場B: 1.13 (5回、7日) 圃場C: 0.464 (5回、7日)	
4	ラズベリー	ラズベリー 2006年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	1	30%粒剤	0.1 Ib ai/A 11.21 g ai/10a 散布	5回	1日	圃場A: 1.054 (5回、1日)	
		ラズベリー 2004年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	1	70%水和剤	0.2 Ib ai/A (#) 0.1 Ib ai/A 22.42g ai/10a 11.21g ai/10a 散布	3回	1日	圃場A: 0.779 (#) (3回、1日)	

No	分類	農作物	試験 圃場	試験条件				最大残留量 (ppm)	
				剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数		
5	ブラックベリー	ブラックベリー 2003年	2	70%水和剤	0.1 lb ai/A 11.21 g ai/10a	5回	1日 1日	圃場A: 0.531 圃場B: 0.564	(5回、1日) (5回、1日)
		ブラックベリー 2004年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS	3	70%水和剤	0.1 lb ai/A 11.21 g ai/10a 散布	5回	1日 8日 7日	圃場A: 0.545 圃場B: 0.302 圃場C: 0.302	(5回、1日) (5回、8日) (5回、7日)
			1	70%水和剤	0.4 lb ai /A (除) 0.1 lb ai/A 45.28g ai /10a 11.21g ai/10a 散布	2回 (除)	2日 (#)	圃場A: 2.484	(2回(除)、2日(#))
6	ブルーベリー	ブルーベリー 2004年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	6	70%水和剤	0.1 lb ai/A 11.21 g ai/10a 散布	5回	1日	圃場A: 0.0867	(5回、1日)
							1日 1日 1日 1日 1日	圃場B: 0.475 圃場C: 0.616 圃場D: 0.493 圃場E: 0.200 圃場F: 0.247	(5回、1日) (5回、1日) (5回、1日) (5回、1日) (5回、1日)
7	綿実	綿実 1997年 アメリカ合衆国	12	70%水和剤	0.1 lb ai/A 11.21 g ai/10a 散布	4回	28日	圃場A: 0.023	(4回、28日)
							28日 28日 28日 28日 28日 28日 28日 28日	圃場B: < 0.01 圃場C: 0.10 圃場D: < 0.01 圃場E: 0.056 圃場F: 0.12	(4回、28日) (4回、28日) (4回、28日) (4回、28日) (4回、28日) (4回、28日) (4回、28日)
8	ペカン	ペカン (分析部位:Nut) 2003年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	6	70%水和剤	0.179 lb ai/A 20.07 g ai/10a 散布	4回	28日	圃場A: 0.10	(4回、28日)
							28日 28日 28日 28日 28日 28日	圃場B: 0.02 圃場C: 0.50 (*) 圃場D: 0.36 圃場E: 0.029 圃場F: 0.14	(4回、28日) (4回、28日) (4回、28日) (4回、28日) (4回、28日)
9	アーモンド	アーモンド (NutおよびHull) 2003年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	5	70%水和剤	0.179 lb ai/A 20.07 g ai/10a 散布	4回	28日	圃場A: 0.09	(4回、28日)
							28日	圃場B: 0.048	(4回、28日)
8	ペカン	ペカン (分析部位:Nut) 2003年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	6	70%水和剤	0.179 lb ai/A 20.07 g ai/10a 散布	4回	14日	圃場A: < 0.01	(4回、14日)
							14日 14日 14日 14日 14日	圃場B: < 0.01 圃場C: < 0.01 圃場D: 0.047 圃場E: 0.009 圃場F: < 0.01	(4回、14日) (4回、14日) (4回、14日) (4回、14日) (4回、14日)
9	アーモンド	アーモンド (NutおよびHull) 2003年 (アメリカ合衆国) LC/MS/MS法	5	70%水和剤	0.179 lb ai/A 20.07 g ai/10a 散布	4回	14日	Nut*1: 圃場A: 0.022	(4回、14日)
							14日 14日 14日 14日 14日	圃場B: 0.012 圃場C: < 0.01 圃場D: 0.010 圃場E: < 0.01	(4回、14日) (4回、14日) (4回、14日) (4回、14日)
10	その他のハーブ	エシャロット (Green Onion) 1998年	3	70%水和剤	0.075 lb ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	14日	Hull*2: 圃場A: 1.90	(4回、14日)
							14日 14日	(参考) 圃場B: 3.83 圃場C: 0.222 圃場D: 1.99 圃場E: 0.779	(4回、14日) (4回、14日) (4回、14日) (4回、14日)
10	その他のハーブ	エシャロット (Green Onion) 1998年	3	70%水和剤	0.075 lb ai/A 8.41 g ai/10a 散布	5回	7日	圃場A: 0.050	(5回、7日)
							7日	圃場B: 1.960	(5回、7日)
							7日	圃場C: 0.384	(5回、7日)

(#) これらの作物残留試験は、作物残留試験が実施された国の使用方法の範囲内で試験が行われていない。  
(除) 登録内容・使用基準との対応が確認できないことから、評価対象から除外。  
(\*) スミルノフの棄却検定 ( $\alpha=0.05$ ) での外れ値  
\*1:Nut ナッツ\*2:Hull 外皮

農産物名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	国際 基準 ppm	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
					外国 基準値 ppm		
米							
小麦		0.2	○				
大麦		0.2	○				
ライ麦		0.2	○				
とうもろこし	0.2	0.2	○				<0.05, <0.05
そば		0.2	○				
その他の穀類		0.2	○		3加 (Amaranth)		
大豆		2	○				0.05, 0.60
小豆類	2	2	○				
えんどう		2	○	0.4	米 (Pea and bean, succulent shelled)		
そらまめ		2	○	0.4	米 (Pea and bean, succulent shelled)		
らつかせい		2	○				
その他の豆類		2	○				
ばれいしょ	0.2	0.5	○		0.05	薯 (Potato)	<0.05, <0.05
さといも類	0.2	0.5	○				<0.05, <0.05
かんしょ		0.5	○				
やまいも	0.05	0.5	○				0.01, 0.01
こんにゃくいも	0.2	0.5	○				<0.05, <0.05
その他のいも類		0.5	○				
てんさい	0.2	0.2	○				<0.05 (#), <0.05 (#)
さとうきび		0.2	○				
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.2	0.5	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		0.03 (#), <0.01 (#)
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy)		1.98 (#), 0.397 (#)
かぶ類の根	0.1	0.1	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		0.02, 0.02
かぶ類の葉	5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy)		1.02, 1.57
西洋わさび	0.05	0.1	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		<0.01, <0.01
クレソン		5	○	3	加 (Upland cress)		
はくさい	0.5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Napa Chinese cabbages)		0.15 (#), 0.18 (#)
キャベツ	3	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Cabbages)		1.09, 0.90
芽キャベツ	0.3	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Brussels sprouts)		<0.05, 0.10
ケール	5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Kale)		登録作物群; 非結球アブラナ科 葉菜類(こまつな, チンゲンサイ)
こまつな	5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Collards)		1.00, 1.76
きょうな	5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy)		1.00, 2.25
チンゲンサイ	5	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Bok choy Chinese cabbages)		2.72, 1.22
カリフラワー	1	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Cauliflower)		0.18, 0.34
ブロッコリー	2	5	○	1.2	米 (Vegetable, brassica, leafy), 加 (Cauliflower)		0.36 (#), 0.64 (#)
その他のあぶらな科野菜	5	5	○	3	加 (Garden cress)		0.88, 2.85 (非結球キャベツ)
ごぼう		0.1	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		
サルシフィー		0.1	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		
アーティチョーク		5	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		
チコリ		5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Radicchio)		
エンダイブ		5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Endival)		
しゅんぎく	5	5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Garland chrysanthemum)		2.02, 0.39
レタス	5	5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Head lettuce, Leaf lettuce)		2.67, 1.02 (ロメインレタス)
その他のきく科野菜	3	5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Cardoon, Edible leaved chrysanthemum)		【米国】レタス <0.01~0.274 (n=8), サラダ菜 0.106~0.959 (n=8) 1.28, 0.48 (食用キク)
たまねぎ	0.2	0.2	○	0.02	米 (Onion, bulb)		<0.05, <0.05
ねぎ	0.5	5	○	4.5	米 (Onion, green)		【米国】 <0.006 (n=5), 0.012
にんにく		0.2	○	0.02	米 (Onion, bulb)		0.14, 0.15
にら	5	5	○	4.5	米 (Onion, green)		1.84, 1.46
アスパラガス	0.5	5	○				0.20, 0.07
わけぎ	3	5	○	4.5	米 (Onion, green)		1.36, 0.14
その他のゆり科野菜	0.2	5	○	4.5	米 (Onion, green)		<0.05, <0.05 (食用ユリ)
にんじん		0.1	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		
パースニップ		0.1	○	0.01	米 (Vegetable, tuberous and corm)		
パセリ	3	5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Fresh parsley leaves)		1.10, 0.39
セロリ	2	5	○・申	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Celery)		0.85, 0.30
みつば	5	5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Chinese celery)		0.97, 1.82
その他のせり科野菜		5	○	3	米 (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Chinese celery)		
トマト	2	5	○・申	0.2	米 (Vegetable, fruiting) 加 (Tomatoes)		0.50 (#), 0.73 (#)
ピーマン	1	5	○・申	0.2	米 (Vegetable, fruiting) 加 (Bell peppers)		0.32, 0.43
なす	1	5	○・申	0.2	米 (Vegetable, fruiting) 加 (Eggplants)		0.15, 0.54, 0.50, 0.27
その他のなす科野菜	1	2	○	0.2	加 (Non-bell peppers, Tomatillos)		0.36, 0.28 (シトウ)

農産物名	基準値 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm	
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm		
きゅうり	2	5	○・申		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	0.32, 0.52
かぼちや	0.7	2	○		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	0.21, <0.05
しろうり		2	○		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	
すいか	0.3	0.5	○		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	0.06, 0.09
メロン類果実	0.5	1	○		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	0.16, 0.14
まくわうり		1	○		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	
その他のうり科野菜	0.5	2	○		0.5	* (Vegetable, cucurbit)	0.16, 0.20 (にがうり)
ほうれんそう	5	5	○		3	* (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Spinach, New Zealand spinach)	2.52, 1.66
たけのこ		0.1	○		0.01	* (Vegetable, tuberous and corn)	【米国】0.031~2.49 (n=8)
オクラ	1	1	○				0.41, 0.18
しようが		0.1	○		0.01	* (Vegetable, tuberous and corn)	
未成熟えんどう	2	5	○		0.6	* (Vegetable, legume, edible podded)	0.84, 0.26
未成熟いんげん	3	5	○		0.6	* (Vegetable, legume, edible podded)	1.45, 0.50, 0.52, 0.26
えだまめ	3	5	○		0.6	* (Vegetable, legume, edible podded)	1.42 (♯), 0.83 (♯)
マッシュルーム							
しいたけ							
その他のきのこ類							
その他の野菜	5	5	○・申		3	* (Vegetable, leafy, except brassica), 加 (Garden purslane, Orch leaves, Swiss chard, Vine spinach, Winter purslane)	1.8, 2.8 (ツルナ) (申; モロヘイヤ)
みかん	0.5	1	○		0.5	* (Fruit, citrus), 加 (Satsuma mandarins)	0.17, 0.02
なつみかん							
なつみかんの外果皮	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus)	0.54, 0.90
なつみかんの果実全体	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus), 加 (Lemons)	
レモン	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus), 加 (Oranges)	登録作物群; かんきつ (なつみかんの果実全体)
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus), 加 (Grapefruit, Pomegranate)	
グレープフルーツ	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus), 加 (Limes)	
ライム	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus)	
その他のかんきつ類果実	2	5	○		0.5	* (Fruit, citrus), 加 (Calamondin, Citrus citrons, Citrus hybrids, Kumquats, Tangerines)	0.88, 0.53 (カボス)
りんご	2	5	○		1	* (Fruits, pome), 加 (Apples, Crabapples)	0.39, 0.80
日本なし	2	5	○		1	* (Fruits, pome), 加 (Oriental pears)	0.28, 0.74
西洋なし	2	5	○		1	* (Fruits, pome), 加 (Pears)	登録作物群; なし (日本なし)
マルメロ		1	○		1	* (Fruits, pome), 加 (Quinces)	
びわ	0.1	1	○		1	加 (Loquats)	<0.01, 0.02
もも	2	5	○		1.2	* (Fruit, stone, except plum, prune)	0.69, 0.36
ネクタリン	1	1	○		1.2	* (Fruit, stone, except plum, prune)	0.28, 0.42
あんず(アブリコットを含む)	3	5	○		0.2	* (Plum, prune, fresh)	登録作物群; 小粒核果類 (すもも)
すもも(プルーンを含む)	3	5	○		0.2	* (Plum, prune, fresh)	0.12, 1.23
うめ	3	5	○				1.10, 0.62
おうとう(チェリーを含む)	2	5	○		1.2	* (Fruit, stone, except plum, prune)	0.92, 0.68
いちご	3	5	○		0.6	* (Berry, low growing subgroups)	0.46, 1.38
ラズベリー	1.6	5	○		1.6	* (Caneberry subgroup)	【米国】1.054, 0.779 (♯) 登録作物群; ベリー類 (ブラックベリー)
ブラックベリー	1.6	5	○		1.6	* (Caneberry subgroup)	【米国】0.302~0.564 (n=5)
ブルーベリー	2	5	○		1.6	* (Bushberry subgroup)	<0.5, 1.0 【米国】0.0867~0.616 (n=6)
クランベリー		5	○		0.6	* (Berry, low growing subgroups)	
ハuckleベリー		5	○		1.6	* (Bushberry subgroup)	
その他のベリー類果実	2	5	○		1.6	* (Bushberry, Caneberry, subgroup)	登録作物群; ベリー類 (ブルーベリー)
ぶどう	5	5	○		0.2	* (Grape), 加 (Grapes)	2.88, 2.51, 1.47
かき	1	1	○				0.40, 0.20
バナナ							
キウイ	0.2	1	○				<0.05, <0.05
パパイヤ		1	○				
アボカド		1	○				
パイナップル		1	○				
グアバ		1	○				
マンゴー	1	1	○				0.44, 0.44 (♯)
パッションフルーツ	0.7	1	○				0.04 (♯), 0.30 (♯)
なつめやし		5	○				
その他の果実	1	5	○		1	加 (Mayhaws)	0.44, 0.47 (イチジク)

農産物名	基準値 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値		作物残留試験成績 ppm
				国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
ひまわりの種子 ごまの種子 へにばなの種子 綿実	0.6	0.3			0.6 米 (Cotton, undelimited seed) 加 (Undelimited cotton seeds) 0.05 菜 (Cotton seed) 0.01 米 (Canola, seed), 加 (Rapeseed (canola))	【米国】 <0.01~0.50 (n=14)
なたね その他のオイルシード		0.01 0.01				
ざんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類	0.1 0.1				0.1 米 (Nut, tree) 0.1 米 (Nut, tree) 0.1 米 (Nut, tree) 5 米 (Almond, hulls) 0.1 米 (Nut, tree) 0.1 米 (Nut, tree, Pistachio)	【米国】 0.009~0.047 (n=6) 【米国】 Nut; <0.01~0.022 (n=6)
茶 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ	30	50	○・申			19.8(#), 21.4 (荒茶)
その他のスパイス	5	5	○		0.2 加 (Pepper hybrids)	2.0, 2.3 (さんしょう) (みかんの皮 2.76, 1.22)
その他のハーブ	5	5	○		3 加 (Argula, Corn salad, Dandelion leaves, Fresh chervil leaves, Fresh Florence fennel leaves and stalks)	2.4, 2.3 (はっか (スベアミント)) 【米国】 エシヤロット 0.050~1.960 (n=6)
牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 0.1 0.1	0.06 0.06 0.06			0.1 米 (Cattle, meat), 加 (Meat of cattle) 0.1 米 (Hog, meat), 加 (Meat of hogs) 0.1 米 (Goat, Sheep, meat), 加 (Meat of goats, Meat of sheep) 0.1 米 (Horse, meat), 加 (Meat of horses) 0.01 菜 (Meat (mammalian))	
牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪		0.1 0.1 0.1			0.1 米 (Cattle, fat), 加 (Fat of cattle) 0.1 米 (Hog, fat), 加 (Fat of hogs) 0.1 米 (Goat, Sheep, fat), 加 (Fat of goats, Fat of sheep) 米 (Horse, fat), 加 (Fat of horses)	
牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分		0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1			0.05 菜 (Edible offal (mammalian)) 0.05 菜 (Edible offal (mammalian)) 0.05 菜 (Edible offal (mammalian))	
乳 (牛乳、めん羊乳、山羊乳)	0.1	0.06			0.1 米 (Milk), 加 (Milk)	
鶏の筋肉 その他の家禽の筋肉 鶏の脂肪 その他の家禽の脂肪 鶏の肝臓 その他の家禽の肝臓 鶏の腎臓 その他の家禽の腎臓 鶏の食用部分 その他の家禽の食用部分 鶏の卵 その他の家禽の卵	0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01			0.05 菜 (Poultry, meat) 0.05 菜 (Poultry, meat) 0.01 米 (Poultry, fat), 加 (Fat of poultry) 0.01 米 (Poultry, fat), 加 (Fat of poultry) 0.05 米 (Poultry, Liver), 加 (Liver of poultry) 0.05 米 (Poultry, Liver), 加 (Liver of poultry) 0.05 菜 (Poultry, Edible offal of) 0.05 菜 (Poultry, Edible offal of) 0.01 米 (Eggs), 菜 (Eggs), 加 (Eggs) 0.01 米 (Eggs), 菜 (Eggs), 加 (Eggs)	
魚介類						

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において設定された基準値については、網をつけて示した。

【国名】として、基準設定の根拠とされた海外作物残留試験(米国)の該当結果を示す。

(#) これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

アセタミプリド 推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値 案 (ppm)	暴露評価 に 用いた数 値 (ppm)	国民平 均 TMDI	国民平 均 EDI	幼小児 (1~6 歳) TMDI	幼小児 (1~6 歳) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以 上) TMDI	高齢者 (65歳以 上) EDI
とうもろこし	0.2	0.05	0.5	0.1	0.9	0.2	0.5	0.1	0.2	0.0
小豆類	2	0.33	2.8	0.5	1.0	0.2	0.2	0.0	5.4	0.9
ばれいしょ	0.2	0.05	7.3	1.8	4.3	1.1	8.0	2.0	5.4	1.4
さといも類	0.2	0.05	2.3	0.6	1.1	0.3	1.6	0.4	3.5	0.9
やまいも (長いも)	0.05	0.01	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
こんにゃくいも	0.2	0.05	2.6	0.6	1.1	0.3	2.2	0.6	2.7	0.7
てんさい	0.2	0.05	0.9	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.8	0.2
だいこん類 (ラディッシュを含む) の根	0.2	0.02	9.0	0.9	3.7	0.4	5.7	0.6	11.7	1.2
だいこん類 (ラディッシュを含む) の葉	5	1.19	11.0	2.6	2.5	0.6	4.5	1.1	17.0	4.0
かぶ類の根	0.1	0.02	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1
かぶ類の葉	5	1.30	2.5	0.6	0.5	0.1	1.5	0.4	5.5	1.4
西洋わさび	0.05	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
はくさい	0.5	0.17	14.7	5.0	5.2	1.8	11.0	3.7	15.9	5.4
キャベツ	3	1.00	68.4	22.8	29.4	9.8	68.7	22.9	59.7	19.9
芽キャベツ	0.3	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ケール	5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
こまつな	5	1.38	21.5	5.9	10.0	2.8	8.0	2.2	29.5	8.1
きょうな	5	1.63	1.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	1.5	0.5
デンゲンサイ	5	1.97	7.0	2.8	1.5	0.6	5.0	2.0	9.5	3.7
カリフラワー	1	0.26	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1
ブロッコリー	2	0.50	9.0	2.3	5.6	1.4	9.4	2.4	8.2	2.1
その他のあぶらな科野菜	5	1.87	10.5	3.9	1.5	0.6	1.0	0.4	15.5	5.8
しゅんぎく	5	1.21	12.5	3.0	3.0	0.7	9.5	2.3	18.5	4.5
レタス	5	1.85	30.5	11.3	12.5	4.6	32.0	11.8	21.0	7.8
その他きく科野菜	3	0.87	1.2	0.3	0.3	0.1	1.5	0.4	2.1	0.6
たまねぎ	0.2	0.05	6.1	1.5	3.7	0.9	6.6	1.7	4.5	1.1
ねぎ (リーキ)	0.5	0.15	5.7	1.7	2.3	0.7	4.1	1.2	6.8	2.0
にら	5	1.65	8.0	2.6	3.5	1.2	3.5	1.2	8.0	2.6
アスパラガス	0.5	0.14	0.5	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1
フケギ	3	0.75	0.6	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.9	0.2
その他のゆり科野菜	0.2	0.05	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1
パセリ	3	0.75	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
セロリ	2	0.58	0.8	0.2	0.2	0.1	0.6	0.2	0.8	0.2
みつば	5	1.40	1.0	0.3	0.5	0.1	0.5	0.1	1.0	0.3
トマト	2	0.62	48.6	15.1	33.8	10.5	49.0	15.2	37.8	11.7
ピーマン	1	0.38	4.4	1.7	2.0	0.8	1.9	0.7	3.7	1.4
ナス	1	0.37	4.0	1.5	0.9	0.3	3.3	1.2	5.7	2.1
その他ナス科野菜	1	0.32	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1
きゅうり	2	0.42	32.6	6.8	16.4	3.4	20.2	4.2	33.2	7.0
カボチャ	0.7	0.13	6.6	1.2	4.1	0.8	4.8	0.9	8.1	1.5
ずいか	0.3	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メロン類	0.5	0.15	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
その他ウリ科野菜	0.5	0.18	0.3	0.1	0.1	0.0	1.2	0.4	0.4	0.1
ほうれん草	5	2.09	93.5	39.1	50.5	21.1	87.0	36.4	108.5	45.4
オクラ	1	0.30	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1
未成熟えんどう	2	0.55	1.2	0.3	0.4	0.1	1.4	0.4	1.2	0.3
未成熟インゲン	3	0.68	5.7	1.3	3.6	0.8	5.4	1.2	5.4	1.2
えだまめ	3	1.13	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
その他の野菜	5	2.30	63.0	29.0	48.5	22.3	48.0	22.1	61.0	28.1
みかん	0.5	0.10	20.8	4.0	17.7	3.4	22.9	4.4	21.3	4.0
なつみかんの果実全体	2	0.72	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
レモン	2	2	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
オレンジ	2	2	0.8	0.8	1.2	1.2	1.6	1.6	0.4	0.4
グレープフルーツ	2	2	2.4	2.4	0.8	0.8	4.2	4.2	1.6	1.6
ライム	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他のかんきつ類果実	2	0.71	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	1.2	0.4
りんご	2	0.60	70.6	21.2	72.4	21.7	60.0	18.0	71.2	21.4
日本なし	2	0.51	10.2	2.6	8.8	2.2	10.6	2.7	10.2	2.6
西洋なし	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
びわ	0.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
もも	2	0.53	1.0	0.3	1.4	0.4	8.0	2.1	0.2	0.1
ネクタリン	1	0.35	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
アンズ (含アブリコット)	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
スモモ	3	0.68	0.6	0.1	0.3	0.1	4.2	1.0	0.6	0.1
ウメ	3	0.86	3.3	0.9	0.9	0.3	4.2	1.2	4.8	1.4
おうとう	2	0.80	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
イチゴ	3	0.92	0.9	0.3	1.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1
ラズベリー	1.6	0.92	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1

食品群	基準値案 (ppm)	暴露評価に用いた数値 (ppm)	国民平均 TMDI	国民平均 EDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	幼小児 (1~6歳) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI
ブラックベリー	1.6	0.45	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
ブルーベリー	2	0.75	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
その他ベリー類	2	● 2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ブドウ	5	2.29	29.0	13.3	22.0	10.1	8.0	3.7	19.0	8.7
かき	1	0.30	31.4	9.4	8.0	2.4	21.5	6.5	49.6	14.9
キウイ	0.2	0.05	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1
マンゴー	1	0.44	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
パッションフルーツ	0.7	0.17	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
その他の果実	1	0.46	3.9	1.8	5.9	2.7	1.4	0.6	1.7	0.8
綿実 (種子)	0.6	0.12	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
ペカン	0.1	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.1	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	30	20.6	90.0	61.8	42.0	28.8	105.0	72.1	129.0	88.6
その他のスパイス	5	2.15	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
その他のハーブ	5	2.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
陸棲ほ乳類の肉類	0.1	☆ 1.1	5.8	63.3	3.3	36.2	6.1	66.6	5.8	64.2
陸棲ほ乳類の乳類	0.1	● 0.1	14.3	14.3	19.7	19.7	18.3	18.3	14.5	14.5
家禽の肉類	0.01	● 0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
家禽の卵類	0.01	● 0.01	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
計	-	-	791.4	369.5	468.1	223.0	692.3	347.7	860.2	402.6
ADI比 (%)	-	-	20.9	9.8	41.7	19.9	17.5	8.8	22.4	10.5

●印は、個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うに当たり、基準値(案)の数値を用いた。  
 ☆印は、牛肉中の代謝物 IM-2-2 (IM-2-1 - amide) の残留も勘案し、基準値(案)の11倍の暴露量をもって推計。  
 (EPA 11/5/2004 MEMORANDUM)

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)  
 EDI: 推定一日摂取量 (Estimated Daily Intake)



(参考)

これまでの経緯

- 平成 7年11月28日 初回農薬登録
- 平成 9年 9月 1日 ばれいしょ等24農作物に食品衛生法に基づく残留農薬基準を設定
- 平成11年 8月24日 環境庁登録保留基準の改定(第二葉菜類等)
- 平成17年11月29日 食品衛生法改正に伴う残留農薬基準の告示
- 平成20年 2月12日 厚生労働大臣から食品安全委員長あてに残留基準設定に係る食品健康影響評価について要請
- 平成20年 2月14日 第226回 食品安全委員会(要請事項説明)
- 平成20年 5月13日 第21回 農薬専門調査会総合評価第一部会
- 平成20年 6月 3日 第39回 農薬専門調査会幹事会
- 平成20年 6月19日 第243回 食品安全委員会(報告)
- 平成20年 6月19日～ 7月18日 国民からの意見・情報の募集
- 平成20年 8月 6日 第24回 農薬専門調査会 総合評価第一部会
- 平成20年 8月26日 農薬専門調査会座長より食品安全委員会委員長への報告
- 平成20年 8月28日 第252回 食品安全委員会(報告)
- 平成20年 8月29日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評価について通知
- 平成20年12月 4日 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会へ諮問
- 平成20年12月 9日 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部会

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

- 青木 宙 東京海洋大学 大学院海洋科学技術研究科 教授
- 井上 松久 北里大学 副学長
- 大野 泰雄 国立医薬品食品衛生研究所 副所長
- 尾崎 博 東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授
- 加藤 保博 財団法人 残留農薬研究所 理事
- 斉藤 貢一 星薬科大学 薬品分析化学教室 准教授
- 佐々木 久美子 元国立医薬品食品衛生研究所 第一室長
- 志賀 正和 元独立行政法人 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター 虫害防除部長
- 豊田 正武 実践女子大学 生活科学部 生活基礎化学研究室 教授
- 松田 りえ子 国立医薬品食品衛生研究所 食品部長
- 山内 明子 日本生活協同組合連合会 組織推進本部 本部長
- 山添 康 東北大学 大学院薬学研究科 医療薬学講座薬物動態学分野 教授

吉池 信男 公立大学法人 青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科長  
由田 克士 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 栄養疫学プログラム  
プログラムリーダー  
鰐淵 英機 大阪市立大学 大学院医学研究科 都市環境病理学 教授  
(○：部会長)