


## MRワクチン【2期】接種前後の抗体価の変動 風疹(EIA-G)

〈2006年6月2日～2008年12月31日〉

接種前 EIA値	接種後抗体価上昇			合計
	≥2倍	1.5倍	不変	
<<2.0	54	0	2	56
2.0<<4.0	57	0	1	58
4.0<<8.0	93	18	13	124
8.0<<16.0	72	45	51	168
16.0<<32.0	40	24	78	142
32.0<<64.0	3	10	46	59
64.0<<128.0	1	0	17	18
128.0<	0	0	1	1
合計	320	97	209	626

Pre <2→Post ≥2 : ≥2倍として集計




8

## MRワクチン【3期:12-13歳】接種前後の抗体価の変動 麻疹(EIA-G)

〈2006年6月2日～2008年12月31日〉

接種前 EIA値	接種後抗体価上昇			合計
	≥2倍	1.5倍	不変	
<<2.0	4	0	0	4
2.0<<4.0	4	0	0	4
4.0<<8.0	7	0	0	7
8.0<<16.0	13	2	1	16
16.0<<32.0	2	1	1	4
32.0<<64.0	1	1	2	4
64.0<<128.0	0	0	0	0
128.0<	0	0	1	1
合計	31	4	5	40

Pre <2→Post ≥2 : ≥2倍として集計



9