

MRワクチン【4期:17-18歳】接種前後の抗体価の変動 麻疹(EIA-G)


〈2006年6月2日~2008年12月31日〉

(人数)

接種後抗体価上昇

接種前 EIA値	接種後抗体価上昇			合計
	≥2倍	1.5倍	不変	
<2.0	1	0	0	1
2.0<4.0	3	0	0	3
4.0<8.0	7	0	0	7
8.0<16.0	4	4	1	9
16.0<32.0	1	1	1	3
32.0<64.0	0	0	2	2
64.0<128.0	0	0	0	0
128.0<	0	0	2	2
合計	16	5	6	27

Pre <2→Post ≥2 : ≥2倍として集計



10

MRワクチン【3期:12-13歳】接種前後の抗体価の変動 風疹(EIA-G)


〈2006年6月2日~2008年12月31日〉

(人数)

接種後抗体価上昇

接種前 EIA値	接種後抗体価上昇			合計
	≥2倍	1.5倍	不変	
<2.0	3	0	0	3
2.0<4.0	6	0	0	6
4.0<8.0	9	2	1	12
8.0<16.0	6	1	4	11
16.0<32.0	0	1	6	7
32.0<64.0	0	0	1	1
64.0<128.0	0	0	0	0
128.0<	0	0	0	0
合計	24	4	12	40

Pre <2→Post ≥2 : ≥2倍として集計



11