


厚生労働省発食安第0304004号
平成 21 年 3 月 4 日

薬事・食品衛生審議会
会長 望月正隆 殿

厚生労働大臣 外添要



諮問書

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。

記

次に掲げる農薬の食品中の残留基準設定について

クロラントラニリプロール

平成21年3月23日

薬事・食品衛生審議会
食品衛生分科会長 岸 玲子 殿

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会長 大野 泰雄

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
農薬・動物用医薬品部会報告について

平成21年3月4日厚生労働省発食安第0304004号をもって諮問された、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づくクロラントラニリプロールに係る食品規格(食品中の農薬の残留基準)の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。

クロラントラニリプロール

1. 品目名：クロラントラニリプロール (Chlorantraniliprole)

2. 用途：殺虫剤


アントラニリックジアミド系の殺虫剤であり、昆虫の筋肉細胞内のカルシウムチャネルに作用してカルシウムイオンを放出させ、筋収縮を起こさせることにより殺虫効果を示すと考えられている。

3. 化学名

3-bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1*H*-pyrazole-5-carboxamide (IUPAC)

3-bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl-1*H*-pyrazole-5-carboxamide (CAS)

4. 構造式及び物性



分子式	C ₁₈ H ₁₄ BrCl ₂ N ₅ O ₂
分子量	483.15
水溶解度	1.023 mg/L (20°C)
分配係数	log ₁₀ Pow=2.76 (20°C)

(メーカー提出資料より)

5. 適用病害虫の範囲及び使用方法

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。

また、「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針について」(平成16年2月5日付け食安発第0205001号)に基づき、米、ばれいしょ、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チングンサイ、ブロッコリー、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、かぼちゃ、しろうり、スイカ、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、その他の野菜、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、アンズ、すもも、ぶどう、綿実、陸棲哺乳類の肉類及び陸棲哺乳類の乳類に係る残留基準の設定が要請されている。

(1) 国内での使用方法

① 5%クロラントラニリプロール水和剤 (フロアブル)

作物名	適用 病害虫名	希釀 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロラントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数	
キャベツ	コガ アオムシ ヨトウムシ ハスモシヨトウ	100倍	セル成型育苗トレー1箱またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壤 約1.5~4L) 当たり0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)	
	ハイマダラノメイガ	2000倍	100~300L/10a	収穫 3日前まで	3回以内	散布		
はくさい	コガ アオムシ ヨトウムシ	100倍	セル成型育苗トレー1箱またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壤 約1.5~4L) 当たり0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)	
		2000倍	100~300L/10a	収穫 3日前まで	3回以内	散布		
レタス	ナモクリバエ ハスモシヨトウ オタバコガ カブリヤカ	100倍	セル成型育苗トレー1箱またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壤 約1.5~4L) 当たり0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)	
	ナモクリバエ	1000~2000倍	100~300L/10a	収穫 3日前まで	3回以内	散布		
	ハスモシヨトウ オタバコガ ヨトウムシ	2000倍						

① 5% クロラントラニリプロール水和剤（フロアブル）（続き）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	コガメ、 アオムシ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫 3日前まで	3回 以内	散布	3回以内
	トマトハモグリバエ	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
きゅうり	トマトハモグリバエ	100～ 200倍	1株当たり 25mL	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、 散布は3回以内)
		1000～ 2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
なす	トマトハモグリバエ	100倍	1株当たり 25mL	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		1000～ 2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	
	ハスモヨトウ	2000倍					
いちご	ハスモヨトウ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
ねぎ	シロ仔モヨトウ			収穫 3日前まで	3回以内		3回以内
だいす	ハスモヨトウ	4000倍		収穫 7日前まで			
えだまめ				収穫 3日前まで			

② 10% クロラントラニリプロール水和剤（フロアブル）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
茶	チャノカクモハマキ チャノホリガ	2000倍	200～ 400L/10a	摘採 3日前まで	1回		1回
りんご	シクイムシ類	2500～ 5000倍	200～ 700L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	ハマキムシ類 キンモンボウガ ギンモンハモグリガ	5000倍					
とうとう	アメリカシロトリ	2500倍			2回以内		2回以内
すもも	シクイムシ類	2500倍					
なし	シクイムシ類	5000倍					
もも	シクイムシ類	5000倍			2回以内		2回以内
ナタリン	モモハモグリガ						

③ 1%クロラントラニリプロール粒剤

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロラントラニリプロール を含む農薬の 総使用回数
稻	コバノメイガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壤約5L) 1箱当たり50g	移植当日	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する	1回

(2) 海外での使用方法（米国）

① 20%クロラントラニリプロール水和剤

作物名	1回当たりの 使用量	本剤の 使用回数	栽培期間中の 総使用量	使用時期	使用方法
果菜類	29.3~109.5 g ai/ha	4回	219 g ai/ha	収穫前日まで	散布、灌注
あぶらな属野菜				収穫3日前まで	
葉菜類 (あぶらな属を除く)				収穫前日まで	
うり科野菜				収穫前日まで	

② 35%クロラントラニリプロール顆粒水和剤

作物名	1回当たりの 使用量	本剤の 使用回数	栽培期間中 の 総使用量	使用時期	使用方法
仁果類	37~110.5 g ai/ha	4回	221 g ai/ha	収穫14日前まで	散布
ばれいしょ	37~74 g ai/ha		222 g ai/ha		
核果類	37~110.5 g ai/ha		221 g ai/ha	収穫10日前まで	
ぶどう	37~110.5 g ai/ha			収穫14日前まで	
綿	49~110.5 g ai/ha			収穫21日前まで	

6. 作物残留試験結果

(1) 分析の概要

① 分析対象の化合物

- クロラントラニリプロール

② 分析法の概要

試料を含水アセトニトリルで抽出し、陰イオン交換ミニカラム及びポリマー系ミニカラムで精製し、高速液体クロマトグラフィー質量分析計(LC/MS)を用いて定量する。

定量限界: 0.01 ppm

(2) 作物残留試験結果

① 水稻

水稻（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1%粒剤を育苗箱あたり50g散布したところ、散布後119～137日の最大残留量^{注1)}は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール: <0.01、<0.01 ppm

水稻（稻わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1%粒剤を育苗箱あたり50g散布したところ、散布後119～137日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール: 0.01、0.02 ppm

② だいいず

だいいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの4000倍希釈液を計3回散布（200L/10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール: 0.03、<0.01 ppm

③ えだまめ

えだまめ（さや）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの4000倍希釈液を計3回散布（150～200, 200L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール: 0.14、0.32 ppm

④ はくさい

はくさい（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期にセル成型育苗トレイ（30×60 cm）1箱あたり500 mL灌注処理し、生育期に2000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール: 0.26、0.46 ppm

⑤キャベツ

キャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期にセル成型育苗トレイ（30×60 cm）1箱あたり500 mL灌注処理し、生育期に2000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.12、0.12 ppm

⑥ブロッコリー

ブロッコリー（花蕾）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期にセル成型育苗トレイ（30×60 cm）1箱あたり500 mL灌注処理し、生育期に2000倍希釈液を3回散布（200, 70～150L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行なわれていない。

クロラントラニリプロール：0.20、0.10 ppm

⑦レタス

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期にセル成型育苗トレイ（30×60 cm）1箱あたり500 mL灌注処理し、生育期に1000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：3.00、0.60 ppm

⑧ねぎ

ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの2000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.21、0.66 ppm

⑨トマト

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期に一株あたり25 mL灌注処理し、生育期に1000倍希釈液を3回散布（200L/10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行なわれていない。

クロラントラニリプロール：0.04、0.19 ppm

⑩なす

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期に一株あたり25 mL灌注処理し、生育期に1000倍希釈液を2回散布（200L/10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.06、0.26 ppm

⑪きゅうり

きゅうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの100倍希釈液を育苗期に一株あたり25 mL灌注処理し、生育期に1000倍希釈液を3回散布（200, 300L/10a）したところ、散布後1~14日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.05、0.07 ppm

⑫りんご

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの2500倍希釈液を計3回散布（600, 500L/10a）したところ、散布後3~21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.31、0.10 ppm

⑬なし

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの2500倍希釈液を計3回散布（400, 700L/10a）したところ、散布後3~21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.16、0.18 ppm

⑭もも

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの5000倍希釈液を計2回散布（400, 500L/10a）したところ、散布後3~21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.02、<0.01 ppm

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの5000倍希釈液を計2回散布（400, 500L/10a）したところ、散布後3~21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：1.67、0.70 ppm

⑮ネクタリン

ネクタリン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの5000倍希釈液を計2回散布（400L/10a）したところ、散布後3~21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.11、0.08 ppm

⑯すもも

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの2500倍希釈液を計3回散布（500L/10a）したところ、散布後3~21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.04、0.08 ppm

⑯とうとう

とうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの2500倍希釈液を計3回散布（700, 500L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.38、0.23 ppm

⑰いちご

いちご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、5%フロアブルの2000倍希釈液を計2回散布（200L/10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：0.23、0.30 ppm

⑲茶

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの2000倍希釈液を1回散布（400L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：29.8、38.6 ppm

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、10%フロアブルの2000倍希釈液を1回散布（400L/10a）したところ、散布後3～21日の最大残留量は以下のとおりであった。

クロラントラニリプロール：16.9、19.6 ppm

なお、これらの試験結果の概要については、別紙1-1、海外で実施された作物残留試験成績の結果の概要については、別紙1-2を参照。

注1) 最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それぞれの試験から得られた残留量。

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）

注2) 適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない条件を斜体で示した。

7. 乳牛における残留試験結果

乳牛に対してクロラントラニリプロール1、3、10及び50 ppm相当を含有するゼラチンカプセルを28日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓中のクロラントラニリプロールを測定した。また、牛乳については、投与開始後、1、3、5、7、10、14、21、

28日目に搾乳したものを測定し、14及び21日後に採取した牛乳より調製したスキムミルク及びクリーム試料についても測定した（定量限界：0.010 ppm）。結果については表1参照。

表1. 組織中の最大残留 (ppm)

	1ppm 投与群	3ppm 投与群	10ppm 投与群	50ppm 投与群
筋肉	<0.009	<0.004	<0.009	0.029
脂肪	0.004	0.015	0.036	0.16
肝臓	0.005	0.014	0.035	0.13
腎臓	<0.003	<0.009	0.035	0.081
牛乳	<0.003	<0.003	0.009	0.034
スキムミルク	0.003	<0.003	<0.004	0.026
クリーム	0.004	0.031	0.039	0.19

・定量限界 (0.010 ppm) 未満でも検出限界 (0.003 ppm) を超えていた場合は、有効数字1桁で表中に記載し、該当するセルに網をかけて示した。

上記の結果に関連して、米国とカナダにおける作物残留試験から、肉牛で 1.51 ppm、乳牛で 1.62 ppm と算出された maximum dietary burden^{注)} を基に、米国では陸棲哺乳類の肉及び乳に対して、0.01 ppm の残留基準を設定している。

注) maximum dietary burden : 飼料として用いられる各作物ごとに、残留試験で認められた最大濃度、飼料の乾燥度合及び給与割合を掛け合わせ、それらの値を合計することにより、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる農薬の最大量を算出したもの。飼料中残留濃度として示される。

8. 魚介類への推定残留量

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省から魚介に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農薬の水産動植物被害予測濃度^{注1)} 及び生物濃縮係数 (B C F : Bioconcentration Factor) から、以下のとおり魚介類中の推定残留量を算出した。

(1) 水産動植物被害予測濃度

本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面においても使用されることから、水田 P E C tier2^{注2)} 及び非水田 P E C tier1^{注3)} について算出したところ、水田 P E C tier2 は 0.19 ppb、非水田 P E C tier1 は 0.0044 ppb となったことから、水田 P E C tier2 の 0.19 ppb を採用した。

(2) 生物濃縮係数

本農薬はオクタノール水/分配係数($\log_{10}\text{Pow}$)が2.76であり、魚類濃縮性試験が実施されていないことから、BCFについては実測値が得られていない。このため、 $\log_{10}\text{Pow}$ から、相関式 ($\text{Log}_{10}\text{BCF} = 0.80\text{Log}_{10}\text{Pow} - 0.52$) を用いて48.8と算出された。

(3) 推定残留量

(1) 及び(2)の結果から、水産動植物被害予測濃度：0.19 ppb、BCF：48.8とし、下記のとおり推定残留量が算出された。

$$\text{推定残留量} = 0.19 \text{ ppb} \times (\text{BCF} \times 5) = 0.04636 \text{ ppm} \doteq 0.05 \text{ ppm}$$

注1) 農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止にかかる農薬の登録保留基準設定における規定に準拠

注2) 水田中や河川中での農薬の分解や土壤・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したもの。

注3) 既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。

(参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設定方法」報告書)

9. ADIの評価

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平成20年3月25日付け厚生労働省発食安第0325001号により食品安全委員会にて意見を求めたクロラントラニリプロールに係る食品健康影響評価について、以下のとおり評価されている。

無毒性量：26.1 mg/kg 体重/day

(動物種)	マウス
(投与方法)	混餌
(試験の種類)	発がん性試験
(期間)	18カ月間

安全係数：100

ADI : 0.26 mg/kg 体重/day

10. 諸外国における状況

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。米国、カナダ、欧州連合(EU)、オーストラリア及びニュージーランドについて調

査した結果、米国においてあぶらな科野菜等に、オーストラリアにおいてりんご等に、EUにおいてぶどう等に、カナダにおいてセロリ等に基準が設定されている。

1.1. 基準値案

(1) 残留の規制対象

クロラントラニリプロール本体

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対象物質としてクロラントラニリプロール（親化合物のみ）と設定している。

(2) 基準値案

別紙2のとおりである。

(3) 暴露評価

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される量のクロラントラニリプロールが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大1日摂取量(TMDI))のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全くないと仮定の下におこなった。

	TMD I / AD I (%) ^{注)}
国民平均	8.2
幼小児（1～6歳）	14.3
妊婦	6.8
高齢者（65歳以上）	8.9

注) TMD I 試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。

クロラントラニリプロール 作物残留試験一覧表

農作物	試験圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm) 【クロラントラニリプロール】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
水稻 (玄米)	2	1%粒剤	50g/箱 散布	1回	119, 137日	圃場A : <0.01 (1回、137日) 圃場B : <0.01 (1回、119日)
水稻 (稻わら)	2	1%粒剤	50g/箱 散布	1回	119, 137日	圃場A : 0.01 (1回、137日) 圃場B : 0.02 (1回、119日)
だいす (乾燥子実)	2	5%フロアブル剤	4000倍散布 200L/10a	3回	3, 14, 21日	圃場A : 0.03 圃場B : <0.01
えだまめ (さや)	2	5%フロアブル剤	4000倍散布 150~200, 200L/10a	3回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.14 圃場B : 0.32
キャベツ (葉球)	2	5%フロアブル剤	100倍500mL/セトレイ灌注 +2000倍散布, 200 L/10a	4回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.12 (4回、7日) 圃場B : 0.12
はくさい (茎葉)	2	5%フロアブル剤	100倍500mL/セトレイ灌注 +2000倍散布, 200 L/10a	4回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.26 圃場B : 0.46
ブロッコリー (花蕾)	2	5%フロアブル剤	100倍500mL/セトレイ灌注 +2000倍散布, 200, 70~150 L/10a	4回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.20 (4回、3日) (#) 圃場B : 0.10 (4回、3日) (#)
レタス (茎葉)	2	5%フロアブル剤	100倍500mL/セトレイ灌注 +1000倍散布, 200 L/10a	4回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 3.00 (4回、7日) 圃場B : 0.60
ねぎ (茎葉)	2	5%フロアブル剤	2000倍散布 200L/10a	3回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.21 圃場B : 0.66
トマト (果実)	2	5%フロアブル剤	100倍25mL/ボット灌注 +1000倍散布, 200 L/10a	4回	1, 7, 14日	圃場A : 0.04 (4回、7日) (#) 圃場B : 0.19 (4回、1日) (#)
なす (果実)	2	5%フロアブル剤	100倍25mL/ボット灌注 +1000倍散布, 200 L/10a	3回	1, 7, 14日	圃場A : 0.06 圃場B : 0.26
きゅうり (果実)	2	5%フロアブル剤	100倍25mL/ボット灌注 +1000倍散布, 200, 300 L/10a	4回	1, 7, 14日	圃場A : 0.05 圃場B : 0.07
りんご (果実)	2	10%フロアブル剤	2500倍散布 500, 600L/10a	3回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.31 圃場B : 0.10
なし (果実)	2	10%フロアブル剤	2500倍散布 400, 700L/10a	3回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.16 圃場B : 0.18
もも (果肉)	2	10%フロアブル剤	5000倍散布 400, 500L/10a	2回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.02 圃場B : <0.01
もも (果皮)	2	10%フロアブル剤	5000倍散布 400, 500L/10a	2回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 1.67 圃場B : 0.70
ネクタリン (果実)	2	10%フロアブル剤	5000倍散布 400L/10a	2回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.11 圃場B : 0.08
すもも (果実)	2	10%フロアブル剤	2500倍散布 500L/10a	3回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.04 (3回、14日) 圃場B : 0.08
とうとう (果実)	2	10%フロアブル剤	2500倍散布 500, 700L/10a	3回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 0.38 圃場B : 0.23
いちご (果実)	2	5%フロアブル剤	2000倍散布 200L/10a	2回	1, 7, 14日	圃場A : 0.23 圃場B : 0.30
茶 (荒茶)	2	10%フロアブル剤	2000倍散布 400L/10a	1回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 29.8 圃場B : 38.6
茶 (浸出液)	2	10%フロアブル剤	2000倍散布 400L/10a	1回	3, 7, 14, 21日	圃場A : 16.9 圃場B : 19.6

最大使用条件下の作物残留試験に、アンダーラインを付している。

なお、食品安全委員会の農薬評価書「クロラントラニリプロール」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。

クロラントラニリプロール 海外作物残留試験一覧表

農作物	試験 圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm) 【クロラントラニリプロール】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
ばれいしょ (塊茎)	18	35%顆粒水和剤	0.209lb ai/A	3回	14日	圃場A : <0.003 圃場B : <0.003 圃場C : 0.004 (3回、3日) 圃場D : <0.003
						圃場E : <0.003 圃場F : <0.003 圃場G : <0.003 圃場H : <0.003 圃場I : <0.003 圃場J : <0.003 圃場K : 0.005 圃場L : 0.003 圃場M : <0.003 圃場N : <0.003 圃場O : <0.003 圃場P : <0.003 圃場Q : <0.003
ばれいしょ (塊茎)	1	35%顆粒水和剤	1.017 lb ai/A	3回	14日	圃場R : <0.003 圃場S : 0.004
						圃場A : 0.004 (#)
キャベツ (葉球) 外葉あり	7	20%プロアフル剤	0.209 lb ai/A	2回	3日	圃場A : 0.72 圃場B : 0.31 圃場C : 0.043 圃場D : 0.64 圃場E : 0.52 圃場F : 1.2 圃場G : 0.78
キャベツ (葉球) 外葉なし	3	20%プロアフル剤	0.209 lb ai/A	2回	3日	圃場A : 0.054 圃場B : 0.098 圃場C : 0.092
ブロッコリー (頭部及び茎)	7	20%プロアフル剤	0.208 lb ai/A	2回	3日	圃場A : 0.34 圃場B : 0.36 圃場C : 0.41 圃場D : 0.44 圃場E : 0.36 圃場F : 0.13
						圃場G : 0.71 (2回、1日)
からしな (茎葉部)	6	20%プロアフル剤	0.209 lb ai/A	2回	3日	圃場A : 1.8 圃場B : 4.7 圃場C : 1.3 圃場D : 6.1 圃場E : 3.8 圃場F : 5.0
レタス (茎葉) 外葉あり	7	20%プロアフル剤	0.204 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 2.5 圃場B : 1.5 圃場C : 0.59 圃場D : 2.3 圃場E : 0.016 圃場F : 0.004
						圃場G : 0.64 (2回、3日)
レタス (茎葉) 外葉なし	3	20%プロアフル剤	0.204 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 0.74 圃場B : 0.072 圃場C : 0.57
リーフレタス (茎葉)	7	20%プロアフル剤	0.209 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 6.3 圃場B : 3.4 圃場C : 4.1 圃場D : 4.8 圃場E : 5.4 圃場F : 4.5 圃場G : 4.2
セルリー (茎葉) 外葉あり	7	20%プロアフル剤	0.204 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 1.1 圃場B : 2.8 圃場C : 2.6 圃場D : 3.7 圃場E : 2.1 圃場F : 1.4 圃場G : 3.8
セルリー (茎葉) 外葉なし	3	20%プロアフル剤	0.204 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 2.6 圃場B : 0.32 圃場C : 0.22

農作物	試験圃場数	試験条件				最大残留量 (ppm) 【クロラントラニリプロール】
		剤型	使用量・使用方法	回数	経過日数	
ほうれんそう (茎葉)	7	20%フロアフル剤	0.209 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 7.3 圃場B : 8.7 圃場C : 7.9 圃場D : 5.8 圃場E : 9.7 圃場F : 7.3
						圃場G : 3.5 (2回、3日)
トマト (果実)	13	20%フロアフル剤	0.210 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 0.074 圃場B : 0.045 圃場C : 0.018 圃場D : 0.034 圃場E : 0.049 圃場F : 0.034 圃場G : 0.076 圃場H : 0.052 圃場I : 0.065 圃場J : 0.13 圃場K : 0.12 圃場L : 0.12 圃場M : 0.088
						圃場A : 0.14 圃場B : 0.095 圃場C : 0.024 圃場D : 0.12 圃場E : 0.16 圃場F : 0.19 圃場G : 0.14
ピーマン (果実)	7	20%フロアフル剤	0.209 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 0.22 圃場B : 0.070 圃場C : 0.14 圃場D : 0.071
						圃場A : 0.083 圃場B : 0.013 圃場C : 0.017 圃場D : 0.006 圃場E : 0.014 圃場F : 0.081
きゅうり (果実)	7	20%フロアフル剤	0.211 lb ai/A	2回	1日	圃場G : 0.022 (2回、1日)
						圃場A : 0.10 圃場B : 0.028 圃場C : 0.082 圃場D : 0.12 圃場E : 0.087 圃場F : 0.084
カンタロープ (果実) ※果皮を含む全果実	6	20%フロアフル剤	0.215 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 0.011
						圃場A : 0.022 圃場B : 0.093 圃場C : 0.037 圃場D : 0.058 圃場E : 0.078 圃場F : 0.044
サマースカッシュ (果実)	6	20%フロアフル剤	0.210 lb ai/A	2回	1日	圃場A : 0.034 圃場B : 0.061 圃場C : 0.12
						圃場D : 0.078 圃場E : 0.041 圃場F : 0.010 圃場G : 0.10 圃場H : 0.045 圃場I : 0.098 圃場J : 0.066 圃場K : 0.30 圃場L : 0.081
りんご (果実) ※全果実(芯及び果梗基部を含む)	13	35%顆粒水和剤	0.207 lb ai/A	2回	14日	圃場M : 0.092 (3回、7日)
						圃場A : 0.034 圃場B : 0.061 圃場C : 0.12 圃場D : 0.078 圃場E : 0.041 圃場F : 0.010 圃場G : 0.10 圃場H : 0.045 圃場I : 0.098 圃場J : 0.066 圃場K : 0.30 圃場L : 0.081
なし (果実) ※全果実(芯及び果梗基部を含む)	7	35%顆粒水和剤	0.204 lb ai/A	2回	14日	圃場A : 0.027 圃場B : 0.022
					10日	圃場C : 0.065
					14日	圃場D : 0.12 圃場E : 0.14
					13日	圃場F : 0.038
					14日	圃場G : 0.070