

医薬品を正しく購入するための

説明文書(案)

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	●●●●かぜシロップ
2	成分・分量	60mL 中 アセトアミノフェン 300mg、d-/l-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg、グアイフェネシン 80mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 25mg
3	用法・用量	次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。場合により4時間の間隔をおいて、1日6回まで服用して差し支えありません。3歳以上7歳未満10mL、1歳以上3歳未満7.5mL、6ヶ月以上1歳未満6mL、3カ月以上6カ月未満5mL、3カ月未満は服用しないこと。
4	効能・効果	かぜの諸症状（鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み、発熱、悪寒）の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用時は飲酒しないでください 6. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 - 高齢者。 - 本人又は家族がアレルギー体质の人。 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 次の症状のある人。一高熱、排尿困難 - 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障</p> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。