

## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成20年10月1日から平成21年2月28日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成20年10月1日から平成21年2月28日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)  
(平成20年10月1日～平成21年2月28日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
催眠鎮静剤、抗不安剤	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg	死亡	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 硝酸チアミン(ビタミンB1硝酸塩)8mg, アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg	間質性肺疾患	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg	薬疹	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
		潰瘍性大腸炎	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
		ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン150mg, エテンザミド250mg, カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 酸化マグネシウム100mg	皮膚潰瘍	1
解熱鎮痛消炎剤	9錠中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン6mg, カンゾウエキス末90mg(カンゾウ750mg), 無水カフェイン75mg	尿管間質性腎炎	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピルアンチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン25mg	アナフィラキシーショック	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg, 塩酸ジセチアミン(ビタミンB1誘導体)4mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	薬疹	1
総合感冒剤	1包(2.2g)中アセトアミノフェン235mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, グアヤコールスルホン酸カリウム50mg, 無水カフェイン30mg, リボフラビン2.5mg, アスコルビン酸100mg, 葛根湯乾燥エキス380mg	肝機能異常	1
		蕁麻疹	1
総合感冒剤	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム300mg	急性腎不全	1
		小脳梗塞	1
		脳血管攣縮	1
総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	間質性肺疾患	1
		多発性関節炎	1
総合感冒剤	3包(3.75g)中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末300mg, キキョウエキス200mg(キキョウ800mg), ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1.45g), ケイヒ末200mg	異常感	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
総合感冒剤	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン600mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, 無水カフェイン150mg, 硝酸チアミン25mg, 葛根湯エキス1605mg	夜間呼吸困難	1
総合感冒剤	3包(4.5g)中アセトアミノフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, ヒベンズ酸チペピジン37.5mg, ノスカピン24mg, ヘスペリジン20mg	アナフィラキシー様反応	1
総合感冒剤	4糖衣錠中アセトアミノフェン210mg, エテンザミド150mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン15mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, グアヤコールスルホン酸カリウム60mg, カフェイン50mg, T. D. S(ビタミンB1)5mg, リボフラビン2mg	尿管間質性腎炎	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	痙攣	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン150mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン8mg, ノスカピン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, グアヤコールスルホン酸カリウム25mg, マレイン酸カルビノキサミン1.2mg, 無水カフェイン12mg	肝炎	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	多形紅斑	1
		中毒性皮疹	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	多形紅斑	1
総合感冒剤	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸ブソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	急性汎発性発疹性膿疱症	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン25mg, リボフラビン12mg	呼吸困難	1
		発疹	1
		発熱	1
総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン12mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, 無水カフェイン75mg	無力症	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
		壊死性血管炎	1
		肝機能異常	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン60mg, トラネキサム酸420mg	中毒性表皮壊死融解症	1
		肝機能異常	1
総合感冒剤		発疹	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合感冒剤	12錠中アセトアミノフェン800mg, マレイン酸クロルフェニラミン6.6mg, クエン酸チペジジン40mg, dl-塩酸メチルエフェドリン42mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン12mg, リボフラビン6mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg, 塩酸プロムヘキシシン12mg, フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチンとして1mg), リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシー様反応	1
総合感冒剤	白色錠(4錠中)イブプロフェン300mg, フマル酸クレマスチン(クレマスチンとして)0.89mg(0.67mg), 塩酸プロムヘキシシン8mg, リン酸ジヒドロコデイン14.67mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン50mg 青色錠(2錠中)イブプロフェン150mg, フマル酸クレマスチン(クレマスチンとして)0.45mg(0.33mg), 塩酸プロムヘキシシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン7.33mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg	小脳梗塞	1
		食物との相互作用	1
		脳血管攣縮	1
総合感冒剤	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	アナフィラキシーショック	2
		意識変容状態	1
総合感冒剤	6カプセル中 イブプロフェン 450mg, マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン 24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg, 無水カフェイン 30mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝機能異常	1
総合感冒剤	6カプセル中ゴオウ20mg, ジリュウ乾燥エキス129mg(ジリュウ993.3mg), アセトアミノフェン600mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, 酸化マグネシウム140mg	アナフィラキシー様反応	1
		虚血性肝炎	1
総合感冒剤	6カプセル中ジリュウ乾燥エキス129mg(ジリュウ993.3mg), アセトアミノフェン600mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, 酸化マグネシウム140mg	中毒性皮疹	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
総合感冒剤	60mL中塩酸プロムヘキシシン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム20mg(カ価), マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		腎不全	1
その他の中枢神経系用薬	6錠中カノコソウエキス240mg(カノコソウ1.2g), チャボトケイソウエキス65mg(チャボトケイソウ455mg), チョウトウエキス45mg(チョウトウコウ563mg), ホップエキス30mg(ホップ429mg), ニンジンエキス30mg(ニンジン100mg)	異常行動	2
		気分変化	2
		傾眠	2
		倦怠感	2
耳鼻科用剤	2カプセル中 ケトチフェンフマル酸塩2.76mg	健忘	1
耳鼻科用剤	3カプセル中d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸ブソイドエフェドリン60mg, 塩酸フェニレフリン15mg, グリチルリチン酸二カリウム60mg, ペラドンナ総アルカロイド0.4mg, 無水カフェイン90mg	横紋筋融解	1
耳鼻科用剤	3カプセル中塩酸ブソイドエフェドリン90mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン120mg, 塩化リゾチーム60mg(カ価)	膿疱性乾癬	1
耳鼻科用剤	100mL中 ケトチフェンフマル酸塩75.6mg	メニエール病	1
		浮動性めまい	1
鎮痛剤	1カプセル中マレイン酸フェニラミン30mg, 臭化水素酸スコボラミン0.2mg, 塩酸ピリドキシン5mg, アミノ安息香酸エチル50mg, 無水カフェイン20mg	意識変容状態	1
鎮咳去たん剤	1包(1.8g)中リン酸ジヒドロコデイン10mg, ノスカピン20mg, dl-塩酸メチルエフェドリン25mg, マレイン酸カルピノキサミン4mg, 塩化リゾチーム20mg(カ価), キキョウ乾燥エキス末192mg(キキョウ960mg), カンゾウエキス末-C 64mg(カンゾウ320mg)	発疹	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
鎮咳去たん剤	6錠中塩酸L-エチルシステイン300mg, グアイフェネシン300mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, ヒベンズ酸チベピジン75mg, セネガエキス120mg(セネガ2g), キキョウエキス200mg(キキョウ0.9g)	チアノーゼ	1
		呼吸困難	1
含嗽剤	1mL中ホビドンヨード70mg(有効ヨウ素7mg)	舌の悪性新生物、病期不明	1
健胃消化剤	4包(12g)中ガジュツ末1000mg、真昆布末400mg	肝障害	1
複合胃腸剤	6錠中ウコン末200mg, カンキョウ末400mg, リパーゼAP12 24mg, プロザイム69mg, 酸化マグネシウム720mg, 無水リン酸水素カルシウム540mg, 銅クロロフィリンカリウム40mg	薬疹	1
痔疾用剤	1個中酢酸ヒドロコルチゾン5mg, リドカイン60mg, 塩酸テトラヒドロゾリン1mg, マレイン酸クロルフェニラミン4mg, アラントイン20mg, 酢酸トコフェロール60mg, 塩酸クロルヘキシジン5mg, l-メントール10mg	アナフィラキシーショック	1
化膿性疾患用剤	1g中バシトラシン250単位, 硫酸フラジオマイシン3.5mg(力価), 酢酸ヒドロコルチゾン2.5mg	アナフィラキシーショック	2
化膿性疾患用剤	1g中硫酸コリスチン50,000単位, バシトラシン250単位	呼吸窮迫	1
		発疹	1
		冷汗	1
鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤	100mL中l-メントール5g, dl-カンフル2g, サリチル酸メチル2g, サリチル酸グリコール1g, ユーカリ油0.5g, グリチルレチン酸0.1g	ショック	1
寄生性皮膚疾患用剤	1g中に塩酸テルビナフィン10mg	陰嚢腫脹	1
		歩行障害	1
毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)	100mL中 ミノキシジル1.0g	円形脱毛症	1
ビタミンA及びD剤	2カプセル中コレカルシフェロール0.01mg	肝機能異常	2
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	2錠中酪酸リボフラビン20mg, リン酸ピリドキサル24mg, ビスベンチアミン12mg, アスコルビン酸カルシウム100mg, ビオチン50μg	腹部膨満	1
		嘔吐	1
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	2錠中リン酸リボフラビンナトリウム38mg, 塩酸ピリドキシン24mg, 硝酸チアミン20mg, ニコチン酸アミド40mg, アスコルビン酸カルシウム125mg(アスコルビン酸103mg)	肝障害	1
		腎障害	1
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合剤を除く)	4錠中フルスルチアミン100mg(塩酸フルスルチアミン109.16mg), 塩酸ピリドキシン100mg, シアノコバラミン1500μg, ビタミンEコハク酸エステルカルシウム103.58mg(コハク酸dl-α-トコフェロール100mg), パントテン酸カルシウム30mg, ガンマーオリザノール10mg	肝機能異常	1
その他のビタミン剤	4カプセル中コウジン乾燥エキス80mg(コウジン800mg), ゴオウ末5mg, ロクジョウ末30mg, インヨウカク乾燥エキス40mg(インヨウカク320mg), オキソアミジン末100mg, シベット散20mg(シベット1mg), ムイラプアマ乾燥エキス50mg(ムイラプアマ500mg), ガラナ乾燥エキス70mg(ガラナ525mg), 酢酸d-α-トコフェロール10mg, 硝酸チアミン20mg, リボフラビン5mg, 塩酸ピリドキシン10mg	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
カルシウム剤	2錠中沈降炭酸カルシウム1.525g(カルシウム610mg), 炭酸マグネシウム118.4mg(マグネシウム30mg), コレカルシフェロール400IU	ジスキネジー	1
		腹痛	1
その他の滋養強壮薬	15錠中カシウ3.6g	肝障害	1
その他の滋養強壮薬	4カプセル中ゴオウ100mg, ニンジン600mg, ニンジン粗エキス末300mg(ニンジン900mg)	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合代謝性製剤	2錠中 エゾウコギ乾燥エキス(原生薬換算量300mg)12.0mg, オウギ乾燥エキス(原生薬換算量240mg)30.0mg, オキソアミジン末50.0mg, 塩酸アルギニン50.0mg, 硝酸チアミン(V.B1)10.0mg, リボフラビン(V.B2)4.0mg, 塩酸ピリドキシン(V.B6)10.0mg, コハク酸トコフェロールカルシウム(コハク酸dl-α-トコフェロール(V.E)とし)20.0mg)20.7mg, L-アスコルビン酸ナトリウム(アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)112.6mg	薬疹	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
総合代謝性製剤	1瓶(50mL)中肝臓水解物200mg, コンドロイチン硫酸ナトリウム200mg, ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(ビタミンB15活性部分)20mg, 五味子エキス54mg, ジオウ乾燥エキス100mg, アミノエチルスルホン酸 1000mg, リン酸リポフラビンナトリウム3mg, 塩酸ピリドキシン5mg, ニコチン酸アミド12mg	アナフィラキシー反応	1
その他のアレルギー用薬	2カプセル中 フマル酸ケトチフェン2.76mg	意識消失	1
		痙攣	1
漢方製剤	2包(5g)中乾燥エキス2.8g(カッコン2.64g, タイソウ・マオウ各1.98g, カンゾウ・ケイヒ・シャクヤク各1.32g, ショウキョウ0.66g)	角膜障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
漢方製剤	3包(4.5g)中防風通聖散料乾燥エキス末2.85g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, カッセキ1.5g)	咳嗽	1
		肝障害	1
漢方製剤	3包(4.5g)中温清飲エキス2400mg(ジオウ・トウキ・センキュウ・シャクヤク各2g, オウレン・オウバク各0.75g, オウゴン1.5g, サンシシ1g)	咳嗽	1
		肝障害	1
漢方製剤	9錠中水製エキス2.25g(カッコン2.0g, センキュウ1.5g, シャクヤク1.0g, ケイヒ1.0g, カンゾウ1.0g, ショウキョウ0.5g, マオウ2.0g, シンイ1.5g, タイソウ1.5g)	肝機能異常	1
漢方製剤	3錠 防風通聖散料乾燥エキス3.0g(キキョウ1.2g, ビャクジュツ1.2g, カンゾウ1.2g, オウゴン1.2g, セッコウ1.2g, ダイオウ0.9g, トウキ0.72g, シャクヤク0.72g, センキュウ0.72g, サンシシ0.72g, レンギョウ0.72g, ハッカ0.72g, ケイガイ0.72g, ポウフウ0.72g, マオウ0.72g, ショウキョウ0.24g, カッセキ1.8g, ポウショウ0.9g)	肝障害	2
		間質性肺疾患	1
漢方製剤	12錠中防風通聖散料乾燥エキス2.50g(<原生薬換算量>トウキ0.60g, マオウ0.60g, シャクヤク0.60g, ダイオウ0.75g, センキュウ0.60g, ビャクジュツ1.00g, サンシシ0.60g, キキョウ1.00g, レンギョウ0.60g, オウゴン1.00g, ハッカ0.60g, カンゾウ1.00g, ショウキョウ0.15g, セッコウ1.00g, ケイガイ0.60g, カッセキ1.50g, ポウフウ0.60g, 硫酸ナトリウム十水塩0.75g)	下痢	1
		肝機能異常	5
		腸閉塞	1
漢方製剤	3包(4.5g)中 アセトアミノフェン600mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, ヒベンズ酸チペピジン75mg, 無水カフェイン150mg, 硝酸チアミン25mg, 葛根湯エキス1605mg	アナフィラキシー様反応	1
		虚血性肝炎	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	1包(1.2g)中ケイヒ末200mg, エンゴサク末・ボレイ末各150mg, ウイキョウ末75mg, シュクシャ末・カンゾウ末各50mg, リョウキョウ末25mg, ブクリョウ末250mg	偽アルドステロン症	1
		心室細動	1
		低カリウム血症	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	1包(20g)中マオウ3g, キョウニン・カンゾウ各2g, ヨクイニン5g, カンボウ18g	偽アルドステロン症	1

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚中ニコチン78mg	タバコ中毒	1
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚(20cm2)中ニコチン35mg	うつ病	1
		悪心	2
		意識消失	1
		異常感	1
		回転性めまい	1
		感覚鈍麻	2
		狭心症	1
		胸部不快感	1
		筋骨格硬直	1
		筋肉痛	1
		傾眠	1
		血圧上昇	3
		高血圧	1
		自殺念慮	1
		自然流産	1
		収縮期血圧上昇	2
		色素沈着障害	1
		接触性皮膚炎	1
		側腹部痛	1
		体位性めまい	1
		適用部位びらん	1
		適用部位紅斑	1
		適用部位小水疱	1
		転倒・転落	1
		吐血	1
		動悸	2
		皮膚潰瘍	1
浮動性めまい	1		
抑うつ気分	1		
冷感	1		
嘔吐	3		