

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数		B-08029026	第1報	一般的名称		ザナミビル水和物		該当なし		
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)	一般的名称	医薬品に対して取られた処置	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1.	日本 (日本)	リレンザ	ザナミビル水和物	投与中止	09/02/12	09/02/12				
2.		エリスロシン	エチルコハク酸エリスロマイシン							
3.		アスピリン	ヒベンズ酸チペピジン							
4.		ムコソルバン	塩酸アンブロキシール							
5.		ホクナリン	塩酸ツロブテロール							
6.		ラキソベロン	ピコスルファートナトリウム							
7.		カロナール	アセトアミノフェン							
評価対象となる副作用/有害事象名			評価の情報源	医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)	評価結果		医薬品に関するその他情報			
1.	異常行動		報告者		関連有り		1.	リレンザ:		
2.							2.	エリスロシン:		
3.							3.	アスピリン:		
4.							4.	ムコソルバン:		
5.							5.	ホクナリン:		
6.							6.	ラキソベロン:		
7.							7.	カロナール:		
報告された死因				剖検	剖検による死因					
					MedDRA		Version (11.1)			

6

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-08029026	第1報	一般的名称	ザナミビル水和物	該当なし			
関連報告番号			親の年齢	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名		
親の略名	親の性別	最終月経日				異常行動、 異常行動		
曝露時の妊娠期間		発現時の妊娠期間						
親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴				
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)								
				MedDRA		Version (11.1)		

10

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08029027	第2報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄		
最新情報入手日	2009年03月18日		第一報入手日	2009年02月13日	死に至るもの ◎ 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が必要なもの 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)					
副作用	15日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・既往歴 インフルエンザ							
発現国 (情報源)	日本 (日本)										
患者略名	K.T.	体重 Kg									
性別	男性										
年齢	12歳	曝露時の妊娠期間							新医薬品等の区分 該当なし		

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
リレンザ	ザナミビル水和物	S	吸入	INH	10mg/2回	1日	09/01/31	09/02/01	インフルエンザ
UNKNOWNDRUG	葛根湯	0	経口	POR	2.5g/3回	1日	09/01/31	09/02/03	

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの時間間隔	最終投与からの時間間隔	転帰
非・重	離人症 (知覚異常、幻聴、離人症による異常行動)	離人症		09/02/01	09/02/01			回
非・重	幻聴 (知覚異常、幻聴、離人症による異常行動)	幻聴		09/02/01	09/02/01			回
非・重	錯覚 (知覚異常、幻聴、離人症による異常行動)	知覚障害		09/02/01	09/02/01			回
非・重	異常行動 (知覚異常、幻聴、離人症による異常行動)	異常行動		09/02/01	09/02/01			回
非・重	過換気 (過呼吸)	過呼吸		09/02/01	09/02/03			軽

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2009/01/31
 38.5度の発熱があり、A型陽性でリレンザを処方。
 2009/01/31夜
 リレンザ使用后、就寝;
 2009/02/01深夜
 悪夢、知覚異常、幻聴。怖い夢を見て過呼吸となる。
 2009/02/01朝
 リレンザ使用。その後、解離性障害(離人症)、幻聴、知覚異常、妄想による異常行動。手や全身のしびれ、自分がどこにいるのかわからない、ゲームのような感覚になる。服の中に(背中)に何か入ってきた感じがしてベッドではねる。ベッドからくり返しとびおる。何か音がして出た

MedDRA

Version (12.0)

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08029027	第2報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過									
ように思っ見るが、何も無い。又、ドアをたたくような音もした。自分でおかしいと思、母親に連絡。リレンザ使用中止にて速やかに改善。 2009/02/03 来院。熱は下がり、症状もおちついていた。									
								MedDRA	Version (12.0)

(様式第2(二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

2 / 5

識別番号・報告回数	B-08029027	第2報	一般的名称	ザナミビル水和物	該当なし
担当医等の意見			報告企業等の意見		
<p>(知覚異常、幻聴、離人症による異常行動、過呼吸) リンザ：不明 リンザが原因なのかは不明。熱が急に下がることで起きたのかもしれない。ベッドではねたり、ゲーム感覚になったということで離人症(感)が出たことは気になる。</p>			<p>時間的關係からは、知覚異常、幻聴、離人症による異常行動、過換気と本剤との関連性は否定できないと考えます。</p>		
今後の対応					
今後とも、安全性情報の収集・伝達に努力し、同様の事象の発現状況をみて対処する所存です。					
送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類			第一次情報源により報告された副作用／有害事象		
			<p>知覚異常、幻聴、離人症による異常行動、 知覚異常、幻聴、離人症による異常行動、 知覚異常、幻聴、離人症による異常行動、 知覚異常、幻聴、離人症による異常行動、 過呼吸</p>		
累積報告件数・使用上の注意記載状況等					
<p>1. 使用上の注意の記載状況 錯覚、幻聴、離人症、異常行動：(国内)記載なし。その他、重要な基本的注意として次の記載あり：因果関係は不明であるものの、本剤の使用後に異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告されている。小児・未成年者については、異常行動による転落等の方が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は、(1)異常行動の発現のおそれがあること、(2)自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。/(PDR)意識レベルの変化、錯乱、異常行動、妄想、幻覚、激越、不安、悪夢等の譫妄/(ABPI Data sheet)意識レベルの低下、異常行動、幻覚および譫妄等の精神症状 過換気：(国内/PDR/ABPI Data sheet)記載なし</p> <p>2. 累積報告件数 錯覚：(国内)1件(今回の報告を含む)/(外国)0件 幻聴：(国内)5件(今回の報告を含む)/(外国)0件 離人症：(国内)1件(今回の報告を含む)/(外国)0件 異常行動：(国内)130件(今回の報告を含む)/(外国)0件 過換気：(国内)1件(今回の報告を含む)/(外国)0件</p>					
				MedDRA	Version (12.0)

13