

(様式第2(一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1/5

識別番号・報告回数	B-08028295	第1報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
最新情報入手日	2009年01月30日		第一報入手日	2009年01月26日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの ◎ 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)		新医薬品等の区分 該当なし	
副作用	30日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴					
発現国(情報源)	日本(日本)								
患者略名	S.M.	体重 Kg		インフルエンザ 食物アレルギー					
性別	男性								
年齢	9歳		曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	SYR	33mg/1回	1日	09/01/26	09/01/26	インフルエンザ
トミロン	セフテラムピボキシル	0	経口	TAB	100mg/3回	1日	09/01/26		咽頭炎 鼻漏
ムコダイン	カルボシステイン	0	経口	TAB	250mg/3回	1日	09/01/26		
ペリアクチン	塩酸シプロヘプタジン	0	経口	FGR	0.23g/3回	1日	09/01/26		解熱処置
ピオフェルミンR	耐性乳酸菌製剤(3)	0	経口	POW	0.67g/3回	1日	09/01/26		
カロナール	アセトアミノフェン	0	経口	FGR	1.0g/1回	1日	09/01/26		

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	異常行動 (異常行動)	異常行動		09/01/26	09/01/28			軽

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

TAMIFLU
 身長：不明、体重：■■■■kg
 2009/01/25
 (夜) 発熱、鼻汁、食欲減少。インフルエンザ発症。
 2009/01/26
 (朝) 本院受診。インフルエンザ確定診断実施。結果：A型インフルエンザ。本剤33mg×2回/日、トミロン100mg、ムコダイン250mg、ペリアクチン、ピオフェルミンR処方。
 (12:00) 本剤、トミロン、ムコダイン、ペリアクチン、ピオフェルミンR服用。
 (14:00) 異常行動発現。急に動きまわる。会話が合わない。数分で回復し、普通の会話をし入眠。再び目覚め同じような異常行動を3回くり返す。
 (16:50) 母親よりうったえがある(電話)。異常行動をくり返しているため、入院を勧める。
 (18:00頃) 他院に入院。リレンザをすぐ吸入。

MedDRA

Version (11.1)

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08028295	第1報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過									
<p>(夜) 再びリレンザ吸入。 2009/01/27 0時すぎ深夜 (0時すぎ深夜) 高熱40℃続き、ベッドの上で寝ていたが、急に起きあがり、変な手の動きをするなど、異常行動を数回くり返すが、ベッドから下りて歩き回るようなことはなかった。熱さまし(薬剤不明)を服用。 (朝) 7℃代後半となった。しかし朝起きた時、母親の顔が分からないことがあり、その後もボーとすることも数回あった。 2009/01/28 解熱、異常行動なし。リレンザ、トミロン、ムコダイン、ペリアクチン、ピオフェルミンは継続中。 異常行動の転帰：軽快</p>									
								MedDRA	Version (11.1)

(様式第2 (二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

2 / 5

識別番号・報告回数	B-08028295	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし
担当医等の意見			報告企業等の意見		
<p>もともと熱でうなされやすい。しかし今回の様な動き回ったり、会話ができない等の異常行動をくり返すことはなかった。よってその行動がおこる2時間前に飲んだ本剤との関係は断定はできないがかなり高いと考える。</p>			<p>本剤投与後に発現しているため本剤と異常行動との関連性は否定できないが、インフルエンザウイルス感染および発熱による影響も考えられる。</p>		
今後の対応					
<p>今後とも同様の副作用の収集に努め、評価していく。 なお、2007年3月20日、警告欄に「10歳以上の未成年の患者においては、因果関係は不明であるものの、本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されている。このため、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。 また、小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は、(1)異常行動の発現のおそれがあること、(2)自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。 なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。」を記載し、緊急安全性情報を配布し医療関係者に注意喚起を行った。</p>					
送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類			第一次情報源により報告された副作用/有害事象		
			異常行動		
累積報告件数・使用上の注意記載状況等					
<p>1. 使用上の注意記載状況 (国内) 重大な副作用：精神・神経症状 (意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等) その他の副作用：興奮 (CDS) Psychiatric disorders/Nervous system disorders</p>					
引用文献			資料一覧		
				MedDRA	Version (11.1)

(様式第2 (三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

検査及び処置の結果

3 / 5

識別番号・報告回数	B-08028295		第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル					該当なし			
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	不明1									
その他の情報の有無													
診断に関連する検査及び処置の結果													
副作用等に関連のある臨床検査値等は入手できなかった。													

MedDRA

Version (11.1)

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-08028295		第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル					該当なし			
治療歴					関連する過去の医薬品使用歴								
原疾患・合併症・ 既往歴	治療 開始日	治療 終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)				
インフルエンザ	09/01/25	継続	A型インフルエンザ (原疾患)	外来、職業 (小学生)									
食物アレルギー													

MedDRA

Version (11.1)

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数		B-08028295		第1報		一般的名称		リン酸オセルタミビル		該当なし			
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)		一般的名称		医薬品に対して取られた処置		開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1.	日本 (日本)	タミフル		リン酸オセルタミビル		投与中止		09/01/26	09/01/26				
2.	日本	トミロン		セフテラムピボキシル		投与量変更せず		09/01/26					
3.	日本	ムコダイン		カルボシステイン		投与量変更せず		09/01/26					
4.	日本	ペリアクチン		塩酸シプロヘプタジン		投与量変更せず		09/01/26					
5.	日本	ビオフェルミンR		耐性乳酸菌製剤 (3)		投与量変更せず		09/01/26					
6.	日本	カロナール		アセトアミノフェン		非該当		09/01/26					
評価対象となる副作用/有害事象名				評価の情報源				医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果		医薬品に関するその他情報	
1.	異常行動 異常行動			REPORTER COMPANY						おそらく関連あり 関連あり/Yes		1. タミフル: TAMIFLU 2. トミロン: 3. ムコダイン: 4. ペリアクチン: 5. ビオフェルミンR: 6. カロナール:	
報告された死因				剖検				剖検による死因		MedDRA		Version (11.1)	

(様式第2 (五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-08028295	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル		該当なし		
関連報告番号			親の年齢	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名 異常行動、 異常行動		
親の略名	親の性別	最終月経日						
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間					
親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴				
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)								
				MedDRA		Version (11.1)		