

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-08028418	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル			該当なし		
関連報告番号			親の年齢	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名 異常行動、 異常行動			
親の略名	親の性別	最終月経日							
曝露時の妊娠期間		発現時の妊娠期間							
親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴					
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)	
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)									
				MedDRA		Version (12.0)			

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08028874	第2報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
最新情報入手日	2009年03月03日		第一報入手日	2009年02月04日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの ◎ 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)		新医薬品等の区分 該当なし	
副作用	30日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴					
発現国 (情報源)	日本 (日本)								
患者略名	X. X.	体重 Kg	インフルエンザ 疫學						
性別	男性								
年齢	16歳		曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/1回	1日	09/01/26	09/01/26	インフルエンザ
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/1回	1日	09/01/28	09/01/28	インフルエンザ
テグレートール	カルバマゼピン	S	経口	TAB	1DF/1回	1日			
アスピリン	アスピリン	S	経口	POR	(不明)				
プリンペラン	メトクロプラミド	S	不明	XXX	(不明)				
ビオフェルミン	ラクトミン	S	経口	POR	(不明)				
メトリジン	塩酸ミドドリン	0	経口	TAB	2mg/1回	1日			

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	異常行動 (異常行動)	異常行動		09/02/01	09/02/21			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

TAMIFLU

身長・体重：不明

[インフルエンザに関する詳細情報]

- ・本剤投与目的：治療投与
- ・診断日：2009/01/26 (午前)
- ・ウイルス診断の有無：有 (FluA、サンプル採取箇所：記載なし)
- ・発症日：2009/01/25 (時刻不明)
- ・発症時に認められた自覚症状：  
発熱：不明、頭痛、消化器症状 (嘔吐、下痢)、咽頭痛、悪寒
- ・転帰日：2009/02/21

[患者背景]

MedDRA

Version (12.0)

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08028874	第2報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
-----------	------------	-----	--------	--	----	-------	-----	--	-------

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

- ・インフルエンザ既往歴：不明
- ・本剤による副作用歴：不明
- ・本剤以外のインフルエンザ治療薬による治療歴：不明
- ・睡眠時驚愕症、睡眠時遊行症等の睡眠時の異常に関する既往歴  
患者本人：不明、患者家族：不明
- ・熱性痙攣既往歴  
患者本人：有、患者家族：不明
- ・熱性疾患による錯乱・熱性せん妄等の既往歴：不明
- ・薬物等に対する依存歴：無
- ・アレルギー歴：不明
- ・副作用歴：不明
- ・本剤服用Point：投与1日目 午後、投与3日目 午前

2009/01/26

基礎疾患（不明）があるため親からの要望で、インフルエンザ治療のため本剤75mg処方。気分が悪かったので翌日の内服中止。

2009/01/28

本剤75mg服用。

2009/02/01

異常行動発現。大声を出すなど異常行動がみられ近くの内科に入院となったが、階段をのぼったり、9階から1階まで降りたりを数回くり返す症状があり、内科病院では管理ができないため精神科の病院へ転院治療を受けた。

2009/02/21

症状改善した連絡があった。

異常行動の転帰：回復

〔異常な行動、精神神経症状に関する詳細情報〕

- ・走る、暴れる等の動きを伴いましたか？ はい
- ・これらの動きを誰かが制止しましたか？ 不明
- ・副作用は睡眠中ですか？ 不明
- ・副作用発現後、一眠りして完全に回復しましたか？ 不明
- ・副作用発現内容を患者さんは記憶していますか？ 不明
- ・副作用発現時の体温は何度ですか？ 不明
- ・また発熱持続中ですか？ 不明
- ・副作用発現前24時間以内に解熱剤を服用していますか？ 不明
- ・以前に同様の副作用を起こしたことがありますか？ 不明
- ・光をまぶしがったり、明るくするとさらに興奮しましたか？ 不明
- ・今回の副作用発現後に入院しましたか？ はい
- ・副作用症状の精査のため、追加の検査が行われましたか？ 情報なし

MedDRA

Version (12.0)

(様式第2 (二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

2 / 5

識別番号・報告回数	B-08028874	第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし
担当医等の意見			報告企業等の意見		
元々日頃から異常行動を起こす傾向があったとのことだが、本剤を飲んでいたため親が報告に来た。既往症や日常の行動から何とも言えないが、因果関係は不明、わからない。			本剤投与後に発現しているため本剤と異常行動との関連性は否定できないが、インフルエンザウイルス感染および発熱による影響も考えられる。		
今後の対応					
<p>今後とも同様の副作用の収集に努め、評価していく。</p> <p>なお、2007年3月20日、警告欄に「10歳以上の未成年の患者においては、因果関係は不明であるものの、本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されている。このため、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。</p> <p>また、小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は、(1)異常行動の発現のおそれがあること、(2)自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて患者・家族に対し説明を行うこと。</p> <p>なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。」を記載し、緊急安全性情報を配布し医療関係者に注意喚起を行った。</p>					
送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類			第一次情報源により報告された副作用／有害事象		
			異常行動		
累積報告件数・使用上の注意記載状況等					
<p>本事象の報告医による重篤度は非重篤であったが、企業として重篤な副作用と判断し報告を行う。</p> <p>1. 使用上の注意記載状況  (国内) 重大な副作用：精神・神経症状（意識障害、異常行動、譫妄、幻覚、妄想、痙攣等）  その他の副作用：興奮  (CDS) Psychiatric disorders/Nervous system disorders</p> <p>2. 累積報告件数  2007年4月9日以降の異常な行動：264件（本件を含む）</p>					
引用文献			資料一覧		
				MedDRA	Version (12.0)

(様式第2 (三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

検査及び処置の結果

3 / 5

識別番号・報告回数	B-08028874		第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル				該当なし			
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	不明1								
その他の情報の有無												
診断に関連する検査及び処置の結果												
副作用等に関連のある臨床検査値等は入手できなかった。												

MedDRA Version (12.0)

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-08028874		第2報	一般的名称	リン酸オセルタミビル				該当なし			
治療歴					関連する過去の医薬品使用歴							
原疾患・合併症・既往歴	治療 開始日	治療 終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)			
インフルエンザ  痙攣	09/01/25	継続	A型インフルエンザウイルス感染(原疾患)(~09/2/21) ひきつけ(既往症)	外来、職業(高校生)								

MedDRA Version (12.0)