

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

1. 年齢別
年齢別①

	症例数	(%)
10歳未満	2	8
10代	21	88
20代	0	0
30代	0	0
40代	0	0
50代	0	0
60代	0	0
70代	1	4
80代	0	0
90代	0	0
不明	0	
総計	24	100

年齢別②

	症例数	(%)
6歳以下	0	0
7歳から9歳	2	9
10歳から12歳	12	52
13歳から15歳	7	30
16歳から18歳	1	4
19歳以上	1	4
不明	1	
総計	24	100

2. 性別

	症例数	(%)
女性	5	21
男性	19	79
不明	0	
総計	24	100

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

3. インフルエンザウイルス型別

	症例数	割合
A型インフルエンザ	9	38
A&B型インフルエンザ	0	0
B型インフルエンザ	12	50
型不明	0	0
不明	2	8
予防	0	0
陰性	1	4
総計	24	100

4. 異常な行動の発現時期別

①年別

年	症例数	割合
1999	1	4
2000	0	0
2001	0	0
2002	0	0
2003	0	0
2004	1	4
2005	0	0
2006	0	0
2007	22	92
総計	24	100
不明	0	
総計	24	

②シーズン別

シーズン	症例数	割合
1998-1999シーズン	1	4
1999-2000シーズン	0	0
2000-2001シーズン	0	0
2001-2002シーズン	0	0
2002-2003シーズン	0	0
2003-2004シーズン	0	0
2004-2005シーズン	1	4
2005-2006シーズン	0	0
2006-2007シーズン	22	92
総計	24	100
不明	0	
総計	24	

シーズン；8月から7月

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

5. インフルエンザ発症から異常な行動発現までの病日

病日	症例数	(%)
1	6	29
2	7	33
3	6	29
4	1	5
5	0	0
6以上	1	5
合計	24	100
不明	3	
総計	24	

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間

	症例数	(%)
1時間未満	/	/
1時間以上2時間未満		
2時間以上3時間未満		
3時間以上4時間未満		
4時間以上5時間未満		
5時間以上6時間未満		
6時間以上12時間未満		
12時間以上24時間未満		
24時間以上48時間未満		
48時間以上		
合計		
不明		
総計		

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間

	症例数	割合
1時間未満		
1時間以上2時間未満		
2時間以上3時間未満		
3時間以上4時間未満		
4時間以上5時間未満		
5時間以上6時間未満		
6時間以上12時間未満		
12時間から		
不明		
総計		

8. 異常な行動の発現時の体温

①異常な行動の直前の体温（発現前6時間以内）

	症例数	割合
36度台	1	5
37度台	1	5
38度台	4	21
39度台	10	53
40度台	3	16
41度以上	0	0
不明	5	
総計	24	100.0

②異常な行動の発現時の体温の経過

	症例数	割合
発熱持続	17	89
解熱過程	2	11
解熱後	0	0
不明	5	
総計	24	100.0

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

9. 異常な行動の発現時刻別

	症例数	(%)
0時から6時まで	8	33
6時から12時まで	3	13
12時から18時まで	6	25
18時から24時まで	7	29
総計	24	100
不明	0	
総計	24	

10. 就寝から異常な行動の発現までの時間

	症例数	(%)
1時間未満	1	14
1時間以上2時間未満	2	29
2時間以上3時間未満	1	14
3時間以上4時間未満	1	14
4時間以上5時間未満	2	29
5時間以上	0	0
総計	7	100
不明/就寝中ではない	17	
総計	24	

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

11. 異常な行動の発現が就寝中か否か

	症例数	%
Yes	11	58
No	8	42
不明	5	
総計	24	

12. 異常な行動の発現が覚醒直後か否か

	症例数	%
Yes	2	100
No	0	0
不明	22	
総計	24	

13. 異常な行動が一眠りして回復したか否か

	症例数	%
Yes	15	100
No	0	0
不明	9	
総計	24	

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

14. 異常な行動に関する患者の記憶の有無

	症例数	(%)
有	9	43
無	12	57
総計	21	100
不明	3	
総計	24	

15. 光に対する反応の有無

	症例数	(%)
有	0	0
無	15	100
総計	15	100
不明	9	
総計	24	

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

16. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

	症例数	(%)
有	4	25
無	12	75
不明	8	
総計	24	100

17. 睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

	症例数	(%)
有	2	14
無	12	86
不明	10	
総計	24	100

18. 異常な行動の回復までの時間

	症例数	(%)
30分未満	3	33
30分以上1時間未満	1	11
1時間以上6時間未満	4	44
6時間以上24時間未満	1	11
24時間以上	0	0
不明	15	
総計	24	100

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計（注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計）

19. 異常な行動等が発現後の投与を継続した症例の状況

20. 他剤による同様な副作用歴の有無

	症例数	(%)
有	0	0
無	19	100
不明	5	
総計	24	

21. 熱性痙攣の既往歴の有無

	症例数	(%)
有	1	6
無	17	94
不明	6	
総計	24	

22. 熱性痙攣の家族歴の有無

	症例数	(%)
有	3	20
無	12	80
不明	9	
総計	24	

タミフル非使用例の異常な行動が記録されている事例の集計

参考1 主な併用薬剤の内訳

	薬効細分類2	集計
解熱鎮痛消炎剤	アニリン系製剤	8
	サリチル酸系製剤	2
	その他の解熱鎮痛消炎剤	
	フェニル酢酸系製剤	
	塩基性消炎鎮痛剤	
	計	10
去たん剤	システイン系製剤	4
	その他の去たん剤	2
	プロムヘキシン製剤	6
	植物性製剤	
	計	
鎮咳去たん剤	その他の鎮咳去たん剤	
	植物性製剤	
	計	
抗ヒスタミン剤	その他の抗ヒスタミン剤	1
	トリペレナミン系製剤	1
	フェノチアジン系製剤	
	計	
鎮咳剤	エフェドリン及びマオウ製剤	4
	その他の鎮咳剤	
	デキストロメトर्फアン製剤	1
	計	5
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オキサセフェム系抗生物質製剤	2
	セフェム系抗生物質製剤	
	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用	3
	ペニシリン系抗生物質製剤	5
	計	
気管支拡張剤	イソプレナリン系製剤	1
	キサンチン系製剤	
	その他の気管支拡張剤	
	計	1
消化性潰瘍用剤	H2遮断剤	
	その他の消化性潰瘍用剤	
	計	

参考2 既往症・合併症

医師記載疾患名	既往症	合併症	計
アトピー性皮膚炎	1		1
意識障害		1	1
気管支喘息	1		1
急性鼻咽頭炎		1	1
急性扁桃腺炎		1	1
高血圧	1		1
睡眠時驚愕症	4		4
熱性けいれん	1		1
扁桃腺炎		1	1
便秘	1		1
計	9	4	13