



図39.インフルエンザ迅速診断
キットの実施の有無n=41




51

図40.迅速診断キットによる
検査結果n=41




52

図41.罹患前半半年間の予防接種歴
n=41



53


図42.タミフル（リン酸オセルタミビル）服用の有無n=41




54

図43.昨シーズンとの比較

2006/2007





2007/2008




55

図44.タミフル（リン酸オセルタミビル）服用の有無の性別




56

図45.タミフル（リン酸オセルタミビル）服用の有無の年齢別




平均値4.6
中央値5



平均値10.96
中央値10

57


図46.シンメトレル（塩酸アマンタジン）服用の有無n=41




58

図47.昨シーズンとの比較

2006/2007




2007/2008



59

図48.リレンザ（ザナミビル）使用の有無n=41





60

図49.昨シーズンとの比較


2006/2007

2007/2008



61


図50.アセトアミノフェン服用の有無n=41




62

図51.昨シーズンとの比較

2006/2007




2007/2008



63


図52.異常行動と睡眠の関係n=41




64

図53.昨シーズンとの比較

2006/2007




2007/2008




65

図54.タミフル有無と異常行動と睡眠の関係

タミフル服用有り群



タミフル服用無し群



66

軽度の分析

67

分析対象データ

報告数		674		
重度		88	除外	対象
軽度		532		
	日時不明	7	12	520
	高齢者（31歳以上）	5		
不明		54		

68