

医師用

インフルエンザが流行している期間の中で、先生が定めた開始日から連続で10名~20名の調査をお願いします

19. 2. 26

経過観察調査票

12/136/6

カルテ番号 (患者番号)		性別	☐ 男 ☐ 女	生年月日	☐ 昭和 ☐ 平成 年 月 日
初診日時	2月9日	☒ 午前 ☐ 午後	今シーズンの ワクチン接種	☐ 0回 ☐ 1回 ☒ 2回	
迅速診断キットによる診断	☐ はい ☒ いいえ	インフルエンザの診断	☐ A型 ☒ B型 ☐ 型不明		
既往歴 (複数可)	☐ なし ☐ あり ☐ 気管支喘息 ☐ 心疾患 ☐ 意識障害* ☐ 無熱性けいれん** ☐ 熱性けいれん** ☐ 異常行動・異常言動*** ☐ その他()				
最初の発熱	37.4度	測定日時	2月8日	☐ 午前 ☒ 午後	6時 分
経過観察終了日(発熱後4日目)	2月11日				

<注> * ** *** については、参考資料をご参照ください。

臨床 症 状	※ 診察や「患者家族調査票」の記載などに基づいて臨床症状の評価をお願いします。	
	「有」の場合 (最初の発現日時~その消失日時 (又は経過観察終了日時)) 時刻は24時間でご記入ください	
	意識障害*	☐ 無 ☒ 有 (月 日 時 分 ~ 月 日 時 分) → 意識レベル
	無熱性けいれん**	☐ 無 ☐ 有 (月 日 時 分 ~ 月 日 時 分) → けいれんの分類 (☐ 単純型 ☐ 複雑型)
	熱性けいれん**	☐ 無 ☐ 有 (月 日 時 分 ~ 月 日 時 分) → けいれんの分類 (☐ 単純型 ☐ 複雑型)
	異常行動・異常言動***	☐ 無 ☒ 有 (2月9日 0時00分 ~ 9日 2時00分) → 異常行動・異常言動の分類 (☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E)
	肺炎・気管支炎の併発	☐ 無 ☐ 有 (月 日 時ごろ) 発現日時のみ
	中耳炎の併発	☐ 無 ☐ 有 (月 日 時ごろ) 発現日時のみ
筋炎の併発	☐ 無 ☐ 有 (2月9日 2時ごろ) 発現日時のみ	

<注> * ** *** については、参考資料をご参照ください。

治療薬	※ 「患者家族調査票」に薬剤の使用日時 (分まで) が記載されていることを確認してください。			
剤	☐ シメトレル ☒ タミフル ☐ リレンザ ☐ アセトアミノフェン			
	☐ 非ステロイド系抗炎症薬 () ☐ 抗菌薬 (737211/1 942132)			
	☐ その他の薬剤 (942132/1 せとあ)			

<臨床症状の詳細や治療薬剤との関係など> (書ききれない場合には、裏を使用して下さい)



医師用

先生が定めた開始日から連続で10名以上の調査をお願いします

経過観察調査票

カルテ番号 (患者番号)		性別	☒ 男 ☐ 女	生年月日	☐ 昭和 ☒ 平成 年 月 日
初診日時	2月15日	☐ 午前 ☒ 午後	10時	今シーズンの ワクチン接種	☒ 0回 ☐ 1回 ☐ 2回
迅速診断キットによる診断	☒ はい ☐ いいえ	インフルエンザの診断	☐ A型 ☒ B型 ☐ 型不明		
既往歴 (複数可)	☐ なし ☒ あり ☐ 気管支喘息 ☐ 心疾患 ☐ 意識障害* ☐ 無熱性けいれん** ☐ 熱性けいれん** ☐ 異常行動・異常言動*** ☐ その他()				
最初の発熱	38.6度	測定日時	2月15日	☐ 午前 ☒ 午後	3時
経過観察終了日(発熱後4日目)	2月18日				

<注> * ** *** については、参考資料をご参照ください。

臨床 症 状	※ 診察や「患者家族調査票」の記載などに基づいて臨床症状の評価をお願いします	
	「有」の場合 (発現日時~消失日時 (又は経過観察終了日時))	
	意識障害*	☒ 無 ☐ 有 (月 日 時 ~ 月 日 時) → 意識レベル
	無熱性けいれん**	☒ 無 ☐ 有 (月 日 時 ~ 月 日 時) → けいれんの分類 (☐ 単純型 ☐ 複雑型)
	熱性けいれん**	☒ 無 ☐ 有 (月 日 時 ~ 月 日 時) → けいれんの分類 (☐ 単純型 ☐ 複雑型)
	異常行動・異常言動***	☐ 無 ☒ 有 (2月17日 8時 ~ 2月17日 8時) → 異常行動・異常言動の分類 (☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E)
	肺炎・気管支炎の併発	☒ 無 ☐ 有 (月 日 時 ~ 月 日 時)
	中耳炎の併発	☒ 無 ☐ 有 (月 日 時 ~ 月 日 時)
筋炎の併発	☒ 無 ☐ 有 (月 日 時 ~ 月 日 時)	

<注> * ** *** については、参考資料をご参照ください。

治療薬	※ 「患者家族調査票」に薬剤の使用日時が記載されていることを確認してください。			
剤	☐ シメトレル ☒ タミフル ☐ リレンザ ☐ アセトアミノフェン			
	☐ 非ステロイド系抗炎症薬 () ☐ 抗菌薬 ()			
	☐ その他の薬剤 ()			

<臨床症状の詳細や治療薬剤との関係など> (書ききれない場合には、裏を使用して下さい)

発熱 38.6度 2月15日 午後 10時 3分
意識レベル 3
けいれんの分類 (☐単純型 ☐複雑型)
異常行動・異常言動の分類 (☒A ☐B ☐C ☐D ☐E)

