













No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時期		異常な行動発現時		就寝中か否 か (就寝中：○、 就寝中じゃない：×)	異常な 行動の 発現 時期	就寝中の場 合、就寝時 刻から発現 までの時間	意識まで の回復 時間	一層りして 完全回復 した	経過	異常な 行動の 回復	意識障害 等の発現 の有無	呼吸器 障害の有 無	発熱の有 無	後測による 「異常な行 動」の副作 用歴の有 無		異常な行動の具体的な詳細 (例：幻覚については具体的に何が見えたか？本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたように言っているのか？)	旧資料No	
						2007/3/2	不明	2007/3/2	-															
352	B07000209	青少年		男性	異常行動	2007/3/2	不明	2007/3/2	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2007/3/2インフルエンザ治療のため、タミフル投与開始。0.5mg×2/日2錠行中の薬からの飛び出し。異常行動(非重篤)発現。異常行動回復。	11 282
353	B07027776	不明		男性	異常行動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No	-	-	-	-	-	-	-	不明 1日インフルエンザ治療のため、本剤を5日処方。1日目の2カプセル目を飲んだところまでは記憶はあるが、その後なくなる。朝、ベッドに座っていて、気がつくとき手から出血していた。知らない間にトイレのタンクを壊していた。水浸しに気づかず。異常行動、手から血が出ていた発現。その後服用を継続したが、異常行動はなかった。異常行動 回復。	11 282