

異常な行動が記録されている事例の概要(年齢順)
(販売開始(平成12年12月)から平成21年3月31日まで)

№	薬剤名	性別	年齢	用量	剤形	経過	結果	経過	経過	経過	経過
155	B-08026395	男性	17歳	20 mg	カルボシステイン dl-マレイン酸クロルフェニ ラミン 鎮咳配合剤(1)	死亡	死亡	38.8度の発熱があり、受診。A型インフルエンザと診断され、ザナミ ビル水和物とカルボシステイン、dl-マレイン酸クロルフェニラミン、 鎮咳配合剤を処方。同日、服用開始。 翌日、朝、自宅ベランダ(5階)から転落しているところを発見された。 異常行動の有無については確認されていない。報告医が患者父 親に服用について聞いたところ、「先生に言われたとおりになりまし た」とのこと。報告医は本剤を含め併用薬も全て服用したと考えて いる。		08/04/01以降 新規報告	
156	B-08028610	女性	17歳	20 mg	鎮咳配合剤(1) d-マレイン酸クロルフェニ ラミン	異常行動	回復	キットにて、インフルエンザA型と診断され、ザナミビル水和物処 方。同日午前中、夕方、本剤吸入。就寝前の体温は38.7℃。 服用2日目、早朝、急に飛び起き、気持ちが悪かったようでトイレに 起きた様子でしたが、トイレではない場所に転びそうになりながら バタバタ音をさせ、トイレより先の部屋に倒れこむ。あわてて駆け付 け抱き起こし、気持ちが悪いと言うのでトイレに連れて行く。5分位ト イレにいたが何ももどしていない様子。そのまま部屋にもどり寝る。 事象発現約4時間後、体温は37.2℃であり、少々まだ気持ちが悪い ようで、薬を服用すべきか悩み病院へ電話した。本剤中止。		08/04/01以降 新規報告	
157	B-07023802	男性	18歳	10 mg	鎮咳配合剤(1) カルボシステイン 維持液(6) セフトリアキソンナトリウム	異常行動	回復	服薬1日目、キットにてA型インフルエンザと診断。受診中にザナミ ビル水和物を1回吸入。帰宅後、ほとんど自宅で眠っていた。夕 方、頭の中がおかしいと感じ、自分の顔をたたいて「しっかりしない といけない」と自分自身を元気づけていた(約数分間)。夜、就寝 後、急に起き上がり、1階と2階を行ったり来たりした(約数分間)。そ の時、本人は「覚えてはいるが、はっきりしない」感じであったとのこ と。救急外来を受診。本剤中止。以後、帰宅後も異常行動出現な し。	異常-54		
158	B-08028607	男性	18歳	20 mg	乳酸リンゲル液	異常行動	回復	39.3℃の発熱あり、受診。倦怠感強く、食事は取れないが、意識著 名。検査にてインフルエンザA型と診断され、ザナミビル水和物処 方。同日、服用開始。夜、本剤吸入約2時間後、体温39.8度あり、 発汗多量で、2階寝室で寝ていたが「あつい、あつい」と言いなが ら、1階に降りて玄関のドアを開け外に出るところを家人が制止。ソ ファに座らせた時は、過呼吸で呼びかけに返事をしなかったが、数 分で落ち着き返事をするようになった。再び就寝させた。 服用2日目、朝、体温は37.2℃。食事可能となり、会話も普通。本剤 吸入。その後、本剤中止。 服用開始から3日目、症状なし。異常行動なし。		08/04/01以降 新規報告	

異常な行動が記録されている事例の概要(年齢順)
(販売開始(平成12年12月)から平成21年3月31日まで)

No.	個別番号	性	年齢	一日用量	処方薬	副作用	経過	経過の概要	前回のNo.	備考
159	B-08028839	男性	18歳	20 mg	リン酸ジメモルファン アセトアミノフェン 酪酸菌製剤	異常行動	回復	ザナミビル水和物服用1日前、体温38.5℃にて、受診するも、キットにて陰性であった。 服用1日目、体温38.2℃にて、再診。キットにて、インフルエンザB型と診断され、ザナミビル水和物処方。昼、夜、本剤吸入。夜、本剤吸入2時間後に就寝。本剤吸入3時間後、自室(2階)から下りて来て、小声で意味不明のことを言いながらウロウロ、ドアを開け庭に出て5～10分ウロウロ動き回ったあと、母に促され屋内に戻った。 服用2日目、朝、体温37.9℃。昨夜の行動が変だったことは何となく覚えているとのこと。本剤吸入後、服用1日目の異常行動を踏まえ、本剤中止。		08/04/01以降 新規報告
160	B-07027137	男性	19歳	20 mg	ロキソプロフェンナトリウム 臭化水素酸デキストロメ ルファン カルボシステイン	運動過多	回復	ザナミビル水和物服用1日目、朝、体温39℃。本剤1回目吸入15～20分後、じっとしていられず、部屋の中を歩きまわっていた。落ちつかずじっとしていられない気分であった。昼過ぎ、体温が37℃に下がる。 5日間本剤服用したが、服薬1日目以降、異常なし。	異常-55	08/04/01以降 追加報告
161	B-08029433	不明	19歳	投与量不明		異常行動	不明	ザナミビル水和物を5日分処方。夜中におかしなことを叫んで走ってくるという異常行動が発現。		08/04/01以降 新規報告
162	B-07025367	男性	20歳	20 mg	塩酸イトブリド セフトレニボキシル アセトアミノフェン	異常行動	回復	服薬1日目、インフルエンザ(A)。昼頃、ザナミビル水和物吸入。階段昇り降りし、遠くを見つめていた。夕方、同じパターン。 服薬2日目朝、同じパターン。本剤吸入中止。解熱して症状改善。	異常-56	
163	B-08030546	男性	29歳	10 mg		異常行動	回復	ザナミビル水和物服用2日前より発熱あり。 インフルエンザA型と診断され、ザナミビル水和物処方。帰宅し、約3時間の睡眠後、起き出し、トイレに行くとき大声を出す、トイレから出て走り、妻に抱きつくといった行動が発現。シャワーを浴びると正常な状態に回復。		08/04/01以降 新規報告
164	B-07000023	女性	30歳	20 mg	カルボシステイン 臭化水素酸デキストロメ ルファン	幻覚 失見当識	回復 回復	ザナミビル水和物を使用。服用2-3時間にて家と反対方向に歩き出し、夫に注意を促されて戻る。帰宅後もトイレで壁に向かって何度もおじぎをし謝っていた。 翌日、ザナミビル水和物中止し、同様な症状は起きていない。	異常-57	
165	B-08028841	男性	10歳代	投与量不明		落ち着きのなさ	不明	夜、パジャマのまま外を徘徊しているところ通行人に保護され、病院搬送。ザナミビル水和物が処方されていたことが判明(吸入の有無は不明)。入院するも翌日には症状なし。		08/04/01以降 新規報告
166	B-08028608	不明	不明	投与量不明		落ち着きのなさ 徘徊癖	不明 不明	ザナミビル水和物服用後、落ち着かないといつてうろろしている。		08/04/01以降 新規報告
167	B-08030547	男性	不明	投与量不明		異常行動	不明	布団の中で大きな声を出し、布団から飛び出す行動が発現し、本剤中止。		08/04/01以降 新規報告