

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

平成21年6月16日安全対策調査会
資料8-2-3

平成21年6月3日タミフル臨床WG
資料6-2-3

1.患者年齢別①

	症例数(%)	
10歳未満	2	20%
10代	5	50%
20代	0	0%
30代	1	10%
40代	0	0%
50代	0	0%
60代	0	0%
70代	0	0%
80代	1	10%
90代	1	10%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

患者年齢別②

	症例数(%)	
6歳以下	0	0%
7歳から9歳	2	20%
10歳から12歳	2	20%
13歳から15歳	2	20%
16歳から18歳	1	10%
19歳以上	3	30%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

2.性別

	症例数(%)	
女性	3	30%
男性	7	70%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

3.インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	9	100%
A&B型インフルエンザ	0	0%
B型インフルエンザ	0	0%
小計	9	100%
型不明	1	
総計	10	

4.異常な行動の発現時期別①(年別)

	症例数 (%)	
1998	0	0%
1999	1	10%
2000	3	30%
2001	0	0%
2002	0	0%
2003	1	10%
2004	1	10%
2005	1	10%
2006	0	0%
2007	2	20%
2008	1	10%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

異常な行動の発現時期別②(シーズン別)

	症例数 (%)	
1998-1999シーズン	1	10%
1999-2000シーズン	3	30%
2000-2001シーズン	0	0%
2001-2002シーズン	0	0%
2002-2003シーズン	1	10%
2003-2004シーズン	1	10%
2004-2005シーズン	1	10%
2005-2006シーズン	0	0%
2006-2007シーズン	2	20%
2007-2008シーズン	1	10%
小計	10	100%
不明	0	
総計	10	

シーズン ; 8月から7月

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

5.インフルエンザ発症から異常な行動の発現までの病日

病日	総計数(%)
1日	1 13%
2日	3 38%
3日	2 25%
4日	1 13%
5日	1 13%
6日	0 0%
7日	0 0%
小計	8 100%
不明	2
総計	10

6.最初の投与から異常な行動の発現までの時間

	症例数(%)	
1時間未満	0	0%
1時間以上2時間未満	0	0%
2時間以上3時間未満	0	0%
3時間以上4時間未満	0	0%
4時間以上5時間未満	1	13%
5時間以上6時間未満	1	13%
6時間以上12時間未満	2	25%
12時間以上24時間未満	1	13%
24時間以上48時間未満	0	0%
48時間以上	3	38%
小計	8	100%
不明	2	
総計	10	

7.直前の投与から異常な行動の発現までの時間

症例数(%)	
30分未満	0 0%
30分以上1時間未満	0 0%
1時間以上2時間未満	2 25%
2時間以上3時間未満	0 0%
3時間以上4時間未満	0 0%
4時間以上5時間未満	1 13%
5時間以上6時間未満	2 25%
6時間以上12時間未満	1 13%
12時間以上	2 25%
小計	8 100%
不明	2
総計	10

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

8.異常な行動の直前の体温①(6時間以内)

	症例数(%)	
36度台	0	0%
37度台	1	25%
38度台	2	50%
39度台	1	25%
40度以上	0	0%
41度以上	0	0%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

異常な行動の発現時の体温の経過②

	症例数(%)	
発熱持続	1	25%
解熱過程	2	50%
解熱後	1	25%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

9.異常な行動の発現時刻別

	症例数(%)	
0時から6時まで	2	25%
6時から12時まで	1	13%
12時から18時まで	2	25%
18時から24時まで	3	38%
小計	8	100%
不明	2	
総計	10	

10.就寝から異常な行動の発現までの時間

	症例数(%)	
30分未満	0	0%
30分以上1時間未満	0	0%
1時間以上2時間未満	0	0%
2時間以上3時間未満	0	0%
3時間以上4時間未満	1	100%
4時間以上5時間未満	0	0%
5時間以上	0	0%
小計	1	100%
不明	9	
総計	10	

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

11.異常な行動の発現が就寝中か否か

	症例数(%)	
Yes	2	33%
No	4	67%
小計	6	100%
不明	4	
総計	10	

12.異常な行動の発現が覚醒直後か否か

	症例数 (%)	
Yes	1	25%
No	3	75%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

13.異常な行動が一眠りして回復したか否か

	症例数(%)	
Yes	2	67%
No	1	33%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

14.異常な行動に関する患者の記憶の有無

	症例数(%)	
有	1	25%
無	3	75%
小計	4	100%
不明	6	
総計	10	

15.光に対する反応の有無

	症例数(%)	
有	0	0%
無	2	100%
小計	2	100%
不明	8	
総計	10	

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

16.睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の既往歴の有無

	症例数(%)	
有	1	33%
無	2	67%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

17.睡眠時驚愕症又は睡眠時遊行症の家族歴の有無

	症例数(%)	
有	1	33%
無	2	67%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

18.異常な行動の回復までの時間

	症例数(%)	
30分未満	0	0%
30分以上1時間未満	0	0%
1時間以上6時間未満	0	0%
6時間以上24時間未満	1	20%
24時間以上	4	80%
小計	5	100%
不明	5	
総計	10	

19.異常な行動発現後に投与を継続した症例の状況

	症例数(%)	
異常な行動 ^{注)} の発現あり	1 ¹⁾	25%
異常な行動 ^{注)} の発現なし	3	75%
小計	4	100%
投与中止	4	
投与状況不明	2	
総計	10	

注) 異常な行動を含む精神神経系症状

1) 症状の持続症例

20.他剤による同様な副作用歴の有無

	症例数(%)	
有	0	0%
無	3	100%
小計	3	100%
不明	7	
総計	10	

塩酸アマンタジンの異常な行動が記録されている事例の集計

21.熱性痙攣の既往歴の有無

	症例数(%)	
有	0	0%
無	0	0%
小計	0	0%
不明	10	
総計	10	

22.熱性痙攣の家族歴の有無

	症例数(%)	
有	0	0%
無	0	0%
小計	0	0%
不明	10	
総計	10	