

タキソテール

タキソール

<p>タキソテール®注 TAXOTERE®</p> <p>ドセタキセル水和物 docetaxel hydrate</p> <p>1 バイアル (0.5mL) 中ドセタキセル 20mg 1 バイアル (2mL) 中ドセタキセル 80mg</p> <p>製造販売：サノフィ・アベンティス株式会社</p> <p>乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌、卵巣癌、食道癌、子宮体癌、 前立腺癌</p> <p>乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌</p> <p>乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌</p> <p>通常、成人に1日1回、ドセタキセルとして60mg/m² (体表面積) を1時間以上かけて3～4週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜増減すること。ただし、1回最高用量は70mg/m²とする。</p> <p>卵巣癌、食道癌、子宮体癌</p> <p>通常、成人に1日1回、ドセタキセルとして70mg/m² (体表面積) を1時間以上かけて3～4週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量すること。</p> <p>前立腺癌</p> <p>通常、成人に1日1回、ドセタキセルとして75mg/m² (体表面積) を1時間以上かけて3週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量すること。</p> <p><用法及び用量に関連する使用上の注意> (抜粋) 本剤の投与時には、通常、添付溶解液全量に溶解して10mg/mLの濃度とした後、必要量を注射筒で抜き取り、直ちに250又は500mLの生理食塩液又は5%ブドウ糖液に混和し、1時間以上かけて点滴静注すること。</p>	<p>販売名</p> <p>タキソール®注射液 30mg タキソール®注射液 100mg TAXOL® INJECTION</p>
<p>一般名</p> <p>ドセタキセル</p>	<p>一般名</p> <p>パクリタキセル paclitaxel</p>
<p>組成</p>	<p>組成</p> <p>1 バイアル (5mL) 中パクリタキセル 30mg 1 バイアル (16.7mL) 中パクリタキセル 100mg</p>
<p>会社名</p>	<p>会社名</p> <p>製造販売元：ブリストル・マイヤーズ株式会社</p>
<p>効能・効果</p>	<p>効能・効果</p> <p>卵巣癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、子宮体癌</p>
<p>用法・用量</p>	<p>用法・用量</p> <p>卵巣癌、非小細胞肺癌、胃癌及び子宮体癌にはA法を使用し、乳癌にはA法又はB法を使用する。</p> <p>A法：通常、成人にはパクリタキセルとして、1日1回210mg/m² (体表面積) を3時間かけて点滴静注し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。</p> <p>B法：通常、成人にはパクリタキセルとして、1日1回100mg/m² (体表面積) を1時間かけて点滴静注し、週1回投与を6週連続し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとして、投与を繰り返す。</p> <p>なお、投与量は、患者の状態により適宜減量する。</p>