

米国のインフルエンザワクチンの添付文書記載状況

	日本 (季節性：インフルエンザ HA ワクチン) (新型：A 型インフルエンザ HA ワクチン(H1N1 株))	米国 (季節性：AFLURIA 等) (新型：Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccine)
同時接種関連	<p><b>【用法及び用量に関連する接種上の注意】</b></p> <p>1.接種間隔 2 回接種を行う場合の接種間隔は、免疫効果を考慮すると 4 週間おくことが望ましい。</p> <p>2.他のワクチン製剤との接種間隔 生ワクチンの接種を受けた者は、通常、27 日以上、また他の不活化ワクチンの接種を受けた者は、通常、6 日以上間隔を置いて本剤を接種すること。</p>	<p><b>【DRUG INTERACTIONS】</b></p> <p>○Concurrent Use With Other Vaccines There are no data to assess the concomitant administration of AFLURIA® with other vaccines. If AFLURIA® is to be given at the same time as another injectable vaccine(s), the vaccine(s) should be administered at different injection sites. AFLURIA® should not be mixed with any other vaccine in the same syringe or vial.</p> <p>(他のワクチンとの同時接種に関するデータはないが、同時投与する場合は異なる部位に投与すること。同じシリンジ、バイアルには他のワクチンを混合するべきでない。)</p>
妊婦投与関連	<p><b>【接種上の注意】</b></p> <p>妊婦、産婦、授乳婦等への接種 妊娠中の接種に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には接種しないことを原則とし、予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種すること。</p>	<p><b>【USE IN SPECIFIC POPULATIONS】</b></p> <p>○Pregnancy Pregnancy Category C: Animal reproduction studies have not been conducted with AFLURIA®. It is also not known whether AFLURIA® can cause fetal harm when administered to a pregnant woman or can affect reproduction capacity. AFLURIA® should be given to a pregnant woman only if clearly needed.</p> <p>(動物繁殖毒性試験の成績は得られていない。しかし、妊婦に投与した場合、致死的な影響や出産に影響するという情報はない。妊婦へ使用は、必要性が明らかな場合にのみとすべきである。)</p>