

付図3.

治療スケジュールを以下に示します。

リボソーム製剤の投与		1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
項目	投与前 一週以内	第1週 Day1 治療前	Day1 治療後	第2週 Day8 治療前	Day8 治療後	第3週 Day15 治療前	Day15 治療後	第4週 Day22 治療前	Day22 治療後	第5週 Day29 治療前	Day29 治療後	第6週 Day36 治療前	Day36 治療後
同意取得	○												
皮膚テスト	○												
腫瘍径の測定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
血液検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
尿検査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全性の評価			○		○		○		○		○		○
腫瘍生検（病理検査、免疫染色、遺伝子発現）			○										○
プラスミドDNAのPCR（血液、尿）			○						○				
血中抗プラスミド抗体			○						○				
血中サイトカイン			○						○				
血中CD4/8			○						○				

項目	第7週 Day43	第8週 Day50	第9週 Day57	第10週 Day64	第11週 Day71
同意取得					
皮膚テスト					
腫瘍径の測定	○	○	○	○	○
血液検査	○	○	○	○	○
尿検査	○	○	○	○	○
安全性の評価	○	○	○	○	○
腫瘍生検（病理検査、免疫染色、遺伝子発現）					
プラスミドDNAのPCR（血液、尿）	○				○
血中抗プラスミド抗体	○				○
血中サイトカイン	○				○
血中CD4/8	○				○

（上記のように1コースを11週とする）
(入院は原則として7週間必要)

項目	第15～55週 第(4n+3)週 (n=3～13) (1回／4週)
腫瘍径の測定	○
血液検査	○
尿検査	○
安全性の評価	○