

## 副反応症例の内訳（性別・年齢別）

## 1. 性別

男	755 (31.6%)	
女	1628 (68.1%)	うち妊婦37
不明	6 (0.3%)	

## 2. 年齢別

## (1) 報告数

年齢	副反応報告数	重篤報告数	死亡報告数
0～9歳	410	52	3
10～19歳	94	12	1
20～29歳	285	23	0
30～39歳	421	35	3
40～49歳	329	32	1
50～59歳	246	28	4
60～69歳	187	44	15
70～79歳	233	84	38
80歳以上	178	92	66
不明	6	0	0
合計	2389	402	131

(2) 接種期間別報告数

接種日 ※	10歳 未満	10歳 代	20歳 代	30歳 代	40歳 代	50歳 代	60歳 代	70歳 代	80歳 以上	不明	合計
10/19 - 10/25	0	1	58	94	90	53	19	2	3	2	322
10/26 - 11/1	0	2	80	122	98	55	17	3	1	0	378
11/2 - 11/8	3	5	41	72	40	30	10	3	5	1	210
11/9 - 11/15	20	4	24	30	25	20	9	10	8	0	150
11/16 - 11/29	115	28	35	44	34	37	53	89	63	0	498
11/30 - 12/6	60	3	10	7	7	11	11	23	14	1	147
12/7 - 12/13	86	4	8	7	6	10	16	20	19	1	177
12/14 - 12/20	52	6	5	7	4	7	10	17	10	0	118
12/21 - 12/27	24	7	5	8	8	7	7	10	12	0	88
12/28 - 1/10	19	14	4	6	1	4	5	8	6	0	67
1/11 - 1/17	13	5	3	5	2	1	1	12	2	0	44
1/18 - 1/24	9	4	2	3	4	3	5	11	8	1	50
1/25 - 1/31	2	4		6	5	1	12	10	12	0	52
2/1 - 2/7	3	4	5	3	3	3	7	5	8	0	41
2/8 - 2/14	1	2	3	4	1	2	3	7	4	0	27
2/15 -	2	0	0	2	0	2	2	2	2	0	12

2/21											
2/22 - 2/28	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0	6
3/1 - 3/9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
合計	410	94	285	421	329	246	187	233	178	6	2389
	17.2%	3.9%	11.9%	17.6%	13.8%	10.3%	7.8%	9.8%	7.5%	0.3%	

### 3. 報告された重篤副反応名（2件以上、件数上位順）

#### 季節性ワクチンと新型ワクチンの比較

MedDRA/J Ver. 12.1 で副反応名をコード化したもの

2006～2008 年度 3 年間合計 季節性インフルエンザワクチン		A 型インフルエンザ H1N1 ワクチン	
副反応症例数	349	402	副反応症例数
副反応件数	503	569	副反応件数
	件数	件数	
発熱	43	67	発熱
急性散在性脳脊髄炎	41	51	アナフィラキシー反応
ギラン・バレー症候群	23	24	痙攣
アナフィラキシーショック	18	14	肝機能異常
痙攣	17	14	蕁麻疹
ショック	16	13	間質性肺疾患
肝機能異常	12	12	急性呼吸不全
注射部位腫脹	10	11	心肺停止
注射部位紅斑	8	11	嘔吐
* 肺炎	8	9	肺炎
* 顔面神経麻痺	8	9	意識変容状態
* 間質性肺疾患	8	9	頭痛
アナフィラキシー反応	7	9	喘息
発疹	7	8	ギラン・バレー症候群
アナフィラキシー様反応	6	7	失神寸前の状態
* 脳症	6	7	呼吸不全

*	特発性血小板減少性紫斑病	5	6	悪心	
*	脳炎	5	6	急性散在性脳脊髄炎	
	意識消失	5	6	浮動性めまい	
	紅斑	5	6	脳症	*
*	蜂巣炎	4	6	感覚鈍麻	
	筋力低下	4	6	呼吸困難	
	頭痛	4	5	急性心不全	
*	末梢性ニューロパチー	4	5	下痢	
	喘息	4	5	血圧低下	
	悪心	3	5	全身性皮疹	
	注射部位疼痛	3	5	ショック	
	倦怠感	3	4	心筋梗塞	*
*	末梢性浮腫	3	4	腹痛	*
	急性肝炎	3	4	倦怠感	
	黄疸	3	4	脳出血	*
	血圧低下	3	3	血小板減少性紫斑病	*
*	多発性脳神経麻痺	3	3	心不全	*
*	脳血管炎	3	3	動悸	
	呼吸困難	3	3	異常感	
	喉頭浮腫	3	3	無力症	
*	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	3	3	アナフィラキシーショック	
	蕁麻疹	3	3	インフルエンザ	
	中毒性皮疹	3	3	脳炎	*
*	貧血	2	3	呼吸停止	*
*	白血球減少症	2	3	喘鳴	*
	リンパ節症	2	2	心停止	
	回転性めまい	2	2	急性心筋梗塞	
*	ブドウ膜炎	2	2	耳鳴	
*	角膜落屑	2	2	ブドウ膜炎	*
*	腹痛	2	2	高熱	
	下痢	2	2	肝障害	
	嘔吐	2	2	アナフィラキシー様反応	
*	胸痛	2	2	酸素飽和度低下	
*	全身性浮腫	2	2	血小板数減少	*
*	腫脹	2	2	関節痛	

	肝炎	2	2	背部痛	
	肝障害	2	2	筋力低下	
*	細気管支炎	2	2	筋肉痛(※筋痛として報告)	
*	注射部位膿瘍	2	2	四肢痛	*
*	髄膜炎	2	2	脳梗塞	
*	無菌性髄膜炎	2	2	顔面神経麻痺	*
*	血中クレアチンホスホキナーゼ 増加	2	2	傾眠	
*	C-反応性蛋白増加	2	2	末梢性ニューロパチー	*
*	血小板数減少	2	2	ネフローゼ症候群	*
*	白血球数減少	2	2	アレルギー性肉芽腫性血管炎	
	関節痛	2	2	鼻漏	
*	多発性関節炎	2	2	低酸素症	
*	リウマチ性多発筋痛	2	2	子宮内胎児死亡	
*	横紋筋融解	2	2	循環虚脱	
	意識変容状態	2			
*	健忘	2			
	意識レベルの低下	2			
	熱性痙攣	2			
	脊髄炎	2			
*	神経痛性筋萎縮症	2			
*	ミラー・フィッシャー症候群	2			
*	複合性局所疼痛症候群	2			
*	異常行動	2			
*	ネフローゼ症候群	2			
*	胸水	2			
	呼吸不全	2			
	薬疹	2			
	多形紅斑	2			
*	白血球破碎性血管炎	2			
*	血管性紫斑病	2			
*	側頭動脈炎	2			

\*は添付文書に副作用名の記載がないもの