

◆施設区分別回答状況：1. 特定機能病院 (n=2,292)

(医師816、看護師1,476)

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について		今後について			現在について		今後について		
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能	看護師一般	特定看護師(仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能	看護師一般	特定看護師(仮称)
1 動脈ラインからの採血	54.9%	5.5%	94.5%	76.4%	18.2%	45.0%	14.4%	85.6%	66.2%	19.5%
2 直接動脈穿刺による採血	0.6%	37.4%	62.6%	15.4%	47.3%	0.3%	55.0%	45.0%	5.3%	39.7%
3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	25.1%	11.2%	88.8%	56.8%	32.0%	24.3%	23.0%	77.0%	47.0%	30.0%
4 トリアージのための検体検査の実施の決定	3.5%	36.9%	63.1%	17.1%	46.1%	2.3%	48.3%	51.7%	7.8%	43.8%
5 トリアージのための検体検査結果の評価	2.9%	58.7%	41.3%	7.5%	33.8%	1.5%	70.1%	29.9%	3.3%	26.5%
6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	1.6%	55.0%	45.0%	10.2%	34.8%	1.1%	71.1%	28.9%	2.9%	26.0%
7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	1.8%	72.9%	27.1%	3.9%	23.2%	1.1%	84.9%	15.1%	1.9%	13.2%
8 手術前検査の実施の決定	1.2%	49.6%	50.4%	18.8%	31.6%	0.6%	62.6%	37.4%	7.9%	29.6%
9 単純X線撮影の実施の決定	0.9%	43.8%	56.2%	17.9%	38.2%	0.8%	51.0%	49.0%	8.8%	40.2%
10 単純X線撮影の画像評価	1.2%	74.6%	25.4%	5.0%	20.4%	0.9%	80.4%	19.6%	1.8%	17.8%
11 CT、MRI検査の実施の決定	0.6%	65.5%	34.5%	8.9%	25.6%	0.3%	75.2%	24.8%	2.1%	22.7%
12 CT、MRI検査の画像評価	0.3%	86.1%	13.9%	1.9%	12.0%	0.1%	92.3%	7.7%	0.3%	7.5%
13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	10.6%	21.8%	78.2%	41.8%	36.5%	10.2%	49.6%	50.4%	21.3%	29.0%
14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	1.0%	54.8%	45.2%	6.7%	38.5%	0.3%	84.0%	16.0%	0.9%	15.1%
15 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定	1.4%	40.5%	59.5%	19.6%	39.9%	4.5%	52.6%	47.4%	16.3%	31.1%
16 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施	3.0%	30.7%	69.3%	20.4%	48.9%	7.1%	50.5%	49.5%	17.7%	31.8%
17 腹部超音波検査の実施の決定	0.5%	57.6%	42.4%	10.1%	32.3%	0.2%	71.6%	28.4%	3.3%	25.1%
18 腹部超音波検査の実施	0.2%	47.6%	52.4%	4.8%	47.6%	0.2%	69.2%	30.8%	2.4%	28.4%
19 腹部超音波検査の結果の評価	0.0%	76.0%	24.0%	2.1%	21.9%	0.1%	90.9%	9.1%	0.3%	8.7%
20 心臓超音波検査の実施の決定	0.3%	59.6%	40.4%	7.9%	32.5%	0.2%	76.8%	23.2%	1.9%	21.3%
21 心臓超音波検査の実施	0.2%	48.9%	51.1%	4.2%	46.9%	0.2%	74.2%	25.8%	1.9%	23.8%
22 心臓超音波検査の結果の評価	0.2%	78.4%	21.6%	2.5%	19.0%	0.2%	92.6%	7.4%	0.2%	7.2%
23 頸動脈超音波検査の実施の決定	0.5%	55.5%	44.5%	10.2%	34.3%	0.1%	76.2%	23.8%	2.1%	21.8%
24 頸動脈超音波検査の実施	0.7%	53.5%	46.5%	10.8%	35.7%	0.5%	71.1%	28.9%	3.3%	25.6%
25 下肢血管超音波検査の実施の決定	0.7%	52.7%	47.3%	11.9%	35.5%	0.6%	70.0%	30.0%	4.0%	26.0%
26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	6.9%	45.6%	54.4%	17.0%	37.4%	15.2%	53.7%	46.3%	21.8%	24.5%
27 12誘導心電図検査の実施の決定	20.5%	25.2%	74.8%	45.5%	29.3%	37.2%	26.8%	73.2%	52.0%	21.1%
28 12誘導心電図検査の実施	56.5%	4.8%	95.2%	74.7%	20.5%	70.8%	5.1%	94.9%	82.4%	12.6%
29 12誘導心電図検査の結果の評価	3.4%	52.1%	47.9%	16.5%	31.4%	7.8%	58.6%	41.4%	15.6%	25.8%
30 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施の決定	4.6%	28.7%	71.3%	36.8%	34.5%	3.3%	38.7%	61.3%	24.1%	37.2%
31 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施	26.6%	11.1%	88.9%	60.3%	28.6%	32.0%	19.9%	80.1%	52.2%	27.9%
32 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の結果の評価	5.4%	40.0%	60.0%	31.5%	28.5%	3.4%	57.4%	42.6%	17.1%	25.5%
33 薬剤感受性検査実施の決定	1.4%	47.1%	52.9%	20.2%	32.8%	0.4%	67.1%	32.9%	6.0%	26.9%
34 真菌検査の実施の決定	1.5%	43.6%	56.4%	22.4%	34.0%	1.7%	58.2%	41.8%	10.9%	30.9%
35 真菌検査の結果の評価	0.8%	59.3%	40.7%	14.0%	26.7%	0.9%	73.9%	26.1%	5.5%	20.6%
36 微生物学検査実施の決定	2.0%	41.7%	58.3%	22.7%	35.6%	1.1%	64.0%	36.0%	7.9%	28.1%
37 微生物学検査の実施:スワブ法	31.3%	14.5%	85.5%	57.5%	28.0%	36.2%	31.8%	68.2%	48.7%	19.5%
38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	1.1%	45.3%	54.7%	16.5%	38.2%	0.9%	67.4%	32.6%	5.2%	27.5%
39 スパイロメトリーの実施の決定	1.4%	47.3%	52.7%	19.1%	33.6%	0.9%	63.9%	36.1%	7.0%	29.1%
40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	0.0%	66.7%	33.3%	10.1%	23.2%	0.3%	76.7%	23.3%	2.6%	20.7%
41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	3.0%	48.5%	51.5%	12.9%	38.6%	1.7%	68.5%	31.5%	5.2%	26.3%
42 膀胱内圧測定実施の決定	0.8%	70.8%	29.2%	8.5%	20.8%	0.0%	76.0%	24.0%	2.6%	21.4%
43 膀胱内圧測定の実施	0.8%	53.2%	46.8%	10.3%	36.5%	1.7%	69.8%	30.2%	6.1%	24.1%
44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	0.6%	48.5%	51.5%	16.9%	34.6%	0.2%	75.2%	24.8%	3.3%	21.5%
45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	4.5%	28.7%	71.3%	28.3%	43.0%	1.3%	69.3%	30.7%	5.3%	25.4%
46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.6%	66.4%	33.6%	9.3%	24.3%	0.3%	86.7%	13.3%	1.4%	11.9%
47 骨密度検査の実施の決定	0.6%	42.6%	57.4%	20.6%	36.7%	0.2%	63.0%	37.0%	7.4%	29.6%
48 骨密度検査の結果の評価	0.2%	57.5%	42.5%	12.6%	29.9%	0.2%	77.3%	22.7%	3.7%	19.0%
49 嚥下造影の実施の決定	0.6%	52.7%	47.3%	13.5%	33.8%	0.2%	62.5%	37.5%	5.2%	32.3%
50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	0.2%	59.5%	40.5%	11.9%	28.6%	0.1%	68.8%	31.2%	3.3%	27.9%
51 嚥下内視鏡検査の実施	0.0%	73.9%	26.1%	3.3%	22.9%	0.0%	84.7%	15.3%	1.0%	14.3%
52 眼底検査の実施の決定	0.2%	53.9%	46.1%	13.8%	32.3%	0.1%	73.0%	27.0%	3.1%	23.9%
53 眼底検査の実施	0.2%	57.0%	43.0%	7.3%	35.6%	0.4%	74.4%	25.6%	3.5%	22.1%
54 眼底検査の結果の評価	0.0%	80.5%	19.5%	2.7%	16.8%	0.0%	90.5%	9.5%	0.4%	9.1%
55 ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	5.4%	35.6%	64.4%	30.0%	34.4%	2.9%	61.6%	38.4%	10.4%	28.0%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、③「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、④「看護師の実施が可能:一般看護師」⑤「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について		今後について			現在について		今後について		
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
		計	看護師一般	特定看護師(仮称)			計	看護師一般	特定看護師(仮称)	
56 酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	26.5%	25.5%	74.5%	35.2%	39.3%	38.0%	18.9%	81.1%	46.1%	35.1%
57 気管カニューレの選択・交換	9.0%	34.7%	65.3%	17.8%	47.5%	6.7%	44.7%	55.3%	10.2%	45.1%
58 経皮的気管穿刺針(トラヘラバー等)の挿入	0.7%	72.0%	28.0%	3.1%	24.9%	0.5%	76.3%	23.7%	1.4%	22.3%
59 挿管チューブの位置調節(深さの調整)	18.9%	22.3%	77.7%	31.7%	46.0%	7.7%	43.6%	56.4%	13.1%	43.4%
60 経口・経鼻挿管の実施	2.6%	56.6%	43.4%	8.1%	35.3%	1.1%	64.4%	35.6%	2.7%	32.9%
61 経口・経鼻挿管チューブの抜管	6.7%	40.1%	59.9%	16.1%	43.9%	2.0%	50.0%	50.0%	7.7%	42.3%
62 人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	6.5%	37.9%	62.1%	8.6%	53.5%	5.6%	46.0%	54.0%	6.3%	47.7%
63 人工呼吸器管理下の鎮静管理	11.1%	39.4%	60.6%	13.3%	47.3%	14.9%	51.8%	48.2%	15.0%	33.2%
64 人工呼吸器装着中の患者のウィングスケジュール作成と実施	1.7%	41.8%	58.2%	6.3%	51.8%	3.2%	44.0%	56.0%	4.8%	51.2%
65 小児の人工呼吸器の選択:HFO対応か否か	0.4%	68.5%	31.5%	2.4%	29.1%	0.4%	79.8%	20.2%	0.6%	19.6%
66 NPPV開始、中止、モード設定	2.9%	50.3%	49.7%	6.4%	43.2%	4.5%	53.2%	46.8%	5.9%	40.9%
67 痰嚥の実施の決定	42.5%	17.1%	82.9%	59.8%	23.1%	46.1%	13.3%	86.7%	65.4%	21.3%
68 創部洗浄・消毒	47.5%	10.3%	89.7%	60.3%	29.4%	50.5%	14.7%	85.3%	59.2%	26.1%
69 褥瘡の壊死組織のデブリードマン	6.8%	46.3%	53.7%	13.4%	40.3%	8.1%	39.6%	60.4%	8.1%	52.2%
70 電気凝固メスによる止血(褥瘡部)	0.6%	58.6%	41.4%	5.0%	36.3%	0.2%	71.4%	28.6%	2.0%	26.6%
71 巻爪処置(ニッパー、ワイヤーを用いた処置)	21.1%	34.7%	65.3%	31.7%	33.6%	15.6%	42.7%	57.3%	15.6%	41.7%
72 絆創・鶏眼処置(コーンカッター等を用いた処置)	12.9%	32.4%	67.6%	27.0%	40.6%	8.4%	55.0%	45.0%	9.8%	35.2%
73 皮下膿瘍の切開・排膿・皮下組織まで	0.6%	63.4%	36.6%	5.7%	30.9%	0.2%	71.2%	28.8%	1.8%	27.0%
74 創傷の強圧閉鎖療法の実施	6.3%	48.0%	52.0%	13.5%	38.5%	6.7%	63.4%	36.6%	7.9%	28.7%
75 表創(非感染創)の縫合:皮下組織まで(手術室外で)	0.4%	59.6%	40.4%	5.0%	35.4%	0.1%	74.6%	25.4%	1.3%	24.1%
76 非感染創の縫合:皮下組織から筋層まで(手術室外で)	0.6%	71.4%	28.6%	3.0%	25.6%	0.1%	88.6%	11.4%	0.5%	10.9%
77 医療用ホットキスの使用(手術室外で)	0.2%	50.2%	49.8%	9.7%	40.1%	0.0%	71.8%	28.2%	3.9%	24.4%
78 体表創の糸糸・抜糸	1.2%	30.2%	69.8%	21.0%	48.8%	0.1%	47.1%	52.9%	12.8%	40.0%
79 動脈ライン確保	0.5%	56.1%	43.9%	5.5%	38.5%	0.4%	65.1%	34.9%	2.8%	32.1%
80 末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	1.4%	63.5%	36.5%	4.4%	32.0%	0.4%	85.6%	14.4%	1.0%	13.5%
81 中心静脈カテーテル挿入	0.2%	87.1%	12.9%	0.5%	12.4%	0.0%	94.6%	5.4%	0.1%	5.3%
82 中心静脈カテーテル抜去	1.2%	33.7%	66.3%	23.8%	42.5%	0.6%	61.5%	38.5%	8.4%	30.1%
83 尿管・胆管チューブの管理:洗浄	5.8%	50.6%	49.4%	14.5%	34.9%	2.0%	71.8%	28.2%	5.3%	22.9%
84 尿管・胆管チューブの入れ替え	0.2%	78.9%	21.1%	2.7%	18.4%	0.0%	96.4%	3.6%	0.2%	3.3%
85 腹腔穿刺(一時的なカテーテル留置を含む)	0.2%	85.3%	14.7%	0.8%	13.9%	0.0%	95.0%	5.0%	0.2%	4.8%
86 腹腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む)	1.3%	47.9%	52.1%	15.1%	37.0%	0.4%	72.1%	27.9%	6.2%	21.8%
87 胸腔穿刺	0.0%	88.2%	11.8%	0.5%	11.3%	0.0%	96.6%	3.4%	0.0%	3.4%
88 胸腔ドレーン抜去	0.3%	55.5%	44.5%	9.1%	35.4%	0.2%	82.3%	17.7%	1.8%	16.0%
89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	9.9%	40.1%	59.9%	18.2%	41.7%	16.8%	55.7%	44.3%	18.1%	26.2%
90 心囊ドレーン抜去	0.2%	63.5%	36.5%	7.6%	28.9%	0.0%	89.8%	10.2%	0.4%	9.8%
91 創部ドレーン抜去	0.4%	41.1%	58.9%	19.3%	39.6%	0.0%	69.0%	31.0%	6.3%	24.7%
92 創部ドレーン短切(カット)	0.6%	40.6%	59.4%	20.1%	39.3%	0.2%	65.8%	34.2%	7.7%	26.5%
93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理	3.3%	53.3%	46.7%	6.0%	40.7%	7.8%	64.7%	35.3%	8.1%	27.2%
94 「一時的ペースメーカー」の抜去	0.0%	59.0%	41.0%	8.6%	32.4%	0.0%	85.4%	14.6%	0.8%	13.8%
95 PCPS等補助循環の管理・操作	1.1%	62.2%	37.8%	2.7%	35.1%	3.0%	79.3%	20.7%	2.1%	18.6%
96 大動脈バルーンパンピングチューブの抜去	0.0%	76.0%	24.0%	2.3%	21.7%	0.2%	93.5%	6.5%	0.2%	6.3%
97 小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	0.9%	66.8%	33.2%	8.1%	25.1%	0.4%	81.6%	18.4%	2.6%	15.8%
98 小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	3.0%	61.6%	38.4%	10.4%	27.9%	9.4%	74.4%	25.6%	9.6%	16.0%
99 小児の臍カテ:臍動脈の輸液路確保	0.0%	71.7%	28.3%	4.2%	24.2%	0.0%	92.4%	7.6%	0.0%	7.6%
100 幹細胞移植:接続と滴数調整	4.3%	56.8%	43.2%	10.0%	33.2%	6.2%	75.3%	24.7%	8.4%	16.3%
101 関節穿刺	0.0%	81.6%	18.4%	2.9%	15.5%	0.1%	93.3%	6.7%	0.1%	6.6%
102 導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	17.7%	32.3%	67.7%	37.2%	30.4%	42.6%	20.4%	79.6%	59.7%	19.9%
103 導尿・留置カテーテルの挿入の実施	57.9%	10.2%	89.8%	66.2%	23.6%	82.1%	7.4%	92.6%	84.7%	7.9%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、③「看護師の実施が可能:一般看護師」⑤「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

	医療処置項目	医師回答					看護師回答						
		現在について	今後について				現在について	今後について					
			A	B	C	D		E	A	B	C	D	E
			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			特定看護師(仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		特定看護師(仮称)
104	飲水の開始・中止の決定	8.5%	37.7%	62.3%	26.1%	36.2%	12.2%	32.1%	67.9%	30.3%	37.7%		
105	食事の開始・中止の決定	6.4%	39.6%	60.4%	23.6%	36.8%	11.9%	34.4%	65.6%	27.3%	38.3%		
106	治療(経腸栄養含む)内容の決定・変更	8.9%	34.7%	65.3%	22.3%	43.0%	11.0%	35.1%	64.9%	18.2%	46.7%		
107	小児のミルクの種類・量・濃度の決定	8.0%	36.1%	63.9%	19.8%	44.1%	5.9%	43.5%	56.5%	12.3%	44.2%		
108	小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定	4.6%	45.3%	54.7%	14.6%	40.0%	2.2%	58.3%	41.7%	5.3%	36.4%		
109	腸ろうの管理、チューブの入れ替え	3.5%	48.4%	51.6%	11.0%	40.6%	1.3%	69.3%	30.7%	3.8%	26.9%		
110	胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	5.4%	35.2%	64.8%	20.1%	44.7%	1.6%	55.1%	44.9%	10.7%	34.2%		
111	経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	11.0%	29.1%	70.9%	28.8%	42.1%	19.5%	32.7%	67.3%	36.7%	30.6%		
112	胃ろうチューブ・ボタンの交換	4.3%	35.6%	64.4%	19.4%	45.0%	2.6%	55.4%	44.6%	9.9%	34.7%		
113	膀胱ろうカテーテルの交換	3.5%	38.2%	61.8%	16.1%	45.7%	2.1%	65.2%	34.8%	5.8%	29.0%		
114	安静度・活動や清潔の範囲の決定	16.9%	26.5%	73.5%	36.3%	37.2%	21.0%	25.5%	74.5%	40.5%	34.0%		
115	隔離の開始と解除の判断	18.6%	28.6%	71.4%	35.5%	35.8%	26.3%	29.2%	70.8%	38.3%	32.6%		
116	拘束の開始と解除の判断	34.9%	19.5%	80.5%	45.4%	35.0%	55.2%	17.6%	82.4%	59.5%	22.9%		
117	全身麻酔の導入	0.3%	83.1%	16.9%	0.8%	16.1%	0.2%	89.2%	10.8%	0.4%	10.4%		
118	術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素濃度と濃度、輸液量等の調整)	0.0%	63.0%	37.0%	1.6%	35.4%	0.2%	85.5%	14.5%	0.8%	13.7%		
119	麻酔の覚醒	0.0%	73.6%	26.4%	0.5%	25.9%	0.6%	85.8%	14.2%	1.2%	13.1%		
120	局所麻酔(硬膜外・腰椎)	0.0%	84.1%	15.9%	0.5%	15.4%	0.2%	92.6%	7.4%	0.4%	7.0%		
121	麻酔の補足説明:「麻酔による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	7.0%	39.4%	60.6%	11.9%	48.8%	8.1%	65.1%	34.9%	10.4%	24.6%		
122	神経ブロック	0.0%	90.0%	10.0%	0.4%	9.6%	0.2%	95.9%	4.1%	0.0%	4.1%		
123	硬膜外チューブの抜去	1.0%	46.2%	53.8%	19.6%	34.1%	2.6%	66.5%	33.5%	8.1%	25.4%		
124	皮膚表面の麻酔(注射)	0.0%	60.7%	39.3%	5.0%	34.3%	0.3%	75.1%	24.9%	3.5%	21.3%		
125	手術執刀までの準備(体位、消毒)	16.7%	27.6%	72.4%	34.6%	37.8%	21.0%	43.2%	56.8%	30.9%	25.9%		
126	手術時の機器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)	3.6%	36.7%	63.3%	17.9%	45.4%	3.0%	69.8%	30.2%	8.5%	21.7%		
127	手術時の機器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)	5.9%	27.5%	72.5%	24.7%	47.8%	3.0%	63.9%	36.1%	11.2%	24.8%		
128	手術の補足説明:「術者による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	7.5%	33.0%	67.0%	17.1%	49.9%	8.4%	63.3%	36.7%	11.6%	25.1%		
129	術前サマリーの作成	11.5%	38.2%	61.8%	21.0%	40.8%	11.4%	76.0%	24.0%	11.6%	12.5%		
130	手術サマリーの作成	7.8%	51.7%	48.3%	15.8%	32.6%	5.5%	85.3%	14.7%	6.2%	8.5%		
131	血糖値に応じたインスリン投与量の判断	14.5%	36.9%	63.1%	22.7%	40.4%	19.0%	38.2%	61.8%	22.5%	39.3%		
132	低血糖時のブドウ糖投与	57.0%	6.0%	94.0%	68.9%	25.2%	78.2%	4.5%	95.5%	83.0%	12.5%		
133	脱水の判断と補正(点滴)	4.0%	45.3%	54.7%	18.9%	35.8%	7.6%	43.6%	56.4%	16.3%	40.1%		
134	末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	44.2%	9.2%	90.8%	61.4%	29.4%	66.3%	7.7%	92.3%	74.4%	17.8%		
135	心臓停止患者への気道確保、マスク換気	28.1%	17.7%	82.3%	48.9%	33.4%	57.2%	15.4%	84.6%	63.0%	21.6%		
136	心臓停止患者への電気的除細動実施	14.9%	18.4%	81.6%	41.3%	40.3%	18.1%	30.3%	69.7%	34.2%	35.5%		
137	血液透析・CHDFの操作、管理	8.3%	41.3%	58.7%	11.8%	46.8%	10.9%	54.3%	45.7%	9.0%	36.7%		
138	救急時の輸液確保目的の骨髄穿刺(小児)	0.7%	59.9%	40.1%	6.9%	33.2%	0.9%	83.2%	16.8%	0.5%	16.3%		
139	予防接種の実施判断	2.8%	44.9%	55.1%	16.7%	38.4%	1.2%	67.2%	32.8%	4.7%	28.1%		
140	予防接種の実施	28.2%	10.0%	90.0%	58.6%	31.4%	36.0%	25.9%	74.1%	53.9%	20.2%		
141	特定健診などの健康診査の実施	7.7%	37.5%	62.5%	27.4%	35.1%	3.4%	64.7%	35.3%	8.1%	27.2%		
142	子宮頸がん検診:細胞診のオーダー(一次スクリーニング)、検体採取	6.0%	32.8%	67.2%	19.0%	48.3%	0.0%	62.6%	37.4%	5.9%	31.5%		
143	前立腺がん検診:触診・PSAオーダー(一次スクリーニング)	2.5%	41.0%	59.0%	16.4%	42.6%	0.0%	69.9%	30.1%	3.5%	26.6%		
144	大腸がん検診:便潜血オーダー(一次スクリーニング)	5.0%	22.9%	77.1%	37.1%	40.0%	1.6%	53.5%	46.5%	11.5%	34.9%		
145	乳がん検診:視診・触診(一次スクリーニング)	4.3%	35.7%	64.3%	17.4%	47.0%	0.3%	63.9%	36.1%	4.9%	31.3%		
146	高脂血症用剤の選択・使用	7.4%	67.9%	32.1%	10.7%	21.5%	22.5%	60.4%	39.6%	23.9%	15.6%		
147	降圧剤の選択・使用	9.1%	68.3%	31.7%	10.1%	21.6%	27.0%	59.6%	40.4%	26.4%	14.0%		
148	糖尿病治療薬の選択・使用	8.6%	70.6%	29.4%	9.3%	20.0%	26.8%	57.6%	42.4%	26.1%	16.4%		
149	糖尿病腎治療薬の選択・使用	7.4%	68.0%	32.0%	9.4%	22.6%	21.6%	63.2%	36.8%	22.9%	13.9%		
150	子宮収縮抑制剤の選択・使用	5.7%	73.6%	26.4%	6.4%	20.0%	16.4%	72.4%	27.6%	15.9%	11.7%		
151	K、Cl、Naの選択・使用	8.9%	66.4%	33.6%	11.2%	22.4%	23.2%	64.0%	36.0%	22.9%	13.1%		
152	カテコラミンの選択・使用	8.6%	73.5%	26.5%	9.2%	17.3%	22.9%	67.2%	32.8%	21.3%	11.4%		
153	利尿剤の選択・使用	10.4%	64.1%	35.9%	12.2%	23.6%	27.1%	59.4%	40.6%	27.4%	13.2%		
154	基本的な輸液:高カロリー輸液	9.1%	55.0%	45.0%	12.6%	32.5%	25.3%	49.9%	50.1%	27.4%	22.7%		
155	指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全剤)の継続使用	13.2%	31.5%	68.5%	34.8%	33.7%	24.9%	37.4%	62.6%	34.6%	28.0%		

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

医療従事者	医療従事者 職種	医療従事者 職種	医師回答					看護師回答				
			現在について		今後について			現在について		今後について		
			A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
		医療従事者 職種	現在 実施している	医師が 実施すべき	看護師が 実施可能	看護師一般	特定看護師 (仮称)	現在 実施している	医師が 実施すべき	看護師が 実施可能	看護師一般	特定看護師 (仮称)
156	薬剤の選択・使用	下剤(坐薬も含む)の選択・使用	31.3%	23.4%	76.6%	51.2%	25.4%	52.6%	16.6%	83.4%	62.8%	20.6%
157	157	胃薬:制酸剤の選択・使用	17.3%	35.1%	64.9%	37.7%	27.2%	37.3%	29.4%	70.6%	47.3%	23.3%
158	158	胃薬:胃粘膜保護剤の選択・使用	17.8%	32.1%	67.9%	40.9%	27.0%	37.2%	28.7%	71.3%	47.5%	23.8%
159	159	整腸剤の選択・使用	19.1%	27.6%	72.4%	44.5%	27.9%	40.1%	22.8%	77.2%	53.5%	23.7%
160	160	制吐剤の選択・使用	23.0%	30.9%	69.1%	41.7%	27.4%	44.9%	23.6%	76.4%	52.9%	23.4%
161	161	止痛剤の選択・使用	19.8%	32.7%	67.3%	40.8%	26.5%	42.9%	24.1%	75.9%	52.8%	23.1%
162	162	鎮痛剤の選択・使用	26.3%	36.3%	63.7%	37.8%	25.8%	47.4%	26.9%	73.1%	50.5%	22.6%
163	163	解熱剤の選択・使用	27.5%	34.3%	65.7%	40.2%	25.6%	48.4%	26.6%	73.4%	52.2%	21.2%
164	164	去痰剤(小児)の選択・使用	13.9%	45.1%	54.9%	26.1%	28.7%	32.2%	48.5%	51.5%	32.9%	18.5%
165	165	抗けいれん薬(小児)の選択・使用	12.4%	56.8%	43.2%	15.9%	27.3%	29.9%	57.4%	42.6%	28.3%	14.4%
166	166	インフルエンザ薬の選択・使用	10.8%	53.5%	46.5%	21.0%	25.5%	25.3%	52.3%	47.7%	28.1%	19.6%
167	167	外用薬の選択・使用	28.9%	25.4%	74.6%	45.9%	28.7%	47.7%	20.9%	79.1%	55.0%	24.2%
168	168	創傷被覆材(ドレッシング材)の選択・使用	34.2%	21.1%	78.9%	43.9%	35.0%	70.0%	10.1%	89.9%	66.9%	23.0%
169	169	睡眠剤の選択・使用	24.5%	43.9%	56.1%	30.8%	25.3%	42.4%	35.5%	64.5%	44.9%	19.6%
170	170	抗精神病薬の選択・使用	13.1%	67.6%	32.4%	13.7%	18.7%	32.8%	56.6%	43.4%	29.8%	13.6%
171	171	抗不安薬の選択・使用	15.4%	60.7%	39.3%	17.9%	21.4%	34.3%	53.3%	46.7%	32.3%	14.4%
172	172	ネブライザーの開始、使用薬液の選択	24.0%	29.5%	70.5%	37.5%	33.0%	30.0%	26.6%	73.4%	43.0%	30.4%
173	173	感染症徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)	4.3%	72.3%	27.7%	6.6%	21.1%	9.8%	72.1%	27.9%	9.6%	18.4%
174	174	抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	2.7%	76.5%	23.5%	4.5%	19.0%	5.1%	75.4%	24.6%	5.9%	18.7%
175	175	基本的な輸液:糖質輸液、電解質輸液	8.6%	45.8%	54.2%	17.4%	36.8%	22.1%	41.2%	58.8%	26.1%	32.7%
176	176	血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	2.3%	79.9%	20.1%	2.4%	17.7%	11.5%	76.5%	23.5%	9.6%	13.9%
177	177	化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	6.9%	62.8%	37.2%	6.4%	30.8%	22.3%	46.6%	53.4%	19.6%	33.8%
178	178	抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	3.8%	62.0%	38.0%	7.1%	30.9%	4.1%	60.7%	39.3%	7.6%	31.7%
179	179	放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	5.1%	52.5%	47.5%	10.3%	37.2%	11.7%	40.2%	59.8%	16.3%	43.5%
180	180	副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	2.9%	70.8%	29.2%	5.9%	23.3%	5.6%	67.7%	32.3%	7.8%	24.5%
181	181	家族計画(避妊)における低用量ピル	3.4%	57.8%	42.2%	8.6%	33.6%	2.5%	60.0%	40.0%	3.6%	36.4%
182	182	標準外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	3.9%	57.7%	42.3%	9.4%	32.9%	10.8%	62.0%	38.0%	12.2%	25.8%
183	183	自己血糖測定開始の決定	6.1%	43.0%	57.0%	17.7%	39.3%	29.0%	24.5%	75.5%	39.1%	36.4%
184	184	痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施時期定:WHO方式がん疼痛治療法等	4.1%	52.8%	47.2%	6.1%	41.1%	7.3%	43.6%	56.4%	7.1%	49.3%
185	185	痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整:WHO方式がん疼痛治療法等	4.7%	48.9%	51.1%	6.6%	44.5%	9.4%	41.1%	58.9%	7.9%	51.1%
186	186	がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	2.4%	54.1%	45.9%	4.7%	41.2%	7.6%	45.4%	54.6%	6.8%	47.9%
187	187	訪問看護の必要性の判断、依頼	32.6%	11.0%	89.0%	46.4%	42.6%	73.0%	4.9%	95.1%	74.5%	20.6%
188	188	日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	39.3%	15.4%	84.6%	47.3%	37.3%	51.7%	23.8%	76.2%	54.1%	22.1%
189	189	リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	13.2%	20.2%	79.8%	34.8%	45.0%	28.8%	17.4%	82.6%	43.2%	39.4%
190	190	整形外科領域の補助具の決定、注文	5.6%	40.7%	59.3%	15.4%	43.8%	4.7%	51.4%	48.6%	9.7%	39.0%
191	191	理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	7.7%	21.3%	78.7%	30.7%	48.0%	12.1%	24.3%	75.7%	34.3%	41.4%
192	192	他科への診療依頼	1.2%	67.8%	32.2%	11.8%	20.4%	4.2%	62.0%	38.0%	12.7%	25.3%
193	193	他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	1.0%	69.4%	30.6%	8.5%	22.0%	3.9%	76.2%	23.8%	6.0%	17.9%
194	194	在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	1.2%	67.4%	32.6%	7.0%	25.6%	1.9%	81.2%	18.8%	2.6%	16.3%
195	195	退院サマリー(病院全体)の作成	4.1%	61.5%	38.5%	13.4%	25.1%	27.5%	59.5%	40.5%	26.4%	14.1%
196	196	患者・家族・医療従事者教育	36.3%	16.5%	83.5%	37.7%	45.8%	76.9%	8.7%	91.3%	60.4%	31.0%
197	197	栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	16.5%	12.7%	87.3%	43.5%	43.8%	26.8%	14.3%	85.7%	54.4%	31.3%
198	198	他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	17.6%	23.4%	76.6%	38.9%	37.7%	35.1%	17.2%	82.8%	45.4%	37.4%
199	199	家族療法・カウンセリングの依頼	17.1%	14.5%	85.5%	39.1%	46.3%	25.8%	21.8%	78.2%	40.9%	37.2%
200	200	認知・行動療法の依頼	5.0%	31.5%	68.5%	24.9%	43.6%	7.1%	38.5%	61.5%	22.5%	39.1%
201	201	認知・行動療法の実施・評価	5.9%	37.1%	62.9%	19.4%	43.5%	4.3%	49.7%	50.3%	8.6%	41.7%
202	202	支持的精神療法の実施の決定	11.4%	29.6%	70.4%	26.0%	44.4%	12.1%	42.6%	57.4%	18.8%	38.6%
203	203	患者の入院と退院の判断	2.4%	78.4%	21.6%	5.0%	16.6%	2.5%	75.5%	24.5%	5.7%	18.8%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医師行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医師行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

◆施設区別回答状況:2. 特定機能病院以外の病院 (n=4,455)

(医師1,408、看護師3,047)

検査処置項目	医師回答					看護師回答						
	現在について	今後について				現在について	今後について					
		A	B	C	D		E	A	B	C	D	E
1 動脈ラインからの採血	68.5%	6.6%	93.4%	79.7%	13.7%	53.1%	22.2%	77.8%	58.9%	18.9%		
2 直接動脈穿刺による採血	2.9%	36.4%	63.6%	17.1%	46.5%	2.4%	61.3%	38.7%	6.5%	32.3%		
3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	37.8%	13.0%	87.0%	60.9%	26.1%	31.0%	31.4%	68.6%	43.5%	25.1%		
4 トリアージのための検体検査の実施の決定	5.7%	34.6%	65.4%	21.0%	44.3%	6.4%	43.9%	56.1%	12.1%	43.9%		
5 トリアージのための検体検査結果の評価	3.8%	56.6%	43.4%	12.5%	30.9%	3.5%	65.8%	34.2%	5.0%	29.2%		
6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	2.9%	57.1%	42.9%	11.2%	31.7%	4.1%	68.9%	31.1%	6.4%	24.7%		
7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	3.2%	74.7%	25.3%	6.2%	19.1%	2.2%	83.9%	16.1%	2.6%	13.5%		
8 手術前検査の実施の決定	4.9%	46.8%	53.2%	20.3%	32.9%	5.1%	59.8%	40.2%	12.6%	27.6%		
9 単純X線撮影の実施の決定	3.5%	43.5%	56.5%	20.5%	36.0%	3.6%	50.4%	49.6%	12.9%	36.7%		
10 単純X線撮影の画像評価	1.7%	76.1%	23.9%	5.6%	18.3%	1.1%	80.5%	19.5%	2.8%	16.7%		
11 CT、MRI検査の実施の決定	1.9%	66.3%	33.7%	9.9%	23.8%	2.4%	72.4%	27.6%	5.3%	22.3%		
12 CT、MRI検査の画像評価	1.1%	87.4%	12.6%	3.1%	9.5%	0.7%	90.0%	10.0%	1.4%	8.6%		
13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	42.3%	16.2%	83.8%	61.0%	22.8%	42.5%	39.7%	60.3%	37.2%	23.1%		
14 IVR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	2.4%	63.4%	36.6%	5.7%	30.9%	0.7%	82.6%	17.4%	2.8%	14.5%		
15 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定	12.3%	38.4%	61.6%	31.5%	30.1%	11.9%	53.6%	46.4%	19.7%	26.7%		
16 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施	15.7%	31.2%	68.8%	31.8%	37.0%	16.9%	50.5%	49.5%	23.0%	26.5%		
17 腹部超音波検査の実施の決定	1.5%	56.2%	43.8%	13.3%	30.5%	1.9%	68.7%	31.3%	5.2%	26.1%		
18 腹部超音波検査の実施	0.4%	48.7%	51.3%	6.3%	44.9%	0.3%	67.5%	32.5%	2.5%	30.0%		
19 腹部超音波検査の結果の評価	0.3%	74.2%	25.8%	4.1%	21.8%	0.4%	87.9%	12.1%	0.7%	11.5%		
20 心臓超音波検査の実施の決定	1.2%	58.8%	41.2%	11.1%	30.1%	1.7%	73.5%	26.5%	3.9%	22.6%		
21 心臓超音波検査の実施	0.3%	50.9%	49.1%	4.6%	44.5%	0.3%	72.0%	28.0%	1.7%	26.3%		
22 心臓超音波検査の結果の評価	0.4%	77.7%	22.3%	2.7%	19.6%	0.3%	89.7%	10.3%	0.6%	9.6%		
23 頸動脈超音波検査の実施の決定	0.7%	56.1%	43.9%	10.9%	32.9%	1.2%	74.3%	25.7%	3.6%	22.0%		
24 表在超音波検査の実施の決定	0.8%	53.7%	46.3%	12.3%	34.0%	1.6%	72.0%	28.0%	4.2%	23.8%		
25 下肢血管超音波検査の実施の決定	1.7%	51.8%	48.2%	13.1%	35.1%	1.9%	70.0%	30.0%	4.8%	25.2%		
26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	10.0%	44.9%	55.1%	22.1%	33.0%	14.6%	56.2%	43.8%	18.3%	25.5%		
27 12誘導心電図検査の実施の決定	30.8%	22.3%	77.7%	51.7%	25.9%	35.0%	26.3%	73.7%	50.0%	23.7%		
28 12誘導心電図検査の実施	64.1%	4.5%	95.5%	80.6%	14.8%	64.2%	7.8%	92.2%	78.4%	13.8%		
29 12誘導心電図検査の結果の評価	8.4%	49.9%	50.1%	17.8%	32.2%	9.7%	56.7%	43.3%	17.5%	25.8%		
30 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施の決定	9.5%	27.8%	72.2%	40.7%	31.5%	9.9%	37.2%	62.8%	31.6%	31.2%		
31 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の実施	45.7%	10.5%	89.5%	68.3%	21.2%	52.3%	19.5%	80.5%	61.2%	19.3%		
32 感染症検査(インフルエンザ・ノロウイルス等)の結果の評価	10.7%	39.0%	61.0%	33.4%	27.7%	7.1%	57.7%	42.3%	20.0%	22.3%		
33 薬剤感受性検査実施の決定	2.9%	47.8%	52.2%	19.8%	32.3%	3.5%	66.7%	33.3%	7.7%	25.6%		
34 真菌検査の実施の決定	3.0%	44.8%	55.2%	22.5%	32.8%	5.0%	57.3%	42.7%	14.3%	28.4%		
35 真菌検査の結果の評価	1.4%	58.0%	42.0%	14.8%	27.1%	2.0%	73.6%	26.4%	6.7%	19.7%		
36 微生物学検査実施の決定	5.3%	43.3%	56.7%	24.3%	32.4%	3.2%	65.9%	34.1%	9.2%	24.9%		
37 微生物学検査の実施:スワブ法	44.7%	16.0%	84.0%	62.4%	21.6%	41.0%	35.6%	64.4%	47.7%	16.7%		
38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	1.8%	48.4%	51.6%	17.2%	34.3%	2.7%	69.0%	31.0%	6.7%	24.3%		
39 スパイロメトリーの実施の決定	2.6%	47.4%	52.6%	20.4%	32.2%	2.4%	63.7%	36.3%	9.3%	27.0%		
40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	1.2%	57.8%	42.2%	15.7%	26.5%	1.6%	78.3%	21.7%	3.7%	17.9%		
41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	3.5%	48.0%	52.0%	19.3%	32.7%	2.7%	70.7%	29.3%	7.2%	22.1%		
42 膀胱内圧測定実施の決定	0.8%	59.0%	41.0%	14.7%	26.3%	1.6%	76.9%	23.1%	4.7%	18.4%		
43 膀胱内圧測定の実施	2.6%	50.4%	49.6%	18.0%	31.6%	4.7%	70.3%	29.7%	7.9%	21.8%		
44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	1.9%	51.6%	48.4%	16.9%	31.5%	1.5%	73.4%	26.6%	4.8%	21.7%		
45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	4.1%	34.6%	65.4%	25.5%	39.9%	1.7%	66.1%	33.9%	6.6%	27.3%		
46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.6%	64.6%	35.4%	10.5%	25.0%	0.4%	83.6%	16.4%	2.1%	14.3%		
47 骨密度検査の実施の決定	1.6%	45.5%	54.5%	20.6%	33.9%	1.7%	62.3%	37.7%	10.5%	27.2%		
48 骨密度検査の結果の評価	0.9%	58.1%	41.9%	12.1%	29.8%	0.5%	74.0%	26.0%	5.0%	21.0%		
49 嚥下造影の実施の決定	2.0%	51.9%	48.1%	13.1%	35.0%	2.3%	58.0%	42.0%	7.7%	34.2%		
50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	1.4%	57.6%	42.4%	9.2%	33.3%	1.6%	65.0%	35.0%	5.8%	29.2%		
51 嚥下内視鏡検査の実施	0.6%	76.2%	23.8%	4.3%	19.4%	0.3%	82.4%	17.6%	1.5%	16.1%		
52 眼底検査の実施の決定	0.8%	53.4%	46.6%	12.2%	34.4%	1.8%	71.1%	28.9%	5.9%	23.0%		
53 眼底検査の実施	2.3%	58.5%	41.5%	9.0%	32.6%	4.9%	68.2%	31.8%	8.6%	23.2%		
54 眼底検査の結果の評価	0.4%	79.3%	20.7%	3.6%	17.0%	0.2%	87.9%	12.1%	1.6%	10.5%		
55 ACT(活性化部分ケルセチン)の測定実施の決定	8.2%	39.4%	60.6%	26.7%	34.0%	5.5%	63.2%	36.8%	12.2%	24.6%		

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医師は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 【現在について】で、①「この医師は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、②「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、③「看護師の実施が可能:一般看護師」④「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について	今後について				現在について	今後について			
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能			現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能		
			計	看護師一般	特定看護師(仮称)			計	看護師一般	特定看護師(仮称)
56 酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	45.7%	19.1%	80.9%	48.8%	32.1%	51.1%	17.5%	82.5%	52.5%	29.9%
57 気管カニューレの選択・交換	10.8%	32.1%	67.9%	19.2%	48.7%	13.1%	48.1%	51.9%	13.6%	38.4%
58 経皮的気管穿刺針(トラヘラバー等)の挿入	2.3%	71.3%	28.7%	3.2%	25.5%	0.8%	78.2%	21.8%	2.2%	19.6%
59 挿管チューブの位置調節(深さの調整)	28.2%	22.6%	77.4%	34.8%	42.6%	11.9%	44.0%	56.0%	14.8%	41.2%
60 経口・経鼻挿管の実施	7.1%	56.2%	43.8%	9.3%	34.4%	4.7%	62.5%	37.5%	5.0%	32.5%
61 経口・経鼻挿管チューブの抜管	11.9%	42.1%	57.9%	17.9%	40.1%	6.8%	48.1%	51.9%	13.0%	38.9%
62 人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	14.1%	35.5%	64.5%	13.4%	51.2%	11.4%	45.6%	54.4%	9.9%	44.5%
63 人工呼吸器管理下の鎮静管理	27.1%	33.4%	66.6%	24.9%	41.7%	26.9%	46.9%	53.1%	21.1%	32.0%
64 人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施	5.7%	41.7%	58.3%	8.0%	50.3%	7.9%	41.1%	58.9%	7.6%	51.3%
65 小児の人工呼吸器の選択:HF0対応か否か	2.0%	68.1%	31.9%	2.9%	29.0%	0.9%	78.2%	21.8%	0.8%	20.9%
66 NPPV開始、中止、モード設定	6.9%	46.6%	53.4%	8.9%	44.5%	6.8%	53.7%	46.3%	6.9%	39.4%
67 洗眼の実施の決定	52.8%	15.1%	84.9%	65.7%	19.1%	57.8%	13.3%	86.7%	69.3%	17.4%
68 創部洗浄・消毒	60.7%	8.7%	91.3%	68.5%	22.8%	67.0%	12.3%	87.7%	67.2%	20.5%
69 褥瘡の壊死組織のデブリードマン	6.8%	47.7%	52.3%	10.5%	41.9%	8.1%	43.0%	57.0%	8.7%	48.2%
70 電気凝固メスによる止血(褥瘡部)	1.3%	61.6%	38.4%	4.5%	33.9%	0.7%	72.6%	27.4%	1.8%	25.6%
71 巻爪処置(ニッパー、ワイヤーを用いた処置)	22.7%	34.0%	66.0%	30.4%	35.6%	21.2%	40.3%	59.7%	21.6%	38.1%
72 膀胱・鶏眼処置(コーンカッター等を用いた処置)	13.6%	35.6%	64.4%	27.6%	36.9%	11.5%	50.2%	49.8%	15.6%	34.2%
73 皮下腫瘍の切開・排膿:皮下組織まで	1.2%	66.3%	33.7%	5.7%	28.0%	1.1%	72.1%	27.9%	2.7%	25.2%
74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施	10.1%	52.1%	47.9%	11.5%	36.4%	11.6%	63.8%	36.3%	10.2%	26.1%
75 表創(非感染創)の縫合:皮下組織まで(手術室外で)	1.3%	63.7%	36.3%	4.3%	32.0%	0.6%	76.8%	23.2%	1.1%	22.1%
76 非感染創の縫合:皮下組織から筋層まで(手術室外で)	1.3%	74.3%	25.7%	2.8%	22.9%	0.5%	87.5%	12.5%	0.8%	11.7%
77 医療用ホットキスの使用(手術室外で)	1.7%	53.9%	46.1%	10.3%	35.8%	0.5%	71.8%	28.2%	3.4%	24.8%
78 体表面創の抜糸・抜釘	1.8%	33.9%	66.1%	22.0%	44.1%	0.8%	53.2%	46.8%	10.2%	36.6%
79 動脈ライン確保	2.4%	59.2%	40.8%	4.6%	36.2%	0.8%	76.4%	23.6%	1.5%	22.1%
80 末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	4.3%	66.3%	33.7%	4.5%	29.2%	1.2%	87.7%	12.3%	1.4%	10.8%
81 中心静脈カテーテル挿入	1.3%	87.7%	12.3%	0.7%	11.5%	0.1%	94.6%	5.4%	0.0%	5.4%
82 中心静脈カテーテル抜去	3.5%	34.7%	65.3%	26.9%	38.4%	2.8%	60.1%	39.9%	10.6%	29.2%
83 尿管・尿管チューブの管理・洗浄	9.2%	48.0%	52.0%	16.7%	35.4%	7.0%	69.4%	30.6%	9.8%	20.8%
84 尿管・尿管チューブの入れ替え	1.7%	82.6%	17.4%	1.8%	15.6%	0.3%	96.4%	3.6%	0.2%	3.4%
85 腹腔穿刺(一時的なカテーテル留置を含む)	1.3%	86.9%	13.1%	1.3%	11.8%	0.1%	95.5%	4.5%	0.3%	4.2%
86 腹腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む)	2.9%	50.7%	49.3%	18.2%	31.1%	3.2%	71.7%	28.3%	8.6%	19.8%
87 胸腔穿刺	1.3%	89.9%	10.1%	1.1%	9.0%	0.2%	97.1%	2.9%	0.2%	2.8%
88 胸腔ドレーン抜去	2.1%	59.7%	40.3%	10.4%	29.9%	0.6%	81.4%	18.6%	3.0%	15.6%
89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	15.0%	40.8%	59.2%	20.4%	38.9%	23.0%	56.4%	43.6%	21.0%	22.6%
90 心窩ドレーン抜去	1.3%	64.9%	35.1%	8.5%	26.6%	0.4%	90.8%	9.2%	0.8%	8.4%
91 創部ドレーン抜去	1.2%	48.5%	51.5%	18.4%	33.1%	0.6%	69.6%	30.4%	7.5%	22.8%
92 創部ドレーン短切(カット)	2.4%	46.2%	53.8%	19.4%	34.4%	0.7%	67.7%	32.3%	8.4%	23.9%
93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理	8.0%	51.6%	48.4%	9.8%	38.6%	11.9%	65.3%	34.7%	10.2%	24.5%
94 「一時的ペースメーカー」の抜去	1.1%	61.5%	38.5%	8.3%	30.3%	0.5%	83.8%	16.2%	1.9%	14.3%
95 PCPS等補助循環の管理・操作	3.9%	62.6%	37.4%	3.5%	33.9%	4.2%	78.7%	21.3%	3.7%	17.6%
96 大動脈バルーンパンピングチューブの抜去	1.2%	79.6%	20.4%	1.6%	18.8%	0.4%	93.4%	6.6%	0.7%	6.0%
97 小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	2.5%	68.4%	31.6%	8.0%	23.6%	1.1%	82.0%	18.0%	3.6%	14.4%
98 小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	16.8%	53.4%	46.6%	20.0%	26.6%	19.5%	69.4%	30.6%	18.3%	12.3%
99 小児の膵膵カテ:膵動脈の輸液路確保	2.0%	73.5%	26.5%	3.1%	23.5%	1.0%	91.9%	8.1%	0.3%	7.8%
100 幹細胞移植:採精と濃度調整	4.3%	63.8%	36.2%	8.5%	27.6%	3.0%	85.5%	14.5%	3.0%	11.5%
101 関節穿刺	1.4%	86.4%	13.6%	1.3%	12.3%	0.2%	94.5%	5.5%	0.5%	5.1%
102 導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	34.9%	26.3%	73.7%	47.9%	25.8%	56.4%	17.7%	82.3%	66.4%	15.9%
103 導尿・留置カテーテルの挿入の実施	76.2%	7.2%	92.8%	78.6%	14.2%	87.3%	7.7%	92.3%	85.7%	6.7%

【現在について】

-A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

-B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

-C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

-D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

-E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について	今後について				現在について	今後について			
		A	B	C	D		E	A	B	C
現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能	特定看護師(仮称)	特定看護師(仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能	特定看護師(仮称)	特定看護師(仮称)	
104 飲水の開始・中止の決定	13.9%	37.6%	62.4%	29.1%	33.4%	17.9%	34.6%	65.4%	32.4%	33.0%
105 食事の開始・中止の決定	13.2%	40.2%	59.8%	27.1%	32.7%	16.8%	37.0%	63.0%	30.3%	32.6%
106 治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更	19.2%	29.9%	70.1%	28.0%	42.1%	16.9%	34.0%	66.0%	24.1%	41.9%
107 小児のミルクの種類・量・濃度の決定	18.3%	32.7%	67.3%	26.5%	40.8%	13.0%	43.6%	56.4%	18.2%	38.2%
108 小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定	8.6%	42.2%	57.8%	18.9%	38.8%	4.8%	57.3%	42.7%	9.4%	33.3%
109 腸ろうの管理、チューブの入れ替え	3.9%	54.4%	45.6%	10.5%	35.1%	1.9%	75.4%	24.6%	2.9%	21.7%
110 胃ろう、腸ろうのチューブ抜去	5.8%	38.7%	61.3%	21.1%	40.2%	2.6%	62.2%	37.8%	8.4%	29.4%
111 経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	30.9%	27.5%	72.5%	39.3%	33.2%	40.9%	32.5%	67.5%	45.1%	22.4%
112 胃ろうチューブ・ボタンの交換	6.3%	44.8%	55.2%	16.0%	39.3%	2.8%	69.0%	31.0%	6.0%	25.0%
113 膀胱ろうカテーテルの交換	9.4%	41.3%	58.7%	17.9%	40.9%	4.4%	71.3%	28.7%	6.3%	22.4%
114 安静度・活動や清潔の範囲の決定	25.3%	23.2%	76.8%	41.9%	34.9%	26.6%	25.1%	74.9%	46.3%	28.6%
115 褥瘡の開始と解除の判断	26.1%	27.0%	73.0%	37.3%	35.8%	23.1%	34.5%	65.5%	35.1%	30.3%
116 拘束の開始と解除の判断	46.7%	16.8%	83.2%	54.2%	29.0%	59.9%	17.7%	82.3%	62.7%	19.6%
117 全身麻酔の導入	1.1%	86.0%	14.0%	1.1%	12.9%	1.9%	91.9%	8.1%	1.5%	6.6%
118 術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸液量等の調整)	3.3%	69.8%	30.2%	1.3%	29.0%	2.7%	85.8%	14.2%	1.5%	12.6%
119 麻酔の覚醒	1.3%	79.8%	20.2%	0.5%	19.7%	1.0%	87.8%	12.2%	1.0%	11.2%
120 局所麻酔(腫瘍外・腫瘍)	1.3%	86.7%	13.3%	0.9%	12.3%	0.5%	95.3%	4.7%	0.4%	4.3%
121 麻酔の補足説明:「麻酔による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	14.5%	40.0%	60.0%	15.8%	44.2%	13.5%	63.7%	36.3%	11.9%	24.4%
122 神経ブロック	0.9%	91.6%	8.4%	0.9%	7.5%	0.3%	96.2%	3.8%	0.1%	3.7%
123 腫瘍外チューブの抜去	1.8%	45.2%	54.8%	20.9%	33.8%	1.8%	69.8%	30.2%	7.8%	22.3%
124 皮膚表面の麻酔(注射)	1.0%	63.9%	36.1%	7.3%	28.8%	0.7%	80.3%	19.7%	1.8%	17.8%
125 手術執刀までの準備(体位、消毒)	30.9%	28.0%	72.0%	44.9%	27.1%	28.3%	42.4%	57.6%	33.1%	24.5%
126 手術時の機器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)	15.0%	35.4%	64.6%	23.4%	41.3%	10.9%	62.0%	38.0%	12.5%	25.6%
127 手術時の機器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)	22.2%	23.7%	76.3%	34.2%	42.1%	18.6%	55.4%	44.6%	17.3%	27.3%
128 手術の補足説明:「術者による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	13.5%	36.5%	63.5%	22.5%	41.1%	14.2%	60.5%	39.5%	13.5%	26.0%
129 術前サマリーの作成	23.1%	35.4%	64.6%	29.3%	35.4%	16.3%	70.6%	29.4%	14.9%	14.6%
130 手術サマリーの作成	15.2%	51.3%	48.8%	21.6%	27.2%	10.3%	77.7%	22.3%	9.7%	12.7%
131 血糖値に応じたインスリン投与量の判断	20.2%	33.1%	66.9%	26.3%	40.6%	21.8%	42.2%	57.8%	22.8%	35.0%
132 低血糖時のブドウ糖投与	71.7%	5.1%	94.9%	78.5%	16.4%	81.4%	6.0%	94.0%	82.6%	11.4%
133 脱水の判断と補正(点滴)	5.6%	43.8%	56.2%	15.6%	40.6%	11.1%	44.8%	55.2%	17.2%	38.0%
134 末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	73.0%	6.7%	93.3%	77.3%	15.9%	80.9%	7.6%	92.4%	80.0%	12.4%
135 心筋停止患者への気道確保、マスク換気	48.5%	13.9%	86.1%	59.1%	27.0%	68.3%	14.8%	85.2%	69.1%	16.1%
136 心筋停止患者への電気的除細動実施	21.3%	18.2%	81.8%	44.5%	37.3%	20.0%	32.5%	67.5%	32.6%	35.0%
137 血液透析・CHDFの操作、管理	14.3%	34.8%	65.2%	15.2%	49.9%	19.6%	45.4%	54.6%	16.1%	38.5%
138 救急時の輸液路確保目的の骨髄穿刺(小児)	1.8%	60.4%	39.6%	9.2%	30.4%	1.2%	85.1%	14.9%	3.3%	11.6%
139 予防接種の実施判断	4.1%	42.5%	57.5%	15.8%	41.6%	4.6%	65.7%	34.3%	8.7%	25.6%
140 予防接種の実施	46.2%	11.9%	88.1%	63.6%	24.5%	52.3%	27.3%	72.7%	56.8%	15.9%
141 特定健診などの健康診査の実施	16.0%	35.6%	64.4%	26.8%	37.6%	15.5%	54.2%	45.8%	17.9%	27.9%
142 子宮頸がん検診:細胞診のオーダー(一次スクリーニング)、検体採取	2.4%	35.9%	64.1%	17.9%	46.2%	1.0%	68.4%	31.6%	4.6%	27.0%
143 前立腺がん検診:触診・PSAオーダー(一次スクリーニング)	2.9%	46.7%	53.3%	16.7%	36.6%	0.8%	71.7%	28.3%	3.3%	25.0%
144 大腸がん検診:便潜血オーダー(一次スクリーニング)	8.0%	27.9%	72.1%	31.1%	41.0%	5.8%	54.5%	45.5%	17.3%	28.2%
145 乳がん検診:視診・触診(一次スクリーニング)	2.5%	48.9%	51.1%	11.3%	39.7%	0.4%	65.7%	34.3%	3.7%	30.6%
146 高脂血症用剤の選択・使用	6.2%	68.1%	31.9%	11.1%	20.8%	30.1%	54.9%	45.1%	31.9%	13.1%
147 降圧剤の選択・使用	12.4%	65.9%	34.1%	14.3%	19.8%	38.3%	51.5%	48.5%	35.9%	12.6%
148 糖尿病治療薬の選択・使用	9.5%	69.6%	30.4%	10.7%	19.7%	35.6%	52.7%	47.3%	33.4%	13.9%
149 排尿障害治療薬の選択・使用	6.2%	69.3%	30.7%	10.4%	20.3%	30.8%	56.9%	43.1%	31.0%	12.1%
150 子宮収縮抑制剤の選択・使用	6.2%	72.9%	27.1%	7.3%	19.7%	25.9%	63.2%	36.8%	24.2%	12.6%
151 K、Cl、Naの選択・使用	8.2%	68.6%	31.4%	10.5%	20.9%	32.3%	58.8%	41.2%	29.4%	11.8%
152 カテコラミンの選択・使用	13.2%	67.7%	32.3%	13.6%	18.8%	33.4%	59.1%	40.9%	30.2%	10.6%
153 利尿剤の選択・使用	14.8%	62.8%	37.2%	16.2%	21.0%	37.7%	53.1%	46.9%	35.9%	11.1%
154 基本的な輸液:高カロリー輸液	9.8%	57.5%	42.5%	13.0%	29.5%	35.0%	47.4%	52.6%	34.0%	18.6%
155 指示された期間内に薬がなくなった場合の継続薬剤(全般)の継続使用	22.8%	30.5%	69.5%	40.4%	29.0%	31.5%	39.9%	60.1%	37.3%	22.8%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者も、【今後について】の回答はしていない

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑦「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑧「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について		今後について			現在について		今後について		
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師が実施可能 看護師一般	特定看護師 医師	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師が実施可能 看護師一般	特定看護師 医師	
156 下剤(坐薬も含む)の選択・使用	49.3%	19.9%	80.1%	60.2%	19.9%	65.8%	16.3%	83.7%	69.6%	14.1%
157 胃薬:制酸剤の選択・使用	22.6%	35.5%	64.5%	42.3%	22.1%	48.3%	27.1%	72.9%	56.9%	16.0%
158 胃薬:胃粘膜保護剤の選択・使用	23.8%	31.6%	68.4%	45.7%	22.7%	48.2%	27.3%	72.7%	56.9%	15.8%
159 整腸剤の選択・使用	27.0%	27.4%	72.6%	49.5%	23.0%	51.7%	22.7%	77.3%	61.3%	16.0%
160 制吐剤の選択・使用	37.1%	27.8%	72.2%	50.1%	22.1%	57.3%	22.9%	77.1%	61.3%	15.8%
161 止痛剤の選択・使用	31.2%	31.4%	68.6%	46.4%	22.3%	54.7%	23.4%	76.6%	60.8%	15.9%
162 鎮痛剤の選択・使用	41.6%	29.7%	70.3%	48.8%	21.5%	60.6%	23.2%	76.8%	60.2%	16.6%
163 解熱剤の選択・使用	43.9%	27.2%	72.8%	51.0%	21.8%	61.4%	22.7%	77.3%	62.1%	15.2%
164 去痰剤(小児)の選択・使用	19.4%	42.5%	57.5%	33.0%	24.6%	42.1%	42.4%	57.6%	41.9%	15.7%
165 抗けいれん薬(小児)の選択・使用	18.5%	56.3%	43.7%	24.6%	19.1%	40.7%	48.8%	51.2%	37.1%	14.2%
166 インフルエンザ薬の選択・使用	11.1%	52.2%	47.8%	21.9%	25.9%	33.8%	48.1%	51.9%	36.3%	15.6%
167 外用薬の選択・使用	42.7%	23.0%	77.0%	55.3%	21.7%	60.9%	19.0%	81.0%	64.0%	17.0%
168 創傷被覆材(ドレッシング材)の選択・使用	50.3%	18.5%	81.5%	54.1%	27.4%	72.8%	10.8%	89.2%	64.4%	24.8%
169 睡眠剤の選択・使用	39.0%	35.7%	64.3%	44.1%	20.2%	57.1%	30.9%	69.1%	54.5%	14.6%
170 抗精神病薬の選択・使用	18.4%	61.0%	39.0%	21.2%	17.9%	43.0%	48.4%	51.6%	39.1%	12.5%
171 抗不安薬の選択・使用	23.7%	53.7%	46.3%	27.0%	19.3%	44.7%	46.1%	53.9%	40.3%	13.5%
172 ネブライザーの開始、使用薬液の選択	29.6%	28.5%	71.5%	43.3%	28.2%	37.1%	29.4%	70.6%	45.0%	25.6%
173 感染徴候時の薬物(抗生剤等)の選択(全身投与、局所投与等)	5.6%	71.9%	28.1%	8.0%	20.1%	13.9%	69.9%	30.1%	12.8%	17.3%
174 抗菌剤開始時期の決定、変更時期の決定	2.6%	74.9%	25.1%	4.5%	20.6%	7.8%	73.3%	26.7%	7.9%	18.7%
175 基本的な輸液:糖質輸液、電解質輸液	10.3%	47.4%	52.6%	17.6%	35.0%	29.4%	44.2%	55.8%	29.0%	26.8%
176 血中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用	3.9%	76.5%	23.5%	4.0%	19.5%	22.4%	68.6%	31.4%	15.7%	15.8%
177 化学療法副作用出現時の症状緩和の薬剤選択、処置	10.0%	53.0%	47.0%	9.6%	37.4%	29.1%	45.7%	54.3%	19.5%	34.8%
178 抗癌剤等の皮下漏出時のステロイド薬の選択、局所注射の実施	3.9%	54.0%	46.0%	7.5%	38.5%	9.6%	60.8%	39.2%	7.9%	31.3%
179 放射線治療による副作用出現時の外用薬の選択	5.1%	46.5%	53.5%	11.6%	42.0%	12.7%	48.9%	51.1%	12.8%	38.3%
180 副作用症状の確認による薬剤の中止、減量、変更の決定	3.6%	67.7%	32.3%	6.7%	25.6%	8.0%	66.9%	33.1%	7.9%	25.3%
181 家族計画(避妊)における低用量ピル	1.3%	52.1%	47.9%	6.0%	41.9%	5.8%	57.2%	42.8%	5.7%	37.2%
182 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与(投与量の調整)	12.2%	46.4%	53.6%	17.7%	36.0%	22.4%	57.3%	42.7%	18.9%	23.9%
183 自己血糖測定開始の決定	10.3%	39.8%	60.2%	19.4%	40.9%	28.6%	28.1%	71.9%	36.4%	35.5%
184 痛みの強さや副作用症状に応じたオピオイドの投与量・用法調整、想定されたオピオイドローテーションの実施時期決定:WHO方式がん疼痛治療法等	5.3%	46.3%	53.7%	7.6%	46.2%	9.6%	41.4%	58.6%	8.0%	50.6%
185 痛みの強さや副作用症状に応じた非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量・用法調整:WHO方式がん疼痛治療法等	6.2%	43.0%	57.0%	8.7%	48.2%	11.2%	39.4%	60.6%	9.1%	51.4%
186 がんの転移、浸潤に伴う苦痛症状のための薬剤の選択と評価	5.4%	49.3%	50.7%	6.9%	43.8%	8.5%	42.1%	57.9%	6.8%	51.1%
187 訪問看護の必要性の判断、依頼	35.9%	12.4%	87.6%	47.7%	39.8%	63.7%	7.4%	92.6%	66.5%	26.0%
188 日々の病状、経過の補足説明(時間をかけた説明)	44.2%	18.4%	81.6%	49.5%	32.1%	57.6%	19.5%	80.5%	55.4%	25.1%
189 リハビリテーション(嚥下、呼吸、運動機能アップ等)の必要性の判断、依頼	17.3%	21.7%	78.3%	35.1%	43.2%	31.2%	17.3%	82.7%	43.6%	39.0%
190 整形外科領域の補助具の決定、注文	5.6%	41.2%	58.8%	15.3%	43.5%	6.2%	50.6%	49.4%	12.6%	36.8%
191 理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼	9.7%	23.2%	76.8%	33.8%	43.1%	14.1%	29.2%	70.8%	34.6%	36.2%
192 他科への診療依頼	4.9%	61.5%	38.5%	16.4%	22.0%	11.0%	60.7%	39.3%	17.8%	21.5%
193 他科・他院への診療情報提供書作成(紹介および返信)	2.4%	65.6%	34.4%	11.4%	23.1%	3.7%	77.5%	22.5%	6.3%	16.2%
194 在宅で終末期ケアを実施してきた患者の死亡確認	1.8%	55.2%	44.8%	13.6%	31.2%	2.6%	74.8%	25.2%	5.6%	19.6%
195 退院サマリー(病院全体)の作成	8.9%	54.5%	45.5%	19.1%	26.4%	28.8%	57.2%	42.8%	27.2%	15.6%
196 患者・家族・医療従事者教育	48.9%	13.7%	86.3%	48.4%	37.9%	77.3%	9.4%	90.6%	55.6%	34.9%
197 栄養士への食事指導依頼(既存の指示内容で)	26.8%	12.9%	87.1%	51.5%	35.6%	36.9%	15.0%	85.0%	55.3%	29.7%
198 他の介護サービスの実施可・不可の判断(リハビリ、血圧・体温など)	20.9%	20.9%	79.1%	44.9%	34.2%	41.8%	15.6%	84.4%	50.3%	34.0%
199 家族療法・カウンセリングの依頼	25.2%	16.3%	83.7%	42.5%	41.2%	32.4%	19.4%	80.6%	43.1%	37.5%
200 認知・行動療法の依頼	4.9%	29.1%	70.9%	28.8%	42.2%	13.2%	34.3%	65.7%	26.3%	39.4%
201 認知・行動療法の実施・評価	7.8%	35.7%	64.3%	21.4%	42.9%	9.7%	40.5%	59.5%	15.7%	43.8%
202 支持的精神療法の実施の決定	16.7%	30.4%	69.6%	28.4%	41.2%	14.5%	41.1%	58.9%	19.8%	39.1%
203 患者の入院と退院の判断	3.3%	77.9%	22.1%	6.8%	15.4%	4.4%	70.6%	29.4%	8.2%	21.1%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

施設区分別回答状況: 3. 診療所(有床診療所) (n=108)

* 診療所は慢性期質問票であるため、(一)印のある項目には回答なし
 * 値にグレーがかかっているものは、回答数が10未満の回答。

医療処置項目	医師回答										看護師回答				
	現在について		今後について					現在について		今後について					
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E					
	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師一般	特定看護師(仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師一般	特定看護師(仮称)					
1 動脈ラインからの採血	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2 直接動脈穿刺による採血	6.1%	51.5%	48.5%	27.3%	21.2%	12.1%	39.4%	60.6%	27.3%	33.3%					
3 動脈ラインの抜去・圧迫止血	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4 トリアージのための検体検査の実施の決定	14.3%	60.7%	39.3%	21.4%	17.9%	4.5%	45.5%	54.5%	31.8%	22.7%					
5 トリアージのための検体検査結果の評価	7.7%	76.9%	23.1%	7.7%	15.4%	0.0%	54.5%	45.5%	13.6%	31.8%					
6 治療効果判定のための検体検査の実施の決定	5.3%	73.7%	26.3%	13.2%	13.2%	9.3%	62.8%	37.2%	16.3%	20.9%					
7 治療効果判定のための検体検査結果の評価	5.3%	89.5%	10.5%	5.3%	5.3%	2.4%	83.3%	16.7%	4.8%	11.9%					
8 手術前検査の実施の決定	3.7%	66.7%	33.3%	18.5%	14.8%	3.3%	66.7%	33.3%	10.0%	23.3%					
9 単純X線撮影の実施の決定	9.1%	65.9%	34.1%	22.7%	11.4%	8.5%	51.1%	48.9%	17.0%	31.9%					
10 単純X線撮影の画像評価	0.0%	92.9%	7.1%	4.8%	2.4%	2.1%	80.9%	19.1%	2.1%	17.0%					
11 CT、MRI検査の実施の決定	2.9%	82.4%	17.6%	5.9%	11.8%	0.0%	58.3%	41.7%	8.3%	33.3%					
12 CT、MRI検査の画像評価	0.0%	97.1%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	88.9%	11.1%	2.8%	8.3%					
13 造影剤使用検査時の造影剤の投与	41.9%	35.5%	64.5%	58.1%	6.5%	72.7%	15.2%	84.8%	78.8%	6.1%					
14 IFR時の動脈穿刺、カテーテル挿入・抜去の一部実施	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施の決定	4.3%	52.2%	47.8%	34.8%	13.0%	5.3%	42.1%	57.9%	26.3%	31.6%					
16 経腹部的膀胱超音波検査(残尿測定目的)の実施	8.7%	56.5%	43.5%	30.4%	13.0%	0.0%	31.6%	68.4%	15.8%	52.6%					
17 腹部超音波検査の実施の決定	0.0%	81.6%	18.4%	13.2%	5.3%	9.8%	61.0%	39.0%	14.6%	24.4%					
18 腹部超音波検査の実施	0.0%	78.9%	21.1%	7.9%	13.2%	4.7%	69.8%	30.2%	11.6%	18.6%					
19 腹部超音波検査の結果の評価	0.0%	89.5%	10.5%	2.6%	7.9%	0.0%	90.2%	9.8%	0.0%	9.8%					
20 心臓超音波検査の実施の決定	0.0%	76.2%	23.8%	14.3%	9.5%	3.8%	76.9%	23.1%	3.8%	19.2%					
21 心臓超音波検査の実施	0.0%	73.7%	26.3%	5.3%	21.1%	7.4%	81.5%	18.5%	3.7%	14.8%					
22 心臓超音波検査の結果の評価	0.0%	84.2%	15.8%	5.3%	10.5%	0.0%	96.2%	3.8%	0.0%	3.8%					
23 頸動脈超音波検査の実施の決定	0.0%	65.2%	34.8%	8.7%	26.1%	3.8%	84.6%	15.4%	3.8%	11.5%					
24 表在超音波検査の実施の決定	0.0%	74.2%	25.8%	6.5%	19.4%	8.3%	79.2%	20.8%	8.3%	12.5%					
25 下肢血管超音波検査の実施の決定	0.0%	77.8%	22.2%	11.1%	11.1%	0.0%	80.0%	20.0%	6.7%	13.3%					
26 術後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定	0.0%	55.6%	44.4%	22.2%	22.2%	0.0%	60.0%	40.0%	10.0%	30.0%					
27 12誘導心電図検査の実施の決定	9.3%	46.5%	53.5%	39.5%	14.0%	14.6%	39.6%	60.4%	37.5%	22.9%					
28 12誘導心電図検査の実施	83.3%	10.4%	89.6%	87.5%	2.1%	87.0%	5.6%	94.4%	90.7%	3.7%					
29 12誘導心電図検査の結果の評価	0.0%	78.0%	22.0%	7.3%	14.6%	2.1%	72.3%	27.7%	2.1%	25.5%					
30 感染症検査(インフルエンザ/ノロウイルス等)の実施の決定	9.3%	48.8%	51.2%	39.5%	11.6%	4.3%	48.9%	51.1%	27.7%	23.4%					
31 感染症検査(インフルエンザ/ノロウイルス等)の実施	37.0%	21.7%	78.3%	73.9%	4.3%	59.6%	25.0%	75.0%	65.4%	9.6%					
32 感染症検査(インフルエンザ/ノロウイルス等)の結果の評価	7.3%	63.4%	36.6%	24.4%	12.2%	10.4%	64.6%	35.4%	20.8%	14.6%					
33 薬剤感受性検査実施の決定	5.1%	69.2%	30.8%	17.9%	12.8%	2.3%	68.2%	31.8%	20.5%	11.4%					
34 真菌検査の実施の決定	5.1%	69.2%	30.8%	15.4%	15.4%	2.3%	62.8%	37.2%	20.9%	16.3%					
35 真菌検査の結果の評価	2.6%	76.3%	23.7%	13.2%	10.5%	2.3%	86.0%	14.0%	4.7%	9.3%					
36 微生物学検査実施の決定	5.0%	65.0%	35.0%	20.0%	15.0%	2.4%	71.4%	28.6%	16.7%	11.9%					
37 微生物学検査の実施:スワブ法	32.5%	27.5%	72.5%	62.5%	10.0%	39.5%	39.5%	60.5%	57.9%	2.6%					
38 薬物血中濃度検査(TDM)実施の決定	5.7%	68.6%	31.4%	20.0%	11.4%	2.6%	71.8%	28.2%	15.4%	12.8%					
39 スパイロメトリーの実施の決定	3.6%	64.3%	35.7%	21.4%	14.3%	7.4%	59.3%	40.7%	11.1%	29.6%					
40 直腸内圧測定・肛門内圧測定実施の決定	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	50.0%	25.0%	25.0%					
41 直腸内圧測定・肛門内圧測定の実施	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	66.7%	33.3%	33.3%					
42 膀胱内圧測定実施の決定	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%	42.9%					
43 膀胱内圧測定の実施	0.0%	75.0%	25.0%	25.0%	0.0%	16.7%	50.0%	50.0%	33.3%	16.7%					
44 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施の決定	5.6%	72.2%	27.8%	27.8%	0.0%	5.6%	72.2%	27.8%	5.6%	22.2%					
45 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の実施	70.6%	23.5%	76.5%	76.5%	0.0%	68.4%	26.3%	73.7%	63.2%	10.5%					
46 血流評価検査(ABI/PWV/SPP)検査の結果の評価	0.0%	88.2%	11.8%	11.8%	0.0%	0.0%	72.2%	27.8%	11.1%	16.7%					
47 骨密度検査の実施の決定	3.1%	71.9%	28.1%	21.9%	6.3%	5.9%	64.7%	35.3%	17.6%	17.6%					
48 骨密度検査の結果の評価	0.0%	84.4%	15.6%	9.4%	6.3%	0.0%	73.5%	26.5%	8.8%	17.6%					
49 嚥下造影の実施の決定	5.9%	76.5%	23.5%	11.8%	11.8%	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	20.0%					
50 嚥下内視鏡検査の実施の決定	7.1%	78.6%	21.4%	0.0%	21.4%	0.0%	81.8%	18.2%	0.0%	18.2%					
51 嚥下内視鏡検査の実施	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	90.0%	10.0%	0.0%	10.0%					
52 眼底検査の実施の決定	0.0%	66.7%	33.3%	20.0%	13.3%	0.0%	61.9%	38.1%	14.3%	23.8%					
53 眼底検査の実施	23.1%	46.2%	53.8%	38.5%	15.4%	55.6%	27.8%	72.2%	44.4%	27.8%					
54 眼底検査の結果の評価	0.0%	93.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	88.2%	11.8%	0.0%	11.8%					
55 ACT(活性化凝固時間)の測定実施の決定	13.6%	50.0%	50.0%	31.8%	18.2%	4.8%	66.7%	33.3%	14.3%	19.0%					

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答を除く。のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】

((現在について)で、①「この医療行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

(医師51、看護師56)

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について	今後について				現在について	今後について			
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能 計	看護師一般	特定看護師 (仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	看護師が実施可能 計	看護師一般	特定看護師 (仮称)
56 酸素投与の開始、中止、投与量の調整の判断	25.6%	55.8%	44.2%	27.9%	16.3%	39.6%	35.8%	64.2%	35.8%	28.3%
57 気管カニューレの選択・交換	21.2%	54.5%	45.5%	24.2%	21.2%	24.2%	36.4%	63.6%	30.3%	33.3%
58 経皮的気管穿刺針(トラヘルバー等)の挿入	5.9%	76.5%	23.5%	11.8%	11.8%	0.0%	81.8%	18.2%	9.1%	9.1%
59 挿管チューブの位置調節(深さの調整)	13.3%	63.3%	36.7%	10.0%	26.7%	6.9%	51.7%	48.3%	17.2%	31.0%
60 経口・経鼻挿管の実施	19.4%	64.5%	35.5%	19.4%	16.1%	14.7%	52.9%	47.1%	17.6%	29.4%
61 経口・経鼻挿管チューブの抜管	29.0%	54.8%	45.2%	32.3%	12.9%	26.5%	32.4%	67.6%	38.2%	29.4%
62 人工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施	5.6%	83.3%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%	66.7%	33.3%	8.3%	25.0%
63 人工呼吸器管理下の鎮静管理	14.3%	78.6%	21.4%	14.3%	7.1%	8.3%	50.0%	50.0%	8.3%	41.7%
64 人工呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施	7.7%	84.6%	15.4%	0.0%	15.4%	11.1%	44.4%	55.6%	11.1%	44.4%
65 小児の人工呼吸器の選択:HFO対応が否か	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
66 NPPV開始、中止、モード設定	11.1%	77.8%	22.2%	0.0%	22.2%	0.0%	44.4%	55.6%	0.0%	55.6%
67 洗滌の実施の決定	38.6%	31.8%	68.2%	59.1%	9.1%	37.3%	25.5%	74.5%	62.7%	11.8%
68 創部洗浄・消毒	70.0%	18.0%	82.0%	78.0%	4.0%	83.6%	7.3%	92.7%	90.9%	1.8%
69 褥瘡の壊死組織のデブリードマン	12.5%	62.5%	37.5%	17.5%	20.0%	20.5%	47.7%	52.3%	25.0%	27.3%
70 電気凝固メスによる止血(褥瘡部)	4.8%	90.5%	9.5%	0.0%	9.5%	0.0%	72.2%	27.8%	5.6%	22.2%
71 巻爪処置(ニッパー、ワイヤーを用いた処置)	29.0%	41.9%	58.1%	41.9%	16.1%	35.9%	43.6%	56.4%	43.6%	12.8%
72 肝臓・鶏眼処置(ノンカッター等を用いた処置)	37.1%	28.6%	71.4%	48.6%	22.9%	38.9%	33.3%	66.7%	52.8%	13.9%
73 皮下腫瘍の切開・排膿:皮下組織まで	2.4%	75.6%	24.4%	2.4%	22.0%	2.4%	63.4%	36.6%	7.3%	29.3%
74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施	23.1%	69.2%	30.8%	7.7%	23.1%	11.1%	38.9%	61.1%	38.9%	22.2%
75 表創(非感染創)の縫合:皮下組織まで(手術室外で)	2.7%	81.1%	18.9%	5.4%	13.5%	2.8%	75.0%	25.0%	8.3%	16.7%
76 非感染創の縫合:皮下組織から筋層まで(手術室外で)	3.0%	90.9%	9.1%	3.0%	6.1%	3.1%	81.3%	18.8%	6.3%	12.5%
77 医療用ホットキスの使用(手術室外で)	11.1%	66.7%	33.3%	22.2%	11.1%	0.0%	63.2%	36.8%	5.3%	31.6%
78 体表面創の抜糸・抜鉤	7.5%	40.0%	60.0%	42.5%	17.5%	9.8%	31.7%	68.3%	34.1%	34.1%
79 動脈ライン確保	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80 末梢静脈挿入式静脈カテーテル(PICC)挿入	13.3%	93.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
81 中心静脈カテーテル挿入	3.4%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	93.1%	6.9%	0.0%	6.9%
82 中心静脈カテーテル抜去	13.3%	40.0%	60.0%	46.7%	13.3%	19.4%	64.5%	35.5%	22.6%	12.9%
83 尿管・尿管チューブの管理:洗浄	40.0%	60.0%	40.0%	30.0%	10.0%	36.4%	27.3%	72.7%	45.5%	27.3%
84 尿管・尿管チューブの入れ替え	14.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	85.7%	14.3%	14.3%	0.0%
85 腹腔穿刺(一時的なカテーテル留置を含む)	7.7%	88.5%	11.5%	3.8%	7.7%	0.0%	95.5%	4.5%	0.0%	4.5%
86 腹腔ドレーン抜去(腹腔穿刺後の抜針含む)	8.3%	62.5%	37.5%	20.8%	16.7%	15.8%	68.4%	31.6%	26.3%	5.3%
87 胸腔穿刺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88 胸腔ドレーン抜去	15.0%	65.0%	35.0%	10.0%	25.0%	20.0%	60.0%	40.0%	33.3%	6.7%
89 胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更	17.6%	58.8%	41.2%	11.8%	29.4%	0.0%	88.9%	11.1%	0.0%	11.1%
90 心臓ドレーン抜去	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
91 創部ドレーン抜去	7.7%	50.0%	50.0%	30.8%	19.2%	4.5%	59.1%	40.9%	22.7%	18.2%
92 創部ドレーン短切(カット)	8.0%	48.0%	52.0%	32.0%	20.0%	0.0%	66.7%	33.3%	19.0%	14.3%
93 「一時的ペースメーカー」の操作・管理	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94 「一時的ペースメーカー」の抜去	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95 PCPS等補助循環の管理・操作	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96 大動脈バルーンパンピングチューブの抜去	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97 小児のCT・MRI検査時の鎮静実施の決定	25.0%	75.0%	25.0%	25.0%	0.0%	16.7%	83.3%	16.7%	16.7%	0.0%
98 小児のCT・MRI検査時の鎮静の実施	25.0%	75.0%	25.0%	25.0%	0.0%	16.7%	83.3%	16.7%	16.7%	0.0%
99 小児の臍カテ:臍動脈の輸液路確保	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 幹細胞移植:接続と滴数調整	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
101 関節穿刺	0.0%	94.1%	5.9%	0.0%	5.9%	3.1%	96.9%	3.1%	3.1%	0.0%
102 導尿・留置カテーテルの挿入及び抜去の決定	22.2%	44.4%	55.6%	42.2%	13.3%	38.0%	38.0%	62.0%	50.0%	12.0%
103 導尿・留置カテーテルの挿入の実施	80.4%	5.9%	94.1%	88.2%	5.9%	85.5%	9.1%	90.9%	90.9%	0.0%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この処置は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この処置は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、③「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

(医師51、看護師56)

医療処置項目	医師回答					看護師回答				
	現在について		今後について			現在について		今後について		
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師一般	特定看護師(仮称)	現在看護師が実施している	医師が実施すべき	計	看護師一般	特定看護師(仮称)
104 飲水の開始・中止の決定	9.8%	51.2%	48.8%	29.3%	19.5%	20.4%	38.8%	61.2%	32.7%	28.6%
105 食事の開始・中止の決定	7.3%	58.5%	41.5%	22.0%	19.5%	18.4%	44.9%	55.1%	30.6%	24.5%
106 治療食(経腸栄養含む)内容の決定・変更	15.0%	57.5%	42.5%	20.0%	22.5%	10.6%	55.3%	44.7%	14.9%	29.8%
107 小児のミルクの種類・量・濃度の決定	20.0%	80.0%	20.0%	20.0%	0.0%	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
108 小児の経口電解質液の開始と濃度、量の決定	20.0%	80.0%	20.0%	0.0%	20.0%	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
109 腸ろうの管理、チューブの入れ替え	0.0%	81.0%	19.0%	0.0%	19.0%	31.3%	50.0%	50.0%	31.3%	18.8%
110 腸ろう、腸ろうのチューブ除去	14.8%	51.9%	48.1%	29.6%	18.5%	27.3%	30.3%	69.7%	45.5%	24.2%
111 経管栄養用の胃管の挿入、入れ替え	23.5%	52.9%	47.1%	26.5%	20.6%	47.6%	35.7%	64.3%	47.6%	16.7%
112 腸ろうチューブ・ボタンの交換	3.6%	67.9%	32.1%	21.4%	10.7%	7.7%	61.5%	38.5%	23.1%	15.4%
113 膀胱ろうカテーテルの交換	27.8%	50.0%	50.0%	33.3%	16.7%	26.3%	36.8%	63.2%	36.8%	26.3%
114 安静度・活動や清潔の範囲の決定	32.5%	40.0%	60.0%	45.0%	15.0%	31.4%	37.3%	62.7%	43.1%	19.6%
115 褥瘡の開始と解除の判断	10.5%	52.6%	47.4%	26.3%	21.1%	15.6%	46.7%	53.3%	24.4%	28.9%
116 拘束の開始と解除の判断	33.3%	39.4%	60.6%	39.4%	21.2%	62.5%	25.0%	75.0%	60.0%	15.0%
117 全身麻酔の導入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118 術中の麻酔・呼吸・循環管理(麻酔深度の調節、薬剤・酸素投与濃度、輸液量等の調節)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119 麻酔の覚醒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120 局所麻酔(硬膜外・腰椎)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121 麻酔の補足説明:「麻酔による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122 神経ブロック	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
123 頸動脈外チューブの除去	7.1%	57.1%	42.9%	14.3%	28.6%	7.1%	64.3%	35.7%	14.3%	21.4%
124 皮膚表面の麻酔(注射)	2.6%	78.9%	21.1%	10.5%	10.5%	3.2%	74.2%	25.8%	12.9%	12.9%
125 手術執刀までの準備(体位、消毒)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(手術の第一・第二助手)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127 手術時の臓器や手術器械の把持及び保持(気管切開等の小手術助手)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128 手術の補足説明:「術者による患者とのリスク共有も含む説明」を補足する時間をかけた説明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129 術前サマリーの作成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130 手術サマリーの作成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131 血糖値に応じたインスリン投与量の判断	12.8%	51.3%	48.7%	28.2%	20.5%	16.3%	61.2%	38.8%	22.4%	16.3%
132 低血糖時のブドウ糖投与	60.4%	20.8%	79.2%	64.6%	14.6%	63.6%	18.2%	81.8%	76.4%	5.5%
133 脱水の判断と補正(点滴)	5.0%	57.5%	42.5%	17.5%	25.0%	10.4%	50.0%	50.0%	29.2%	20.8%
134 末梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の投与	80.0%	8.0%	92.0%	86.0%	6.0%	85.7%	10.7%	89.3%	85.7%	3.6%
135 心肺停止患者への気道確保、マスク換気	38.1%	33.3%	66.7%	50.0%	16.7%	51.0%	26.5%	73.5%	57.1%	16.3%
136 心肺停止患者への電気的除細動実施	15.6%	46.9%	53.1%	31.3%	21.9%	20.0%	43.3%	56.7%	46.7%	10.0%
137 血液透析・CHDFの操作、管理	36.4%	27.3%	72.7%	36.4%	36.4%	55.6%	33.3%	66.7%	55.6%	11.1%
138 救急時の輸液確保目的の骨髄穿刺(小児)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139 予防接種の実施判断	7.3%	70.7%	29.3%	17.1%	12.2%	4.3%	74.5%	25.5%	10.6%	14.9%
140 予防接種の実施	40.4%	23.4%	76.6%	70.2%	6.4%	48.1%	25.0%	75.0%	69.2%	5.8%
141 特定健診などの健康診査の実施	40.5%	40.5%	59.5%	52.4%	7.1%	56.0%	34.0%	66.0%	62.0%	4.0%
142 子宮頸がん検診:細胞診のオーダー(一次スクリーニング)、検体採取	20.0%	40.0%	60.0%	60.0%	0.0%	16.7%	66.7%	33.3%	16.7%	16.7%
143 前立腺がん検診:触診・PSAオーダー(一次スクリーニング)	0.0%	87.5%	12.5%	4.2%	8.3%	3.2%	87.1%	12.9%	6.5%	6.5%
144 大腸がん検診:便潜血オーダー(一次スクリーニング)	16.2%	43.2%	56.8%	48.6%	8.1%	10.8%	54.1%	45.9%	29.7%	16.2%
145 乳がん検診:視診・触診(一次スクリーニング)	0.0%	80.0%	20.0%	10.0%	10.0%	0.0%	75.0%	25.0%	5.0%	20.0%
146 高脂血症用剤の選択・使用	2.4%	92.7%	7.3%	4.9%	2.4%	18.4%	71.4%	28.6%	18.4%	10.2%
147 降圧剤の選択・使用	4.9%	90.2%	9.8%	7.3%	2.4%	21.6%	70.6%	29.4%	21.6%	7.8%
148 糖尿病治療薬の選択・使用	2.4%	92.7%	7.3%	4.9%	2.4%	20.4%	75.5%	24.5%	16.3%	8.2%
149 排尿障害治療薬の選択・使用	2.6%	94.9%	5.1%	5.1%	0.0%	20.4%	73.5%	26.5%	18.4%	8.2%
150 子宮収縮抑制剤の選択・使用	0.0%	88.9%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	84.6%	15.4%	0.0%	15.4%
151 K、Cl、Naの選択・使用	5.0%	85.0%	15.0%	10.0%	5.0%	20.0%	76.0%	24.0%	18.0%	6.0%
152 カテコラミンの選択・使用	5.9%	85.3%	14.7%	8.8%	5.9%	11.9%	81.0%	19.0%	11.9%	7.1%
153 利尿剤の選択・使用	4.9%	82.9%	17.1%	9.8%	7.3%	18.4%	75.5%	24.5%	16.3%	8.2%
154 基本的な輸液:高カロリー輸液	10.8%	75.7%	24.3%	18.9%	5.4%	18.8%	60.4%	39.6%	20.8%	18.8%
155 指示された期間内に薬がなくなった場合の経緯薬剤(全般)の継続使用	27.5%	50.0%	50.0%	37.5%	12.5%	27.1%	45.8%	54.2%	29.2%	25.0%

【現在について】

・A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 ((現在について)で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

・B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

・C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

・D(看護師一般):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

・E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合

(医師51、看護師56)

Table with 12 columns: 医療処置項目, 医師回答 (現在について, 今後について), 看護師回答 (現在について, 今後について). Rows include various medical treatments like 下剤, 胃薬, 鎮痛剤, etc.

【現在について】

-A(現在看護師が実施している):すべての回答(①「この医行為は実施されていない」を選択した回答を除く。)のうち、②「看護師が実施している」を選択した回答の割合

【今後について】 (【現在について】で、①「この医行為は実施されていない」を選択した回答者は、【今後について】の回答はしていない)

-B(医師が実施すべき):すべての回答のうち、④「医師が実施すべき」を選択した回答の割合

-C(看護師が実施可能):すべての回答のうち、⑤「看護師の実施が可能:一般看護師」⑥「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」のどちらかを選択した回答の割合

-D(看護師一般):すべての回答のうち、⑦「看護師の実施が可能:一般看護師」を選択した回答の割合

-E(特定看護師(仮称)):すべての回答のうち、⑧「看護師の実施が可能:特定看護師(仮称)」を選択した回答の割合