



毒キノコによる食中毒発生状況

1. 月別発生状況



	総数			1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
2010	91	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
2009	40	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
2008	64	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	60	199	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	
2006	44	144	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	
2005	44	134	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
2010	1	4	-	-	-	-	9	31	-	74	212	-	5	11	-	-	-	-
2009	2	3	-	2	5	-	20	69	-	14	43	-	1	3	-	-	-	-
2008	1	5	-	4	11	-	19	51	-	40	122	-	-	-	-	-	-	-
2007	4	15	1	1	5	-	8	26	1	36	128	-	8	22	-	-	-	-
2006	1	2	-	1	1	1	6	12	1	35	124	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	2	4	2	7	23	-	32	100	1	3	7	-	-	-	-

2. 自治体別発生状況

都道府県	事件数	患者数	死者数	販売事例* (患者数)
福島県	16	40	0	1(2)
山形県	8	31	0	1(6)
新潟県	7	16	0	
岩手県	5	16	0	
茨城県	5	11	0	1(0)
長野県	4	10	0	1(0)
石川県	3	11	0	
山梨県	3	6	0	
滋賀県	2	8	0	
青森市	2	7	0	
青森県	2	6	0	
栃木県	2	5	0	
金沢市	2	5	0	
秋田県	2	4	0	
兵庫県	2	4	0	
いわき市	2	4	0	
宇都宮市	2	4	0	
京都府	1	11	0	
広島県	1	9	0	
千葉県	1	7	0	1(7)
郡山市	1	6	0	
岡山県	1	5	0	
富山県	1	4	0	
川崎市	1	4	0	
名古屋市	1	4	0	
神奈川県	1	3	0	
島根県	1	3	0	
新潟市	1	3	0	
群馬県	1	2	0	
香川県	1	2	0	
福岡県	1	2	0	
鹿児島県	1	2	0	
姫路市	1	2	0	
北海道	1	1	0	
埼玉県	1	1	0	
福井県	1	1	0	
秋田市	1	1	0	
長野市	1	1	0	1(0)
広島市	1	1	0	
墨田区	0	0	0	1(0)
合計	91	263	0	7(15)

3. キノコの種類別発生状況

キノコの種類 (推定を含む)	事件数	患者数	死者数
クサウラベニタケ	32	98	0
ツキヨタケ	27	91	0
ニガクリタケ	3	3	0
カキシメジ	3	4	0
その他	15	34	0
種類不明	11	33	0
合計	91	263	0

4. 毒キノコによる食中毒発生防止対策

厚生労働省: 毒キノコによる食中毒に注意しましょう

1/1 ページ



ご覧の施策内容について多くの皆さまのご意見をお待ちしております。

[意見を送信する](#)

毒 毒キノコによる食中毒に注意しましょう

毒キノコによる食中毒が増えています。

◇毒キノコによる食中毒等の発生状況(速報値)

食用のキノコと確実に判断できないキノコは

絶対に

**採らない! 食べない!
売らない! 人にあげない!**

判断に迷ったら、最寄りの保健所へ相談!
キノコを食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察!

<食用と間違えやすい毒キノコの例>

クサウラベニタケ	ツキヨタケ	ニガクリタケ
<p>【症状】 食後20分～1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛など消化器系の中毒を起こす。唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗などの中毒症状も現れる。</p> <p>【間違えやすいキノコ】 ウラベニホテイシメジ、ホンシメジ、ハタケシメジ</p> <p>→詳細</p>	<p>【症状】 食後30分～1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛などの中毒を起こす。</p> <p>【間違えやすいキノコ】 ヒラタケ、ムキタケ、シイタケ</p> <p>→詳細</p>	<p>【症状】 食後3時間程度で強い腹痛、激しい嘔吐、下痢、悪寒などの中毒を起こす。重症の場合は、脱水症状、けいれんなどの症状が現れて死亡する可能性がある。</p> <p>【間違えやすいキノコ】 ナメコ、クリタケ、ナラタケ、ナラタケモドキ</p> <p>→詳細</p>

代表的な毒キノコの特徴については、「自然毒のリスクプロファイル」をご覧ください。