

# DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について

中医協 総-4  
23.9.28

1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。

前年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品を含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84パーセントを超えること。包括評価の対象外とするか否かは、個別DPC（診断群分類）毎に判定するものとする。

2 以下に掲げるものは上記基準に該当する。よって、この薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する出来高算定対象診断群分類に該当する患者については、次期診療報酬改定までの間、出来高算定とする。

(1) 平成23年9月16日に効能追加の薬承認がなされた医薬品

銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用 (A)	出来高算定対象診断群分類		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤費の84パーセント値
							仮想投与回数 (B)	標準的費用 (A×B)			
ベルケイド注射用 3mg	ボルテゾミブ	3mg 1瓶	164,934円	未治療の多発性骨髄腫	他の悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人に1日1回、ボルテゾミブとして1.3mg/m <sup>2</sup> （体表面積）を1、4、8、11、22、25、29、32日目に静脈内投与し、10日間休薬（33～42日目）する。この6週間を1サイクルとし、4サイクルまで投与を繰り返す。5サイクル以降は、1日1回、1、8、22、29日目に静脈内投与し、13日間休薬（30～42日目）する。この6週間を1サイクルとし、9サイクルまで投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量すること。	体表面積は1.5m <sup>2</sup> と仮定して計算。 【ボルテゾミブ】 1.95mg投与となるので、1回あたり1瓶投与することになる。 164,934円/回 <併用薬> 【メルファラン】 1回あたり9mg/m <sup>2</sup> 投与なので、13.5mg。 1錠2mgで計算すると、214.6×7=1502.2円 【プレドニゾン】 1回あたり60mg/m <sup>2</sup> 投与なので、90mg。 1錠5mgで計算すると、9.6×18=172.8円 併用薬は合わせて1502.2+172.8=1,675円/回 併用薬は6週のうち最初の4日間のみ投与。	130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物				
							130040xx97x5xx	11.70回	1,941,821円	1,884,542円	
							130040xx99x5xx	6.17回	1,025,549円	984,538円	

(2) 平成22年4月1日以降に、新たに保険収載又は効能追加となった薬剤のうち、新ルールにより出来高算定とするもの（追加分）

銘柄名	成分名	規格単位	薬価	効能効果	用法用量	1回投与当たりの標準的な費用 (A)	出来高算定対象診断群分類		平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用		包括範囲薬剤費の84パーセント値
							仮想投与回数 (B)	標準的費用 (A×B)			
バラブリン注射液 50mg バラブリン注射液 150mg バラブリン注射液 450mg バラブリン150mg 注射用	カルボプラチン	50mg 5ml 1瓶	5,768円	乳癌	トラスツズマブ（遺伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはカルボプラチンとして、1日1回300～400mg/m <sup>2</sup> （体表面積）を投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量すること。	体重50kg、体表面積1.5m <sup>2</sup> で計算 【カルボプラチン：3週間毎投与】 300mg/m <sup>2</sup> なので450mgを投与：42,322円/回 【ハーセプチン：毎週投与】 初回投与（4mg/kg） 200mgを投与：80,102円/回 2回目以降の投与（2mg/kg） 100mgを投与：47,984円/回 【ドセタキセル：3週間毎投与】 100mg/m <sup>2</sup> なので150mgを投与：134,608円/回	090010 乳房の悪性腫瘍				
		150mg 15ml 1瓶	16,352円				090010xx97050x	1.37回	404,069円	299,360円	
		450mg 45ml 1瓶	42,322円				090010xx99x5xx	1.09回	290,710円	235,664円	
サンドスタチンLAR筋注用10mg サンドスタチンLAR筋注用20mg サンドスタチンLAR筋注用30mg	オクトレオチド酢酸塩	10mg 1瓶	121,005円	消化管神経内分泌腫瘍	通常、成人にはオクトレオチドとして30mgを4週毎に、殿部筋肉内に注射する。なお、患者の状態により適宜減量すること。	1回投与あたり、303,718円	060035 大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍				
		20mg 1瓶	215,749円				060035xx0103xx	1.66回	504,172円	181,263円	
		30mg 1瓶	303,718円				060035xx0113xx	2.05回	622,622円	314,671円	
							060035xx97x30x	1.36回	413,056円	209,512円	
							060035xx97x31x	2.06回	625,659円	464,659円	
							060035xx99x2xx	1.67回	507,209円	211,208円	
							060035xx99x30x	1.02回	309,792円	92,237円	
							060035xx99x31x	1.11回	337,127円	136,296円	
		06007x 膵臓、脾臓の腫瘍									
							06007xxx0104xx	2.43回	738,036円	487,918円	
							06007xxx0114xx	2.67回	810,927円	477,678円	
							06007xxx02x4xx	2.07回	628,696円	368,670円	
							06007xxx97x3xx	2.69回	817,001円	507,560円	
							06007xxx97x4xx	1.87回	567,953円	358,132円	
							06007xxx99x3xx	1.92回	583,139円	254,140円	
							06007xxx99x40x	1.24回	376,610円	180,038円	
							06007xxx99x41x	1.56回	473,800円	303,280円	