

条件付き第2類生薬を含むが、半量処方の場合でも第2類となる漢方製剤

注1) 非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があった数を記載してある。

注2) 重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成22年度までの期間に、PMDAに報告があった数を記載し、副作用名一覧を添付してある。

※第2類生薬成分等の配合量が半量処方以下で第3類となる製剤もある。

紫: 指定2類、緑: 第2類、赤: 条件付2類、黒: 第3類、橙色: 区分不明

処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
4 胃苓湯		蒼朮2.5-3、厚朴2.5-3、陳皮2.5-3、猪苓2.5-3、沢瀉2.5-3、芍薬2.5-3、白朮2.5-3、茯苓2.5-3、桂皮2-2.5、大棗1-3、生姜1-2、甘草1-2、縮砂2、黄連2 (芍薬、縮砂、黄連のない場合も可)	有	2	0	
8 温経湯		半夏3-5、麦門冬3-10、当帰2-3、川芎2、芍薬2、人参2、桂皮2、阿膠2、牡丹皮2、甘草2、生姜1、呉茱萸1-3	有	1	0	
9 温清飲		当帰3-4、地黄3-4、芍薬3-4、川芎3-4、黄連1-2、黄芩1.5-3、山梔子1.5-2、黄柏1-1.5	有	0	2 (参照 p7)	
10 温胆湯		半夏4-6、茯苓4-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3)、陳皮2-3、竹茹2-3、枳実1-2、甘草1-2、黄連1、酸棗仁1-3、大棗2 (黄連以降のない場合も可)	有	0	0	
15 黄耆建中湯		桂皮3-4、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍薬6、甘草2-3、黄耆1.5-4、饴糖20 (饴糖はなくても可)	有	0	0	
16 黄芩湯		黄芩4-9、芍薬2-8、甘草2-6、大棗4-9	無	0	0	
18 黄連阿膠湯		黄連3-4、芍薬2-2.5、黄芩1-2、阿膠3、制黄1餅	有	0	1 (参照 p7)	
19 黄連解毒湯		黄連1.5-2、黄芩3、黄柏1.5-3、山梔子2-3	有	2	0	
20 黄連湯		黄連3、甘草3、乾姜3、人参2-3、桂皮3、大棗3、半夏5-8	有	0	0	
22 乙字湯去大黄		当帰4-6、柴胡4-6、黄芩3-4、甘草1.5-3、升麻1-2	無	0	0	
24 解劳散		芍薬4-6、柴胡4-6、土別甲2-4、枳実2-4、甘草1.5-3、茯苓2-3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3	無	0	0	
25 化食養脾湯		人参4、白朮4、茯苓4、半夏4、陳皮2、大棗2、神麴2、麦芽2、山楂子2、縮砂1.5、生姜1、甘草1	無	0	0	
26 藿香正気散		白朮3、茯苓3-4、陳皮2-3、白芷1-4、藿香1-4、大棗1-3、甘草1-1.5、半夏3、厚朴2-3、桔梗1.5-3、蘇葉1-4、大腹皮1-4、生姜1	有	0	0	
27 葛根黄連黄芩湯		葛根5-6、黄連3、黄芩3、甘草2	有	0	0	
31 加味温胆湯		半夏3.5-6、茯苓3-6、陳皮2-3、竹茹2-3、生姜1-2、枳実1-3、甘草1-2、遠志2-3、玄参2(五味子3に変えても可)、人参2-3、地黄2-3、酸棗仁1-5、大棗2、黄連1-2(黄連のない場合も可) (遠志、玄参、人参、地黄、大棗のない場合もある)	有	0	0	
32 加味帰脾湯		人参3、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、酸棗仁3、竜眼肉3、黄耆2-3、当帰2、遠志1-2、柴胡2.5-3、山梔子2-2.5、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜1-1.5、牡丹皮2 (牡丹皮はなくても可)	有	7	0	
34 加味四物湯		当帰2.5-3、川芎2-3、芍薬2-3、地黄3-8、蒼朮3(白朮2.5も可)、麦門冬2.5-5、人参1.5-2.5、牛膝1-2.5、黄柏1.5-2.5、五味子1-1.5、黄連1.5、知母1-1.5、杜仲1.5-2	無	0	0	

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
35	加味逍遙散		当帰3、芍薬3、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、柴胡3、牡丹皮2、山梔子2、甘草1.5-2、生姜1、薄荷葉1	有	2	2 (参照 p7)	
36	加味逍遙散加川芎地黄	加味逍遙散合四物湯	当帰3-4、芍薬3-4、白朮3(蒼朮も可)、茯苓3、柴胡3、川芎3-4、地黄3-4、甘草1.5-2、牡丹皮2、山梔子2、生姜1-2、薄荷葉1	有	7	0	
37	加味平胃散		蒼朮4-6(白朮も可)、陳皮3-4.5、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、神麴2-3、山楂子2-3、厚朴3-4.5、甘草1-2、大棗2-3、麦芽2-3(山楂子はなくても可)	有	0	0	
38	乾姜人參半夏丸		乾姜3、人參3、半夏6	有	0	0	
39	甘草乾姜湯		甘草4-8、乾姜2-4	無	0	0	
40	甘草瀉心湯		半夏5、黄芩2.5、乾姜2.5、人參2.5、甘草2.5-3.5、大棗2.5、黄連1	有	0	0	
41	甘草湯		甘草2-8	有	2	0	内服
42	甘麦大棗湯		甘草3-5、大棗2.5-6、小麦14-20	有	0	0	
44	帰耆建中湯		当帰3-4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-4)、大棗3-4、芍薬5-6、甘草2-3、黄耆2-4、膠飴20(膠飴はなくても可)	有	0	0	
45	桔梗湯		桔梗1-4、甘草2-8	有	1	0	
48	芎藭膠艾湯		川芎3、甘草3、艾葉3、当帰4-4.5、芍薬4-4.5、地黄5-6、阿膠3	有	0	0	
54	駆風解毒散	駆風解毒湯	防風3-5、牛蒡子3、連翹5、荊芥1.5、羌活1.5、甘草1.5、桔梗3、石膏5-10	有	2	0	
56	荊芥連翹湯		当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黄1.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、荊芥1.5、防風1.5、薄荷葉1.5、枳殼(実)1.5、甘草1-1.5、白芷1.5-2.5、桔梗1.5-2.5、柴胡1.5-2.5(地黄、黄連、黄柏、薄荷葉のない場合も可)	有	2	0	
60	桂枝加黄耆湯		桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、黄耆2-3	無	0	0	
62	桂枝加厚朴杏仁湯		桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草1.6-2、厚朴1-4、杏仁1.6-4	無	0	0	
65	桂枝加芍薬湯		桂皮3-4、芍薬6、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2	有	0	0	
67	桂枝加竜骨牡蛎湯		桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、竜骨3、牡蛎3	有※	0	0	製剤として第三類医薬品が存在する処方
70	桂枝湯		桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2	有	0	0	
73	桂枝人參湯		桂皮4、甘草3-4、人參3、乾姜2-3、白朮3(蒼朮も可)	有	0	0	
74	桂枝茯苓丸		桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍薬4	有	19	0	
75	桂枝茯苓丸料加薏苡仁		桂皮3-4、茯苓4、牡丹皮3-4、桃仁4、芍薬4、薏苡仁10-20	有	2	0	
77	荊防敗毒散		荊芥1.5-2、防風1.5-2、羌活1.5-2、独活1.5-2、柴胡1.5-2、薄荷葉1.5-2、連翹1.5-2、桔梗1.5-2、枳殼(又は枳実)1.5-2、川芎1.5-2、前胡1.5-2、金銀花1.5-2、甘草1-1.5、生姜1	有	0	0	
80	豎中湯		半夏5、茯苓5、桂皮4、大棗3、芍薬3、乾姜3(生姜1でも可)、甘草1-1.5	無	0	0	
81	甲字湯		桂皮3-4、茯苓3-4、牡丹皮3-4、桃仁3-4、芍薬3-4、甘草1.5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)	無	0	0	
86	厚朴生姜半夏人參甘草湯		厚朴3、ヒネショウガ3(生姜を使用する場合1)、半夏4、人參1.5、甘草2.5	無	0	0	

処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
87 杞菊地黄丸		地黄5-8、8、山茱萸3-4、4、山萸4、4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮2-3、3、枸杞子4-5、5、菊花3、3 (左側の数字は湯、右側は散)	有	7	0	
92 呉茱萸湯		呉茱萸3-4、大棗2-4、人参2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-6)	有	0	0	
94 五淋散		茯苓5-6、当帰3、黄芩3、甘草3、芍薬1-2、山梔子1-2、地黄3、沢瀉3、木通3、滑石3、車前子3(地黄以下のない場合も可)	有	5	1 (参照 p7)	
96 柴陷湯		柴胡5-8、半夏5-8、黄芩3、大棗3、人参2-3、甘草1.5-3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、栝楼仁3、黄連1-1.5	有	0	0	
99 柴胡桂枝湯		柴胡4-5、半夏4、桂皮1.5-2.5、芍薬1.5-2.5、黄芩1.5-2、人参1.5-2、大棗1.5-2、甘草1-1.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)	有	4	1 (参照 p7)	
102 柴芍六君子湯		人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏4、陳皮2-3、大棗2、甘草1-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、柴胡3-4、芍薬3-4	無	0	0	
104 柴朴湯		柴胡7、半夏5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩3、大棗3、人参3、甘草2、茯苓4-5、厚朴3、蘇葉2-3	有	0	0	
105 柴苓湯		柴胡4-7、半夏4-5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗2.5-3、人参2.5-3、甘草2-2.5、沢瀉4-6、猪苓2.5-4.5、茯苓2.5-4.5、白朮2.5-4.5(蒼朮も可)、桂皮2-3	有	0	0	
111 滋陰降火湯		当帰2.5、芍薬2.5、地黄2.5、天門冬2.5、麦門冬2.5、陳皮2.5、白朮あるいは蒼朮3、知母1-1.5、黄柏1-1.5、甘草1-1.5、大棗1、生姜1(大棗、生姜はなくても可)	有	0	0	
115 四逆散		柴胡2-5、芍薬2-4、枳実2、甘草1-2	有	0	0	
121 滋腎明目湯		当帰3-4、川芎3-4、熟地黄3-4、地黄3-4、芍薬3-4、桔梗1.5-2、人参1.5-2、山梔子1.5-2、黄連1.5-2、白芷1.5-2、蔓荊子1.5-2、菊花1.5-2、甘草1.5-2、細辛1.5、燈心草1-1.5(燈心草のない場合も可)	無	0	0	
122 七物降下湯		当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黄3-5、釣藤鈎3-4、黄耆2-3、黄柏2	有	0	0	
124 四物湯		当帰3-5、芍薬3-5、川芎3-5、地黄3-5	有	0	0	
126 芍薬甘草湯		芍薬3-8、甘草3-8	有	2	1 (参照 p7)	
130 十全大補湯		人参2.5-3、黄耆2.5-3、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、当帰3-4、芍薬3、地黄3-4、川芎3、桂皮3、甘草1-2	有	3	0	
131 十味敗毒湯		柴胡2.5-3.5、桜皮(楡樹)2.5-3.5、桔梗2.5-3.5、川芎2.5-3.5、茯苓2.5-4、独活1.5-3、防風1.5-3.5、甘草1-2、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、荊芥1-2、連翹2-3(連翹のない場合も可)	有	2	1 (参照 p8)	
133 蒸眼一方		白礬(明礬)2、甘草2、黄連2、黄柏2、紅花2	無	0	0	
134 生姜瀉心湯		半夏5-8、人参2.5-4、黄芩2.5-4、甘草2.5-4、大棗2.5-4、黄連1、乾姜1-2、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)	有	0	0	
135 小建中湯		桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、大棗3-4、芍薬6、膠飴20(マルツエキス、日産糖可、水飴の場合40)	有※	0	0	製剤として第三類医薬品が存在する処方
136 小柴胡湯		柴胡5-8、半夏3.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-4)、黄芩2.5-3、大棗2.5-3、人参2.5-3、甘草1-3	有	0	1 (参照 p8)	
137 小柴胡湯加栝楼石膏		柴胡7、半夏5、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、黄芩3、大棗3、人参3、甘草2、栝楼3、石膏10	無	0	0	
144 小半夏加茯苓湯		半夏5-8、ヒネショウガ5-8(生姜を用いる場合1.5-3)、茯苓3-8	有	0	0	
146 升麻葛根湯		葛根5-6、升麻1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、芍薬3、甘草1.5-3	無	0	0	

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
147	逍遙散	八味逍遙散	当帰3-4.5、芍薬3-4.5、柴胡3-4.5、白朮3-4.5(蒼朮も可)、茯苓3-4.5、甘草1.5-3、生姜0.5-1、薄荷葉1-2.1	有	2	0	
149	辛夷清肺湯		辛夷2-3、知母3、百合3、黄芩3、山梔子1.5-3、麦門冬5-6、石膏5-6、升麻1-1.5、枇杷葉1-3	有	91	0	
152	参蘇飲		蘇葉1-3、枳実1-3、桔梗2-3、陳皮2-3、葛根2-6、前胡2-6、半夏3、茯苓3、人參1.5-2、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1.5-3、生姜の代わりに乾姜も可)、木香1-1.5、甘草1-2(木香はなくても可)	有	0	0	
159	清上防風湯		荊芥1-1.5、黄連1-1.5、薄荷葉1-1.5、枳実1-1.5、甘草1-1.5、山梔子1.5-3、川芎2-3、黄芩2-3、連翹2.5-3、白芷2.5-3、桔梗2.5-3、防風2.5-3	有	0	0	
161	清心蓮子飲		蓮肉4-5、麦門冬3-4、茯苓4、人參3-5、車前子3、黄芩3、黄耆2-4、地骨皮2-3、甘草1.5-2	有	42	3 (参照 p8)	
162	清熱補氣湯		人參3、白朮3-4、茯苓3-4、当帰3、芍薬3、升麻0.5-1、五味子1、玄参1-2、麦門冬3、甘草1	無	0	0	
163	清熱補血湯		当帰3、川芎3、芍薬3、地黄3、玄参1.5、知母1.5、五味子1.5、黄柏1.5、麦門冬1.5-3、柴胡1.5、牡丹皮1.5	無	0	0	
168	千金内托散		黄耆2、当帰3-4、人參2-3、川芎2、防風2、桔梗2、白芷1-2、厚朴2、甘草1-2、桂皮2-4(金銀花2を加えても可)	無	0	0	
171	疎経活血湯		当帰2-3.5、地黄2-3、川芎2-2.5、蒼朮2-3(白朮も可)、茯苓1-2、桃仁2-3、芍薬2.5-4.5、牛膝1.5-3、威靈仙1.5-3、防己1.5-2.5、羌活1.5-2.5、防風1.5-2.5、竜胆1.5-2.5、生姜0.5、陳皮1.5-3、白芷1-2.5、甘草1	有	7	1 (参照 p8)	
172	蘇子降氣湯		紫蘇子3-5(蘇葉可)、半夏3-5、陳皮2-3、前胡2-3、桂皮2-3、当帰2.5-3、厚朴2-3、大棗1-2、生姜0.5-1又は乾姜0.5-1、甘草1-2	有	0	0	
177	大柴胡湯去大黃		柴胡6-8、半夏3-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5)、黄芩3-6、芍薬3、大棗3、枳実2-3	有	0	0	
178	大半夏湯		半夏7、人參3、ハチミツ20	無	0	0	
181	竹葉石膏湯		竹葉1.2-2、石膏4.8-16、半夏1.6-8、麦門冬3.4-12、人參0.8-3、甘草0.6-2、粳米2-8.5	無	0	0	
184	治頭痛一方去大黃		連翹3、蒼朮3、川芎3、防風2、忍冬2、荊芥1、甘草1、紅花1	無	0	0	
185	知柏地黄丸		地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、知母3、黄柏3	有	0	0	
187	中建中湯		桂皮4、芍薬6、甘草2、大棗4、山椒2、乾姜1、人參3、(膠飴20を加えることもある)	無	0	0	
189	丁香柿蒂湯		柿蒂7、桂皮3、半夏3、陳皮3、丁子1、良姜1、木香1、沈香1、茴香1、藿香1、厚朴1、縮砂1、甘草1、乳香1	無	0	0	
190	釣藤散		釣藤鈎3、橘皮3(陳皮も可)、半夏3、麦門冬3、茯苓3、人參2-3、防風2-3、菊花2-3、甘草1、生姜1、石膏5-7	有	1	1 (参照 p8)	
192	猪苓湯合四物湯		当帰3、芍薬3、川芎3、地黄3、猪苓3、茯苓3、滑石3、沢瀉3、阿膠3	有	3	0	
194	定悸飲		李根皮2、甘草1.5-2、茯苓4-6、牡蛎3、桂皮3、白朮2-3(蒼朮も可)、呉茱萸1.5-2	無	0	0	
197	当帰建中湯		当帰4、桂皮3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4)、大棗3-4、芍薬5-7.5、甘草2-2.5、膠飴20(膠飴はなくても可)	有	0	0	
199	当帰四逆加呉茱萸生姜湯		当帰3-4、桂皮3-4、芍薬3-4、木通1.5-3、細辛2-3、甘草1.5-2、大棗4-6.5、呉茱萸1-6、生姜0.5-2(ヒネショウガを使用する場合4-8)	有	0	0	
200	当帰四逆湯		当帰1.8-4、桂皮1.8-4、芍薬1.8-4、木通2-3、大棗1.8-6.5、細辛1.8-3、甘草1.2-2.5	有	0	0	
202	当帰芍薬散加黄耆釣藤		当帰3、沢瀉4、川芎3、芍薬4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、黄耆3、釣藤鈎4	無	0	0	
205	当帰湯		当帰5、半夏5、芍薬3、厚朴3、桂皮3、人參3、乾姜1.5、黄耆1.5、山椒1.5、甘草1	無	0	0	

処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
210 二陳湯		半夏5-7、茯苓3.5-5、陳皮3.5-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2-3)、甘草1-2	有	0	0	
212 人參湯	理中丸	人參3、甘草3、白朮3(蒼朮も可)、乾姜2-3	有	1	0	
213 人參養榮湯		人參3、当歸4、芍薬2-4、地黄4、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、桂皮2-2.5、黄耆1.5-2.5、陳皮(橘皮も可)2-2.5、遠志1-2、五味子1-1.5、甘草1-1.5	有	1	0	
215 排膿散及湯		桔梗3-4、甘草3、大棗3-6、芍薬3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、枳実2-3	有	0	0	
217 麦門冬湯		麦門冬8-10、半夏5、粳米5-10、大棗2-3、人參2、甘草2	有	1	2 (参照 p8)	
218 八解散		半夏3、茯苓3、陳皮3、大棗2、甘草2、厚朴6、人參3、藿香3、白朮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2)	無	0	0	
220 半夏厚朴湯		半夏6-8、茯苓5、厚朴3、蘇葉2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)	有	16	0	
221 半夏瀉心湯		半夏4-6、黄芩2.5-3、乾姜2-3、人參2.5-3、甘草2.5-3、大棗2.5-3、黄連1	有	8	1 (参照 p9)	
222 半夏白朮天麻湯		半夏3、白朮1.5-3、陳皮3、茯苓3、麦芽1.5-2、天麻2、生姜0.5-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)、神麴1.5-2、黄耆1.5-2、人參1.5-2、沢瀉1.5-2、黄柏1、乾姜0.5-1(神麴のない場合も可)(蒼朮2-3を加えても可)	有	0	0	
223 白虎加桂枝湯		知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2、桂皮3-4	有	0	0	
224 白虎加人參湯		知母5-6、石膏15-16、甘草2、粳米8-20、人參1.5-3	有	0	0	
225 白虎湯		知母5-6、粳米8-10、石膏15-16、甘草2	無	0	0	
226 不換金正氣散		蒼朮4(白朮も可)、厚朴3、陳皮3、大棗1-3、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、半夏6、甘草1.5、藿香1-1.5	無	0	0	
227 伏竜肝湯		伏竜肝4-10、ヒネショウガ5-8(生姜を使用する場合1.5-3)、半夏6-8、茯苓3-5	無	0	0	
229 茯苓飲加半夏		茯苓5、白朮4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、陳皮3、枳実1.5、半夏4	無	0	0	
230 茯苓飲合半夏厚朴湯		茯苓4-6、白朮3-4(蒼朮も可)、人參3、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合4-5)、陳皮3、枳実1.5-2、半夏6-10、厚朴3、蘇葉2	無	0	0	
235 平胃散		蒼朮4-6(白朮も可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、大棗2-3、甘草1-1.5、生姜0.5-1	有	0	0	
236 防己黄耆湯		防己4-5、黄耆5、白朮3(蒼朮も可)、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、大棗3-4、甘草1.5-2	有	19	0	
237 防己茯苓湯		防己2.4-3、黄耆2.4-3、桂皮2.4-3、茯苓4-6、甘草1.5-2	無	0	0	
239 補気健中湯	補気建中湯	白朮3-5、蒼朮2.5-3.5、茯苓3-5、陳皮2.5-3.5、人參1.5-4、黄耆2-3、厚朴2、沢瀉2-4、麦門冬2-8	有	0	0	
240 補中益気湯		人參3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、黄耆3-4.5、当歸3、陳皮2-3、大棗1.5-3、柴胡1-2、甘草1-2、生姜0.5、升麻0.5-2	有	2	0	
247 味麦地黄丸		地黄8、山茱萸4、山薬4、沢瀉3、茯苓3、牡丹皮3、麦門冬6、五味子2	有※	0	0	製剤として第三類医薬品が存在する処方
248 明朗飲		茯苓4-6、細辛1.5-2、桂皮3-4、黄連1.5-2、白朮2-4、甘草2、車前子2-3	無	0	0	
251 抑肝散		当歸3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5	有	2	0	
252 抑肝散加芍薬黄連		当歸5.5、釣藤鈎1.5、川芎2.7、白朮5.3(蒼朮も可)、茯苓6.5、柴胡2、甘草0.6、芍薬4、黄連0.3	有	0	0	
253 抑肝散加陳皮半夏		当歸3、釣藤鈎3、川芎3、白朮4(蒼朮も可)、茯苓4、柴胡2-5、甘草1.5、陳皮3、半夏5	有	0	0	

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
254	六君子湯		人参2-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、半夏3-4、陳皮2-4、大棗2、甘草1-1.5、生姜0.5-1(※キショウを使用する場合1-2)	有	1	0	
255	立効散		細辛1.5-2、升麻1.5-2、防風2-3、甘草1.5-2、竜胆1-1.5	有	0	0	
256	竜胆瀉肝湯		当帰5、地黄5、木通5、黄芩3、沢瀉3、車前子3、竜胆1-1.5、山梔子1-1.5、甘草1-1.5	有	1	0	
257	苓姜朮甘湯		茯苓4-6、乾姜3-4、白朮2-3(蒼朮も可)、甘草2	有	0	0	
258	苓桂甘藶湯		茯苓4-8、桂皮4、大棗4、甘草2-3	有	0	0	
259	苓桂朮甘湯		茯苓4-6、白朮2-4(蒼朮も可)、桂皮3-4、甘草2-3	有	1	0	
262	連珠飲		当帰3-4、白朮2-4(蒼朮も可)、川芎3-4、甘草2-3、芍薬3-4、地黄3-4、茯苓4-6、桂皮3-4	有※	64	0	製剤として第三類医薬品が存在する処方
263	六味丸	六味地黄丸	地黄5-6、4-8、山茱萸3、3-4、山薬3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3(左側の数字は湯、右側は散)	有	0	0	

<温清飲>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)1.5g、オウバク(条第3類)0.75g、オウレン(条第3類)0.75g、サンシシ(第3類)1g、ジオウ(第2類)2g、シャクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)2g、トウキ(第3類)2g	咳嗽 肝障害	回復 回復
オウゴン(第2類)3.0g、オウバク(条第3類)1.5g、オウレン(第2類)1.5g、サンシシ(第3類)2.0g、ジオウ(第2類)4.0g、シャクヤク(第3類)3.0g、センキュウ(第2類)3.0g、トウキ(第3類)4.0g	肝障害	軽快

<黄連阿膠湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
アキヨウ(第3類)1.50g、オウゴン(条第3類)1.00g、オウレン(第2類)1.50g、シャクヤク(第3類)1.25g、卵黄(?)3.00g	肝機能異常	未回復

<加味逍遥散>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンゾウ(第2類)1.2g、サイコ(第2類)1.8g、サンシシ(第3類)1.2g、シャクヤク(第3類)1.8g、ショウキョウ(第3類)0.6g、トウキ(第3類)1.8g、ハツカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1.8g、ブクリョウ(条第3類)1.8g、ポタンピ(第2類)1.2g	特発性腸間膜静脈硬化症	不明
カンゾウ(条第3類)0.75g、サイコ(第2類)1.5g、サンシシ(第3類)1.0g、シャクヤク(第3類)1.5g、ショウキョウ(第3類)0.25g、トウキ(第3類)1.5g、ハツカ(第3類)0.5g、ビャクジュツ(条第3類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)1.5g、ポタンピ(第2類)1.0g	肝障害	不明

<五淋散>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)1.5g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.5g、サンシシ(第3類)1g、ジオウ(第2類)1.5g、シャクヤク(第3類)1g、シャゼンシ(第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)1.5g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)3g、モクソウ(第2類)1.5g	肝機能異常	軽快

<柴胡桂枝湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)2.0g、カンゾウ(第2類)1.5g、ケイヒ(第3類)2.0g、サイコ(第2類)5.0g、シャクヤク(第3類)2.0g、ショウキョウ(第3類)0.5g、タイソウ(第3類)2.0g、ニンジン(第3類)2.0g、ハンゲ(第2類)4.0g	肝障害	軽快

<芍薬甘草湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンゾウ(第2類)3.0g、シャクヤク(第3類)3.0g	肝機能異常	軽快

<十味敗毒湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンゾウ(条第3類)0.5g、キキョウ(第3類)1.5g、ケイガイ(条第3類)0.5g、サイコ(第2類)1.5g、ショウキョウ(第3類)0.5g、センキュウ(条第3類)1.5g、ドクカツ(条第3類)0.75g、ブクリョウ(条第3類)1.5g、ポウフウ(第2類)0.75g、ボクソク(?)1.5g	剥脱性皮膚炎	回復

<小柴胡湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、サイコ(第2類)3.5g、ショウキョウ(第3類)0.5g、タイソウ(第3類)1.5g、ニンジン(第3類)1.5g、ハンゲ(第2類)2.5g	急性肝不全	軽快

<清心蓮子飲>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウギ(第3類)2.8g、オウゴン(第2類)2.1g、カンゾウ(条第3類)0.7g、ジコッピ(第2類)2.1g、シャゼンシ(第3類)2.1g、ニンジン(第3類)3.5g、バクモンドウ(第3類)2.1g、ブクリョウ(条第3類)2.8g、レンニク(第3類)3.5g	ネフローゼ症候群	軽快
	間質性肺疾患	軽快
	水腎症	回復
	尿閉	回復
	尿路感染	回復

<疎経活血湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
イレイセン(第2類)0.75g、カンゾウ(条第3類)0.5g、キョウカツ(第2類)0.75g、ゴシツ(条第3類)0.75g、ジオウ(第2類)1g、シャクヤク(第3類)1.25g、ショウキョウ(第3類)0.25g、センキュウ(条第3類)1g、チンピ(第3類)0.75g、トウキ(第3類)1g、トウニン(第2類)1g、ビヤクシ(条第3類)0.5g、ビヤクジュツ(条第3類)1g、ブクリョウ(条第3類)1g、ポウイ(第2類)0.75g、ポウフウ(第2類)0.75g、リュウタン(条第3類)0.75g	全身性皮疹	回復
	全身性浮腫	軽快

<釣藤散>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンゾウ(条第3類)0.5g、キクカ(第3類)1.5g、ショウキョウ(第3類)0.5g、セツコウ(第2類)2.5g、チョウトウコウ(第2類)1.5g、チンピ(第3類)1.5g、ニンジン(第3類)1.0g、バクモンドウ(第3類)1.5g、ハンゲ(第2類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)1.5g、ポウフウ(第2類)1.0g	肝機能異常	軽快

<麦門冬湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンゾウ(第2類)1.0g、コウベイ(第3類)2.5g、タイソウ(第3類)1.5g、ニンジン(第3類)1.0g、バクモンドウ(第3類)5.0g、ハンゲ(第2類)2.5g	間質性肺疾患	不明
カンゾウ(第2類)1.5g、コウベイ(第3類)3.75g、タイソウ(第3類)2.25g、ニンジン(第3類)1.5g、バクモンドウ(第3類)7.5g、ハンゲ(第2類)3.75g	肝障害	不明

<半夏瀉心湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)1.25g、オウレン(第3類)0.5g、カンキョウ(第3類)1.25g、カンゾウ(第2類)1.25g、タイソウ(第3類)1.25g、ニンジン(第3類)1.25g、ハング(第2類)2.5g	肝障害	軽快

注)副作用数を掲載しているため症例数と異なる場合がある。