

## 指定第2類の生薬を含む漢方製剤

注1) 非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があった数を記載してある。  
 注2) 重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成22年度までの期間に、PMDAに報告があった数を記載し、副作用名一覧を添付してある。

※指定第2類生薬(加工エシ)を含まない製剤がある。

紫:指定2類、緑:第2類、赤:条件付2類、黒:第3類、黄色:区分不明

処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
7	烏薬順気散	麻黄2.5-3、陳皮2.5-5、烏薬2.5-5、川芎2-3、白僵蚕1.5-2.5、枳殼1.5-3、白芷1.5-3、甘草1-1.5、桔梗2-3、乾姜1-2.5、生姜1、大棗1-3 (生姜・大棗を抜いても可)	無	0	0	
11	越婢加朮湯	麻黄4-6、石膏8-10、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、大棗3-5、甘草1.5-2、白朮3-4(蒼朮も可)	有	0	0	
12	越婢加朮附湯	麻黄4-6、石膏8-10、白朮3-4(蒼朮も可)、加工エシ0.3-1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1.5-2、大棗3-4	無	0	0	
23	解急蜀椒湯	蜀椒1-2、加工エシ0.3-1、粳米7-8、乾姜1.5-4、半夏4-8、大棗3、甘草1-2、人参2-3、蜂蜜20(蜂蜜はなくても可)	無	0	0	
29	葛根湯	葛根4-8、麻黄3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5	有	42	21 (参照 p3)	
30	葛根湯加川芎辛夷	葛根4-8、麻黄3-4、大棗3-4、桂皮2-3、芍薬2-3、甘草2、生姜1-1.5、川芎2-3、辛夷2-3	有	3	3 (参照 p4)	
52	杏蘇散	蘇葉3、五味子2、大腹皮2、烏梅2、杏仁2、陳皮1-1.5、桔梗1-1.5、麻黄1-1.5、桑白皮1-1.5、阿膠1-1.5、甘草1-1.5、紫苑1	無	0	0	
58	桂姜藜蘆黄辛附湯	桂皮3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草2、大棗3-3.5、麻黄2、細辛2、加工エシ0.3-1	無	0	0	
59	桂枝越婢湯	桂皮4、芍薬4、甘草2、麻黄5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.5)、大棗3、石膏8、蒼朮4、加工エシ1	無	0	0	
66	桂枝加朮附湯	桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工エシ0.5-1	有	0	0	
68	桂枝加苓朮附湯	桂皮3-4、芍薬3-4、大棗3-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、蒼朮3-4(白朮も可)、加工エシ0.5-1、茯苓4	有	1	0	
69	桂枝芍薬知母湯	桂皮3-4、芍薬3-4、甘草1.5-2、麻黄2-3、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合3-5)、白朮4-5(蒼朮も可)、知母2-4、防風3-4、加工エシ0.3-1	有	0	0	
71	桂枝二越婢一湯	桂皮2.5-3.5、芍薬2.5-3.5、麻黄2.5-3.5、甘草2.5-3.5、大棗3-4、石膏3-8、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2.8-3.5)	無	0	0	
72	桂枝二越婢一湯加朮附	桂皮2.5、芍薬2.5、甘草2.5、麻黄2.5、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3.5)、大棗3、石膏3、白朮3(蒼朮も可)、加工エシ0.5-1	無	0	0	
78	桂麻各半湯	桂皮3.5、芍薬2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2)、甘草2、麻黄2、大棗2、杏仁2.5	有	0	0	
88	五虎湯	麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10、桑白皮1-3	有	2	0	
90	五積散	茯苓2-3、蒼朮2-3(白朮も可)、陳皮2-3、半夏2-3、当帰1.2-3、芍薬1-3、川芎1-3、厚朴1-3、白芷1-3、枳殼(実)1-3、桔梗1-3、乾姜1-1.5、生姜0.3-0.6(ヒネショウガを使用する場合1-2)、桂皮1-1.5、麻黄1-2.5、大棗1-2、甘草1-2、香附子1.2 (生姜、香附子のない場合も可)	有	0	0	
91	牛車腎気丸	地黄5-8、山茱萸2-4、山薬3-4、沢瀉3、茯苓3-4、牡丹皮3、桂皮1-2、加工エシ0.5-1、牛膝2-3、車前子2-3	有	2	0	
114	四逆加人参湯	甘草2-4.8、乾姜1.5-3.6、加工エシ0.5-2.4、人参1-3	無	0	0	
116	四逆湯	甘草2-4.8、乾姜1.5-3.6、加工エシ0.3-2.4	無	0	0	
127	芍薬甘草附子湯	芍薬3-10、甘草3-8、加工エシ0.3-1.6	有	0	0	

処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
139 小青竜湯		麻黄2-3.5、芍薬2-3.5、乾姜2-3.5、甘草2-3.5、桂皮2-3.5、細辛2-3.5、五味子1-3、半夏3-8	有	3	3 (参照 p4)	
140 小青竜湯加杏仁石膏	小青竜湯合麻杏石膏湯	麻黄2-4、芍薬2-3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮2-3、細辛2-3、五味子1.5-3、半夏3-6、杏仁4、石膏5-10	有	0	0	
141 小青竜湯加石膏		麻黄3、芍薬3、乾姜2-3、甘草2-3、桂皮3、細辛2-3、五味子2-3、半夏6-8、石膏2-5	有	0	0	
142 小續命湯		麻黄2-4、防己2-3、人参1-3、黄芩2-3、桂皮2-4、甘草1-4、芍薬2-3、川芎2-3、杏仁3-3.5、加工エプシ0.3-1、防風2-4、生姜1-3(ヒネショウガを使用する場合4-10)	無	0	0	
150 秦艽羌活湯		秦艽3、羌活5、黄耆3、防風2、升麻1.5、甘草1.5、麻黄1.5、柴胡1.5、桑本0.5、細辛0.5、紅花0.5	無	0	0	
153 神秘湯		麻黄3-5、杏仁4、厚朴3、陳皮2-3、甘草2、柴胡2-4、蘇葉1.5-3	有	0	0	
154 真武湯		茯苓3-5、芍薬3-3.6、白朮2-3(蒼朮も可)、生姜1(ヒネショウガを使用する場合2-3.6)、加工エプシ0.3-1.5	有	1	0	
170 続命湯		麻黄3、桂皮3、当帰3、人参3、石膏3-6、乾姜2-3、甘草2-3、川芎1.5-3、杏仁2.5-4	有	0	0	
204 当帰芍薬散加附子		当帰3、沢瀉4、川芎3、加工エプシ0.4、芍薬4、茯苓4、白朮4(蒼朮も可)	無	0	0	
207 独活葛根湯		葛根5、桂皮3、芍薬3、麻黄2、独活2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、地黄4、大棗1-2、甘草1-2	有	0	0	
219 八味地黄丸		地黄5、6-8、山茱萸3、3-4、山薬3、3-4、沢瀉3、3、茯苓3、3、牡丹皮3、3、桂皮1、1、加工エプシ0.5-1、0.5-1(左側の数字は湯、右側は散)	有※	27	3 (参照 p4)	加工エプシを含まない製剤がある。
231 茯苓四逆湯		茯苓4-4.8、甘草2-3、乾姜1.5-3、人参1-3、加工エプシ0.3-1.5	無	0	0	
233 附子理中湯		人参3、加工エプシ0.5-1、乾姜2-3、甘草2-3、白朮3(蒼朮も可)	有	0	0	
238 防風通聖散		当帰1.2-1.5、芍薬1.2-1.5、川芎1.2-1.5、山梔子1.2-1.5、連翹1.2-1.5、薄荷葉1.2-1.5、生姜0.3-0.5(ヒネショウガを使用する場合1.2-1.5)、荆芥1.2-1.5、防風1.2-1.5、麻黄1.2-1.5、大黄1.5、芒硝1.5、白朮2、桔梗2、黄芩2、甘草2、石膏2、滑石3(白朮のない場合も可)	有	758	64 (参照 p5)	
242 麻黄湯		麻黄3-5、桂皮2-4、杏仁4-5、甘草1-1.5	有	4	0	
243 麻黄附子細辛湯		麻黄2-4、細辛2-3、加工エプシ0.3-1	有	0	0	
244 麻杏石膏湯		麻黄4、杏仁4、甘草2、石膏10	有	0	0	
245 麻杏薤甘湯		麻黄4、杏仁3、薤苡仁10、甘草2	有	1	0	
250 薤苡仁湯		麻黄4、当帰4、蒼朮4(白朮も可)、薤苡仁8-10、桂皮3、芍薬3、甘草2	有	0	0	
260 麗沢通気湯		黄耆4、山椒1、蒼朮3、麻黄1、羌活3、白芷4、独活3、生姜1、防風3、大棗1、升麻1、葱白3、葛根3、甘草1(葱白はなくても可)	無	0	0	
261 麗沢通気湯加辛夷		黄耆4、山椒1、蒼朮3、麻黄1、羌活3、白芷4、独活3、生姜1、防風3、大棗1、升麻1、葱白3、葛根3、甘草1、辛夷3(葱白はなくても可)	無	0	0	

<葛根湯>

成分(区分)-分量	副作用名PT	副作用転帰
カッコン(第2類)6.0g、カンゾウ(第2類)1.5g、ケイヒ(第3類)2.25g、シャクヤク(第3類)2.25g、シヨウキョウ(第3類)0.75g、タイソウ(第3類)3.0g、マオウ(指定第2類)3.0g	肝障害	軽快
	好酸球増加症	未回復
	多形紅斑	軽快
カッコン(第2類)8g、カンゾウ(第2類)2g、ケイヒ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g、シヨウキョウ(第3類)1g、タイソウ(第3類)4g、マオウ(指定第2類)4g	急性腎不全	軽快
	呼吸困難	不明
	心不全	不明
	動悸	不明
カッコン(第2類)8g、カンゾウ(第2類)2g、ケイヒ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g、シヨウキョウ(第3類)1g、タイソウ(第3類)4g、マオウ(指定第2類)4g	嘔吐	回復
カッコン(条第3類)2.64g、カンゾウ(第2類)1.32g、ケイヒ(第3類)1.32g、シャクヤク(第3類)1.32g、シヨウキョウ(第3類)0.66g、タイソウ(第3類)1.98g、マオウ(指定第2類)1.98g	肝障害	回復
カッコン(条第3類)2.64g、カンゾウ(第2類)1.32g、ケイヒ(第3類)1.32g、シャクヤク(第3類)1.32g、シヨウキョウ(第3類)0.66g、タイソウ(第3類)1.98g、マオウ(指定第2類)1.98g	ステーブンス・ジョンソン症候群	回復
	角膜障害	不明
	皮膚粘膜眼症候群	不明
カッコン(第2類)8.0g、カンゾウ(第2類)2.0g、ケイヒ(第3類)3.0g、シャクヤク(第3類)3.0g、シヨウキョウ(第3類)1.0g、タイソウ(第3類)4.0g、マオウ(指定第2類)4.0g	アナフィラキシー様反応	不明
	虚血性肝炎	不明
カッコン(第2類)8.0g、カンゾウ(第2類)2.0g、ケイヒ(第3類)3.0g、シャクヤク(第3類)3.0g、シヨウキョウ(第3類)1.0g、タイソウ(第3類)4.0g、マオウ(指定第2類)4.0g	紅斑	回復
カッコン(第2類)6.4g、カンゾウ(第2類)1.6g、ケイヒ(第3類)2.4g、シャクヤク(第3類)2.4g、シヨウキョウ(第3類)0.8g、タイソウ(第3類)3.2g、マオウ(指定第2類)3.2g	肝障害	不明
	偽アルドステロン症	回復
	急性肝炎	軽快
	急性腎不全	軽快
	肺障害	回復
カッコン(第2類)6g、カンゾウ(第2類)1.5g、ケイヒ(第3類)2.25g、シャクヤク(第3類)2.25g、シヨウキョウ(第3類)0.75g、タイソウ(第3類)3g、マオウ(指定第2類)3g	アナフィラキシー反応	軽快
カッコン(条第3類)4.0g、カンゾウ(第2類)2.0g、ケイヒ(第3類)2.0g、シャクヤク(第3類)2.0g、シヨウキョウ(第3類)1.0g、タイソウ(第3類)3.0g、マオウ(指定第2類)3.0g	アナフィラキシーショック	不明
カッコン(第2類)6g、カンゾウ(第2類)1.5g、ケイヒ(第3類)2.25g、シャクヤク(第3類)2.25g、シヨウキョウ(第3類)0.75g、タイソウ(第3類)3g、マオウ(指定第2類)3g	アナフィラキシー反応	軽快
	肝機能異常	未回復
	急性肝炎	軽快
	急性腎不全	軽快

カッコン(第2類)8g、カンゾウ(第2類)2g、ケイヒ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g、シヨウキョウ(第3類)1g、タイソウ(第3類)4g、マオウ(指定第2類)4g	中毒性表皮壊死融解症	不明
カッコン(第2類)8g、マオウ(指定第2類)・タイソウ(第3類)各4g、ケイヒ(第3類)・シャクヤク(第3類)各3g、カンゾウ(第2類)2g、シヨウキョウ(第3類)1g	中毒性表皮壊死融解症	後遺症あり
カッコン(第2類)8g、カンゾウ(第2類)2g、ケイヒ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g、シヨウキョウ(第3類)1g、タイソウ(第3類)4g、マオウ(指定第2類)4g	中毒性表皮壊死融解症	軽快

### <葛根湯加川芎辛夷>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カッコン(条第3類)2.0g、カンゾウ(第2類)1.0g、ケイヒ(第3類)1.0g、シャクヤク(第3類)1.0g、シヨウキョウ(第3類)0.5g、シンイ(第2類)1.5g、センキュウ(条第3類)1.5g、タイソウ(第3類)1.5g、マオウ(指定第2類)2.0g	アナフィラキシー反応	軽快
カッコン(条第3類)2g、カンゾウ(第2類)1g、ケイヒ(第3類)1g、シャクヤク(第3類)1g、シヨウキョウ(第3類)0.5g、シンイ(第2類)1.5g、センキュウ(条第3類)1.5g、タイソウ(第3類)1.5g、マオウ(指定第2類)2g	肝障害	後遺症あり
	薬疹	軽快
カッコン(条第3類)2g、カンゾウ(第2類)1g、ケイヒ(第3類)1g、シャクヤク(第3類)1g、シヨウキョウ(第3類)0.5g、シンイ(第2類)1.5g、センキュウ(条第3類)1.5g、タイソウ(第3類)1.5g、マオウ(指定第2類)2g	肝機能異常	回復

### <小青竜湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンキョウ(第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.5g、ケイヒ(第3類)1.5g、ゴミシ(第3類)1.5g、サイシン(第2類)1.5g、シャクヤク(第3類)1.5g、ハンゲ(第2類)3.0g、マオウ(指定第2類)1.5g	間質性肺疾患	死亡
カッコン(条第3類)8g、マオウ(指定第2類)・タイソウ(第3類)各4g、ケイヒ(第3類)・シャクヤク(第3類)各3g、カンゾウ2g(第2類)、シヨウキョウ(第3類)1g	黄疸	軽快
	肝機能異常	軽快
カンキョウ(第3類)3.0g、カンゾウ(第2類)3.0g、ケイヒ(第3類)3.0g、ゴミシ(第3類)3.0g、サイシン(第2類)3.0g、シャクヤク(第3類)3.0g、ハンゲ(第2類)6.0g、マオウ(指定第2類)3.0g	呼吸困難	回復

### <八味地黄丸>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
ケイヒ(第3類)0.5g、サンシュユ(第3類)1.5g、サンヤク(第3類)1.5g、ジオウ(第2類)2.5g、タクシャ(条第3類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)1.5g、プシ(指定第2類)0.5g、ポタンピ(第2類)1.5g	筋力低下	回復
	低カリウム血症	回復
ケイヒ(第3類)0.111g、サンシュユ(第3類)0.445g、サンヤク(第3類)0.445g、ジオウ(第2類)0.89g、タクシャ(条第3類)0.334g、ブクリョウ(条第3類)0.334g、プシ(指定第2類)0.111g、ポタンピ(少条第3類)0.334g	横紋筋融解症	軽快
	横紋筋融解症	回復

<防風通聖散>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
<p>オウゴン(条第3類)1g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1g、キキョウ(第3類)1g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	肝機能異常	回復
	間質性肺疾患	回復
<p>オウゴン(条第3類)1.0g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、キキョウ(第3類)1.0g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1.0g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1.0g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	肝機能異常	軽快
	劇症肝炎	回復
	脳梗塞	軽快
<p>オウゴン(条第3類)1g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1g、キキョウ(第3類)1g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	肝障害	回復
<p>オウゴン(条第3類)1.0g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、キキョウ(第3類)1.0g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.15g、セッコウ(少条第3類)1.0g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1.0g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	間質性肺疾患	軽快
	急性肝炎	軽快
<p>オウゴン(条第3類)1.00g、カッセキ(条第3類)1.50g、カンゾウ(第2類)1.00g、キキョウ(第3類)1.00g、ケイガイ(条第3類)0.60g、サンシシ(第3類)0.60g、シャクヤク(第3類)0.60g、シヨウキョウ(第3類)0.15g、セッコウ(少条第3類)1.00g、センキュウ(条第3類)0.60g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.60g、ハッカ(第3類)0.60g、ビャクジュツ(条第3類)1.00g、ボウフウ(第2類)0.60g、マオウ(指定第2類)0.60g、硫酸ナトリウム(第3類)0.75g、レンギョウ(第2類)0.60g</p>	肝機能検査異常	軽快
<p>オウゴン(条第3類)1g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1g、キキョウ(第3類)1g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	肝障害	回復

<p>オウゴン(条第3類)1.00g、カッセキ(条第3類)1.50g、カンゾウ(第2類)1.00g、キキョウ(第3類)1.00g、ケイガイ(条第3類)0.60g、サンシシ(第3類)0.60g、シャクヤク(第3類)0.60g、ショウキョウ(第3類)0.15g、セッコウ(少条第3類)1.00g、センキュウ(条第3類)0.60g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.60g、ハッカ(第3類)0.60g、ビャクジュツ(条第3類)1.00g、ポウフウ(第2類)0.60g、マオウ(指定第2類)0.60g、硫酸ナトリウム(第3類)0.75g、レンギョウ(第2類)0.60g</p>	アナフィラキシー反応	軽快
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	不明
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	不明
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	不明
	肝機能異常	不明
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	不明
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	不明
	間質性肺疾患	軽快
	間質性肺疾患	回復
	間質性肺疾患	軽快
血小板数減少	回復	
多形紅斑	軽快	
腸閉塞	回復	
流産	不明	
膀胱の良性新生物	軽快	
<p>オウゴン(条第3類)1.0g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、キキョウ(第3類)1.0g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シャクヤク(第3類)0.6g、ショウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1.0g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビャクジュツ(条第3類)1.0g、ポウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	肝機能異常	軽快
	肝機能検査異常	回復
	憩室炎	回復

<p>オウゴン(第2類)1.2g、カッセキ(第2類)1.8g、カンゾウ(第2類)1.2g、キキョウ(第3類)1.2g、ケイガイ(条第3類)0.72g、サンシシ(第3類)0.72g、シヤクヤク(第3類)0.72g、シヨウキョウ(第3類)0.24g、セッコウ(少条第3類)1.2g、センキュウ(条第3類)0.72g、ダイオウ(第2類)0.9g、トウキ(第3類)0.72g、ハッカ(第3類)0.72g、ビヤクジュツ(条第3類)1.2g、ボウシヨウ(第3類)0.9g、ボウフウ(第2類)0.72g、マオウ(指定第2類)0.72g、レンギョウ(第2類)0.72g</p>	肝機能異常	回復
	肝障害	軽快
	肝障害	軽快
	肝障害	軽快
	肝障害	回復
	間質性肺疾患	不明
	間質性肺疾患	軽快
	間質性肺疾患	軽快
	好酸球性肺炎	軽快
	発疹	回復
	浮腫	回復
	膀胱炎	回復
膠原病	未回復	
<p>オウゴン(条第3類)1.0g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、キキョウ(第3類)1.0g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シヤクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1.0g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビヤクジュツ(条第3類)1.0g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	肝障害	軽快
	間質性肺疾患	軽快
<p>オウゴン(条第3類)1.0g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、キキョウ(第3類)1.0g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シヤクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1.0g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビヤクジュツ(条第3類)1.0g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	黄疸	軽快
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	軽快
	腸炎	軽快
<p>オウゴン(条第3類)1.0g、カッセキ(条第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、キキョウ(第3類)1.0g、ケイガイ(条第3類)0.6g、サンシシ(第3類)0.6g、シヤクヤク(第3類)0.6g、シヨウキョウ(第3類)0.2g、セッコウ(少条第3類)1.0g、センキュウ(条第3類)0.6g、ダイオウ(第2類)0.75g、トウキ(第3類)0.6g、ハッカ(第3類)0.6g、ビヤクジュツ(条第3類)1.0g、ボウフウ(第2類)0.6g、マオウ(指定第2類)0.6g、硫酸ナトリウム(第3類)0.375g、レンギョウ(第2類)0.6g</p>	咳嗽	回復
	肝障害	回復

注)副作用数を掲載しているため症例数と異なる場合がある。