

条件付き第2類生薬を含むため、半量処方の場合第3類となる漢方製剤

注1) 非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があった数を記載し、ラインリストを添付してある。

注2) 重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成22年度までの期間に、PMDAに報告があった数を記載し、症例票を添付してある。

紫: 指定2類、緑: 第2類、赤: 条件付2類、黒: 第3類、橙色: 区分不明

処方名	別名	成分・分量	報告のあった製剤数	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
3 胃風湯		当帰2.5-3、芍薬3、川芎2.5-3、人参3、白朮3、茯苓3-4、桂皮2-3、薑2-4	2 (参照 p3)	0	0	・製剤として第3類医薬品が存在する処方
6 茵陳五苓散		沢瀉4.5-6、茯苓3-4.5、猪苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3、茵陳蒿3-4	2 (参照 p4)	0	0	
47 帰脾湯		人参2-4、白朮2-4(蒼朮も可)、茯苓2-4、酸棗仁2-4、竜眼肉2-4、黄耆2-4、当帰2、遠志1-2、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜1-1.5	3 (参照 p5)	0	0	
61 桂枝加葛根湯		桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1.6-2、葛根3.2-6	3 (参照 p6)	0	0	
63 桂枝加芍薬生姜人参湯		桂皮2.4-4、大棗2.4-4、芍薬3.2-6、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5.5)、甘草1.6-2、人参2.4-4.5	0	0	0	・甘草の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
76 啓脾湯		人参3、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、蓮肉3、山薬3、山査子2、陳皮2、沢瀉2、大棗1、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、甘草1(大棗、生姜はなくても可)	0	0	0	
95 五苓散		沢瀉4-6、猪苓3-4.5、茯苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3	32 (参照 p7)	1 (参照 p20)	0	・製剤として第3類医薬品が存在する処方
109 酸棗仁湯		酸棗仁10-18、知母2-3、川芎2-3、茯苓2-5、甘草1	17 (参照 p9)	3 (参照 p20)	2 (参照 p22、参照 p27)	・製剤として第3類医薬品が存在する処方
117 四君子湯		人参3-4、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓4、甘草1-2、生姜0.5-1、大棗1-2	0	0	0	・甘草の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
148 四苓湯		沢瀉4、茯苓4、蒼朮4(白朮も可)、猪苓4	0	0	0	
155 参苓白朮散		人参1.5-3、山薬1.2-4、白朮1.5-4、茯苓1.5-4、薏苡仁0.8-8、扁豆1-4、蓮肉0.8-4、桔梗0.8-2.5、縮砂0.8-2、甘草0.8-2	3 (参照 p10)	0	0	・製剤として第3類医薬品が存在する処方 ・甘草の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
160 清暑益気湯		人参3-3.5、白朮3-3.5(蒼朮も可)、麦門冬3-3.5、当帰3、黄耆3、陳皮2-3、五味子1-2、黄柏1-2、甘草1-2	1 (参照 p11)	0	0	・製剤として第3類医薬品が存在する処方 ・甘草の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
169 銭氏白朮散		白朮4、茯苓4、葛根4、人参3、藿香1、木香1、甘草1	0	0	0	
179 沢瀉湯		沢瀉5-6、白朮2-3	0	0	0	

	処方名	別名	成分・分量	報告のあった 製剤数	非重篤な 副作用 症例数	重篤な 副作用 症例数	備考
191	猪苓湯		猪苓3-5、茯苓3-5、滑石3-5、沢瀉3-5、阿膠3-5	25 (参照 p12)	5 (参照 p20)	1 (参照 p34)	・製剤として第三類医薬品が存在する処方 ・猪苓、滑石の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
198	当帰散		当帰2-3、芍薬2-3、川芎2-3、黄芩2-3、白朮1-1.5(蒼朮も可)	0	0	0	・黄芩の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
201	当帰芍薬散		当帰3-3.9、川芎3、芍薬4-16、茯苓4-5、白朮4-5(蒼朮も可)、沢瀉4-12	40 (参照 p14)	6 (参照 p21)	0	・製剤として第三類医薬品が存在する処方 ・白朮、沢瀉の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
203	当帰芍薬散加人参		当帰3.5、沢瀉3.5、川芎3、芍薬4、茯苓3.5、白朮3(蒼朮も可)、人参1-2	0	0	0	
216	排膿湯		甘草1.5-3、桔梗1.5-5、生姜0.5-1(ヒネシヨウガを使用する場合1-3)、大棗2.5-6	1 (参照 p17)	0	0	・甘草の含有量により半量処方が第2類医薬品となる。
228	茯苓飲		茯苓2.4-5、白朮2.4-4(蒼朮も可)、人参2.4-3、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合3-4)、陳皮2.5-3、枳実1-2	1 (参照 p18)	0	0	・製剤として第三類医薬品が存在する処方
232	茯苓沢瀉湯		茯苓4-8、沢瀉2.4-4、白朮1.8-3(蒼朮も可)、桂皮1.2-2、生姜1-1.5(ヒネシヨウガを使用する場合2.4-4)、甘草1-1.5	3 (参照 p19)	0	0	

<胃風湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：当帰2.5-3、芍薬3、川芎2.5-3、人参3、白朮3、茯苓3-4、桂皮2-3、粟2-4

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
アワ(?)1g、ケイヒ(第3類)1g、シャクヤク(第3類)1.5g、 <u>センキュウ(条第3類)1.5g</u> 、トウキ(第3類)1.5g、ニンジン(第3類)1.5g、 <u>ビャクジュツ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリョウ(条第3類)2g</u>	第3類	0	0
アワ(?)1g、ケイヒ(第3類)1g、シャクヤク(第3類)1.5g、 <u>センキュウ(条第3類)1.5g</u> 、トウキ(第3類)1.5g、ニンジン(第3類)1.5g、 <u>ビャクジュツ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリョウ(条第3類)2g</u>	第3類	0	0

<茵蔯五苓散>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量:沢瀉4.5-6、茯苓3-4.5、猪苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3、茵蔯蒿3-4

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
インテンコウ(第2類)4.0g、ケイヒ(第3類)3.0g、ソウジュツ(第2類)4.5g、タクシャ(第2類)6.0g、チヨレイ(第2類)4.5g、ブクリヨウ(第2類)4.5g	第2類	0	0
インテンコウ(第2類)3.2g、ケイヒ(第3類)2.4g、タクシャ(第2類)4.8g、チヨレイ(第2類)3.6g、ピャクジュツ(第2類)3.6g、 ブクリヨウ(条第3類)3.6g	第2類	0	0

<帰脾湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量： 人参2-4、白朮2-4(蒼朮も可)、茯苓2-4、酸棗仁2-4、竜眼肉2-4、黄耆2-4、当帰2、遠志1-2、甘草1、木香1、大棗1-2、生姜1-1.5

② 配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
オウギ(第3類)2.4g、オンジ(第3類)1.6g、 カンゾウ(条第3類)0.8g 、サンソウニン(第3類)2.4g、ショウキョウ(第3類)0.32g、タイソウ(第3類)1.6g、トウキ(第3類)1.6g、ニンジン(第3類)2.4g、ビャクジュツ(第2類)2.4g、 フクリョウ(条第3類)2.4g 、モッコウ(第3類)0.8g、リュウガンニク(第3類)2.4g	第2類	0	0
オウギ(第3類)2.0g、オンジ(第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、サンソウニン(第3類)3.0g、ショウキョウ(第3類)1.0g、タイソウ(第3類)1.5g、トウキ(第3類)2.0g、ニンジン(第3類)3.0g、ビャクジュツ(第2類)3.0g、 フクリョウ(条第3類)3.0g 、モッコウ(第3類)1.0g、リュウガンニク(第3類)3.0g	第2類	0	0
オウギ(第3類)2.0g、オンジ(第3類)1.5g、カンゾウ(第2類)1.0g、サンソウニン(第3類)3.0g、ショウキョウ(第3類)0.5g、ソウジュツ(第2類)3.0g、タイソウ(第3類)1.5g、トウキ(第3類)2.0g、ニンジン(第3類)3.0g、 フクリョウ(条第3類)3.0g 、モッコウ(第3類)1.0g、リュウガンニク(第3類)3.0g	第2類	0	0

<桂枝加葛根湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：桂皮2.4-4、芍薬2.4-4、大棗2.4-4、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合2.4-4)、甘草1.6-2、葛根3.2-6

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
カッコン(条第3類)3.6g、カンゾウ(第2類)1.2g、ケイヒ(第3類)2.4g、シャクヤク(第3類)2.4g、ショウキョウ(第3類)0.6g、タイソウ(第3類)2.4g	第2類	0	0
カッコン(条第3類)3.6g、カンゾウ(第2類)1.2g、ケイヒ(第3類)2.4g、シャクヤク(第3類)2.4g、ショウキョウ(第3類)0.6g、タイソウ(第3類)2.4g	第2類	0	0
カッコン(条第3類)3.6g、カンゾウ(第2類)1.2g、ケイヒ(第3類)2.4g、シャクヤク(第3類)2.4g、ショウキョウ(第3類)0.6g、タイソウ(第3類)2.4g	第2類	0	0

<五苓散>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：沢瀉4-6、猪苓3-4.5、茯苓3-4.5、蒼朮3-4.5(白朮も可)、桂皮2-3

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
ケイヒ(第3類)3g、タクシャ(第2類)6g、チヨレイ(第2類)4.5g、ビャクジュツ(第2類)4.5g、ブクリョウ(第2類)4.5g	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)3g、タクシャ(第2類)6g、チヨレイ(第2類)4.5g、ビャクジュツ(第2類)4.5g、ブクリョウ(第2類)4.5g	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)3g、ソウジュツ(第2類)4.5g、タクシャ(第2類)6g、チヨレイ(第2類)4.5g、ブクリョウ(第2類)4.5g	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)3g、ソウジュツ(第2類)4.5g、タクシャ(第2類)6g、チヨレイ(第2類)4.5g、ブクリョウ(第2類)4.5g	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)3.0g、ソウジュツ(第2類)4.5g、タクシャ(第2類)6.0g、チヨレイ(第2類)4.5g、ブクリョウ(第2類)4.5g	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.4g、タクシャ(第2類)4.8g、チヨレイ(第2類)3.6g、ビャクジュツ(第2類)3.6g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.6g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.4g、ソウジュツ(第2類)3.6g、タクシャ(第2類)4.8g、チヨレイ(第2類)3.6g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.6g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.25g、ソウジュツ(第2類)3.375g、タクシャ(第2類)4.5g、チヨレイ(第2類)3.375g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.375g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.250g、ソウジュツ(第2類)3.375g、タクシャ(第2類)4.500g、チヨレイ(第2類)3.375g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.375g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.0g、タクシャ(第2類)5.0g、チヨレイ(第2類)3.0g、ビャクジュツ(第2類)3.0g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.0g、ソウジュツ(第2類)3.0g、タクシャ(第2類)4.0g、チヨレイ(第2類)3.0g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)2.0g、ソウジュツ(第2類)3.0g、タクシャ(第2類)4.0g、チヨレイ(第2類)3.0g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)1g、 <u>タクシャ(条第2類)2.5g、チヨレイ(条第2類)1.5g、ビャクジュツ(条第3類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1g、 <u>タクシャ(条第3類)2.5g、チヨレイ(条第3類)1.5g、ビャクジュツ(条第3類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.8g、ソウジュツ(第2類)2.7g、タクシャ(第2類)3.6g、チヨレイ(第2類)2.7g、 <u>ブクリョウ(条第3類)2.7g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)1.6g、タクシャ(第2類)4.0g、チヨレイ(第2類)2.4g、ビャクジュツ(第2類)2.4g、 <u>ブクリョウ(条第3類)2.4g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)1.67g、タクシャ(第2類)4g、チヨレイ(第2類)3g、ビャクジュツ(第2類)3g、 <u>ブクリョウ(条第3類)3g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)1.5g、タクシャ(第2類)3.75g、 <u>チヨレイ(条第3類)2.25g、ビャクジュツ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)1.5g、 <u>タクシャ(条第3類)3g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ビャクジュツ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.5g、 <u>タクシャ(条第3類)3g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ビャクジュツ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.5g、 <u>タクシャ(条第3類)3g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ビャクジュツ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	1	0
ケイヒ(第3類)1.5g、 <u>ソウジュツ(条第3類)2.25g、タクシャ(条第3類)3g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.50g、 <u>ソウジュツ(条第3類)2.25g、タクシャ(条第3類)3.00g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.50g、 <u>ソウジュツ(条第3類)2.25g、タクシャ(条第3類)3.00g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.50g、 <u>ソウジュツ(条第3類)2.25g、タクシャ(条第3類)3.00g、チヨレイ(条第3類)2.25g、ブクリョウ(条第3類)2.25g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.32g、 <u>ソウジュツ(条第3類)1.98g、タクシャ(第2類)3.30g、チヨレイ(条第3類)1.98g、ブクリョウ(条第3類)1.98g</u>	第2類	0	0
ケイヒ(第3類)1.24g、 <u>ソウジュツ(条第3類)1.78g、タクシャ(条第3類)1.96g、チヨレイ(条第3類)1.78g、ブクリョウ(条第3類)1.78g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)1.0g、 <u>タクシャ(条第3類)2.5g、チヨレイ(条第3類)1.5g、ビャクジュツ(条第3類)1.5g、ブクリョウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)0.72g、 <u>ソウジュツ(条第3類)1.14g、タクシャ(条第3類)1.86g、チヨレイ(条第3類)1.14g、ブクリョウ(条第3類)1.14g</u>	第3類	0	0

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
ケイヒ(第3類)0.562g、タクシヤ(条第3類)1.406g、チヨレイ(条第3類)0.844g、ピャクジュツ(条第3類)0.844g、ブクリヨウ(条第3類)0.844g	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)0.5625g、タクシヤ(条第3類)1.40625g、チヨレイ(条第3類)0.84375g、ピャクジュツ(条第3類)0.84375g、ブクリヨウ(条第3類)0.84375g	第3類	0	0
ケイヒ(第3類)0.281g、ソウジュツ(条第3類)0.422g、タクシヤ(条第3類)0.703g、チヨレイ(条第3類)0.422g、ブクリヨウ(条第3類)0.422g	第3類	0	0

<酸棗仁湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：酸棗仁10-18、知母2-3、川芎2-3、茯苓2-5、甘草1

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
カンゾウ(第2類)1g、サンソウニン(第3類)15g、センキュウ(第2類)3g、チモ(第3類)3g、ブクリョウ(第2類)5g	第2類	0	0
カンゾウ(第2類)1g、サンソウニン(第3類)15g、センキュウ(第2類)3g、チモ(第3類)3g、ブクリョウ(第2類)5g	第2類	0	0
カンゾウ(第2類)1g、サンソウニン(第3類)10g、センキュウ(第2類)3g、チモ(第3類)3g、ブクリョウ(第2類)5g	第2類	0	0
カンゾウ(第2類)1g、サンソウニン(第3類)10g、センキュウ(第2類)3g、チモ(第3類)3g、ブクリョウ(第2類)5g	第2類	0	0
カンゾウ(第2類)1.0g、サンソウニン(第3類)15.0g、センキュウ(第2類)3.0g、チモ(第3類)3.0g、ブクリョウ(第2類)5.0g	第2類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.8g、サンソウニン(第3類)8g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、チモ(第3類)2.4g、 ブクリョウ(条第3類)4g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.8g、サンソウニン(第3類)8g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、チモ(第3類)2.4g、 ブクリョウ(条第3類)4g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.8g、サンソウニン(第3類)8g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、チモ(第3類)2.4g、 ブクリョウ(条第3類)4g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.8g、サンソウニン(第3類)12.0g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、チモ(第3類)2.4g、 ブクリョウ(条第3類)4.0g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.85g、サンソウニン(第3類)12.7g、センキュウ(第2類)2.54g、チモ(第3類)2.54g、ブクリョウ(第2類)4.24g	第2類	1	0
カンゾウ(条第3類)0.75g、サンソウニン(第3類)7.5g、 センキュウ(条第3類)2.25g 、チモ(第3類)2.25g、 ブクリョウ(条第3類)3.75g	第3類	2	1
カンゾウ(条第3類)0.75g、サンソウニン(第3類)7.5g、 センキュウ(条第3類)2.25g 、チモ(第3類)2.25g、 ブクリョウ(条第3類)3.75g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.756g、サンソウニン(第3類)11.333g、 センキュウ(条第3類)2.267g 、チモ(第3類)2.267g、 ブクリョウ(条第3類)3.778g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.6g、サンソウニン(第3類)9.0g、 センキュウ(条第3類)1.8g 、チモ(第3類)1.8g、 ブクリョウ(条第3類)3.0g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.5g、サンソウニン(第3類)7.5g、 センキュウ(条第3類)1.5g 、チモ(第3類)1.5g、 ブクリョウ(条第3類)2.5g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.5g、サンソウニン(第3類)7.5g、 センキュウ(条第3類)1.5g 、チモ(第3類)1.5g、 ブクリョウ(条第3類)2.5g	第3類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.5g、サンソウニン(第3類)5g、 センキュウ(条第3類)1.5g 、チモ(第3類)1.5g、 ブクリョウ(条第3類)2.5g	第3類	0	0

<参苓白朮散>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量 : 人参1.5-3、山薬1.2-4、白朮1.5-4、茯苓1.5-4、薏苡仁0.8-8、扁豆1-4、蓮肉0.8-4、桔梗0.8-2.5、縮砂0.8-2、甘草0.8-2

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考)PMD Aへの報告件数
カンゾウ(第2類)1.6g、キキョウ(第3類)1.6g、サンヤク(第3類)3.2g、シユクシヤ(第3類)1.6g、ニンジン(第3類)2.4g、ビヤクジュツ(第2類)2.4g、 ブクリョウ(条第3類)3.2g 、ヘンズ(?)1.6g、ヨクイニン(第3類)4.8g、レンニク(第3類)3.2g	第2類	0	0
カンゾウ(第2類)1.2g、キキョウ(第3類)1.6g、サンヤク(第3類)2.4g、シユクシヤ(第3類)1.6g、ニンジン(第3類)2.4g、ビヤクジュツ(第2類)3.2g、 ブクリョウ(条第3類)3.2g 、ヘンズ(?)1.6g、ヨクイニン(第3類)4g、レンニク(第3類)1.6g	第2類	0	0
カンゾウ(条第3類)0.75g、キキョウ(第3類)1g、サンヤク(第3類)1.5g、シユクシヤ(第3類)1g、ニンジン(第3類)1.5g、 ビヤクジュツ(条第3類)2g 、 ブクリョウ(条第3類)2g 、ヘンズ(?)1g、ヨクイニン(第3類)2.5g、レンニク(第3類)1g	第3類	0	0

<清暑益気湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：人参3-3.5、白朮3-3.5(蒼朮も可)、麦門冬3-3.5、当帰3、黄耆3、陳皮2-3、五味子1-2、黄柏1-2、甘草1-2

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
オウギ(第3類)1.5g、 オウバク(条第3類)0.5g 、カンゾウ(条第3類)0.5g、ゴミシ(第3類)0.5g、チンピ(第3類)1g、トウキ(第3類)1.5g、ニンジン(第3類)1.5g、バクモンドウ(第3類)1.5g、 ピエクジュツ(条第3類)1.5g	第3類	0	0

<猪苓湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量成分(区分)分量：猪苓3-5、茯苓3-5、滑石3-5、沢瀉3-5、阿膠3-5

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
カッセキ(第2類)3g、ゼラチン(第3類)3g、 <u>タクシヤ(条第3類)3g</u> 、チヨレイ(第2類)3g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3g</u>	第2類	0	0
カッセキ(第2類)3g、ゼラチン(第3類)3g、 <u>タクシヤ(条第3類)3g</u> 、チヨレイ(第2類)3g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3g</u>	第2類	0	0
カッセキ(第2類)3.0g、ゼラチン(第3類)3.0g、 <u>タクシヤ(条第3類)3.0g</u> 、チヨレイ(第2類)3.0g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	0	0
カッセキ(第2類)2g、ゼラチン(第3類)2g、 <u>タクシヤ(条第3類)2g</u> 、チヨレイ(条第3類)2g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)2g</u>	第2類	0	0
カッセキ(第2類)2g、ゼラチン(第3類)2g、 <u>タクシヤ(条第3類)2g</u> 、チヨレイ(条第3類)2g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)2g</u>	第2類	0	0
カッセキ(第2類)2.4g、ゼラチン(第3類)2.4g、 <u>タクシヤ(条第3類)2.4g</u> 、チヨレイ(第2類)2.4g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)2.4g</u>	第2類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
<u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、ゼラチン(第3類)1.5g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第3類	0	0
アキヨウ(第3類)3g、カッセキ(第2類)3g、 <u>タクシヤ(条第3類)3g</u> 、チヨレイ(第2類)3g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3g</u>	第2類	0	0
アキヨウ(第3類)3g、カッセキ(第2類)3g、 <u>タクシヤ(条第3類)3g</u> 、チヨレイ(第2類)3g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3g</u>	第2類	0	0
アキヨウ(第3類)3.0g、カッセキ(第2類)3.0g、 <u>タクシヤ(条第3類)3.0g</u> 、チヨレイ(第2類)3.0g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	1	0
アキヨウ(第3類)3.0g、カッセキ(第2類)3.0g、 <u>タクシヤ(条第3類)3.0g</u> 、チヨレイ(第2類)3.0g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	0	0
アキヨウ(第3類)3.0g、カッセキ(第2類)3.0g、 <u>タクシヤ(条第3類)3.0g</u> 、チヨレイ(第2類)3.0g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)3.0g</u>	第2類	0	0
アキヨウ(第3類)2.4g、カッセキ(第2類)2.4g、 <u>タクシヤ(条第3類)2.4g</u> 、チヨレイ(第2類)2.4g、 <u>ブクリヨウ(条第3類)2.4g</u>	第2類	0	0
アキヨウ(第3類)1.8g、カッセキ(第2類)1.8g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.8g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.8g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.8g</u>	第2類	0	0
アキヨウ(第3類)1.8g、カッセキ(第2類)1.8g、 <u>タクシヤ(条第3類)1.8g</u> 、 <u>チヨレイ(条第3類)1.8g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.8g</u>	第2類	1	0
アキヨウ(第3類)1.5g、 <u>カッセキ(条第3類)1.5g</u> 、タクシヤ(第2類)1.5g、 <u>チヨレイ(条第3類)1.5g</u> 、 <u>ブクリヨウ(条第3類)1.5g</u>	第2類	0	0

アキヨウ(第3類)1.5g、カッセキ(条第3類)1.5g、タクシヤ(条第3類)1.5g、チヨレイ(条第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)1.5g	第3類	1	0
アキヨウ(第3類)1.5g、カッセキ(条第3類)1.5g、タクシヤ(条第3類)1.5g、チヨレイ(条第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)1.5g	第3類	2	0
アキヨウ(第3類)1.2g、カッセキ(条第3類)1.2g、タクシヤ(条第3類)1.2g、チヨレイ(条第3類)1.2g、ブクリヨウ(条第3類)1.2g	第3類	0	0

<当帰芍薬散>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：当帰3-3.9、川芎3、芍薬4-16、茯苓4-5、白朮4-5(蒼朮も可)、沢瀉4-12

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
シャクヤク(第3類)6g、センキュウ(第2類)3g、タクシャ(第2類)5g、トウキ(第3類)3g、ビャクジュツ(第2類)4g、 フクリョウ(条第3類)4g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)6g、センキュウ(第2類)3g、タクシャ(第2類)4g、トウキ(第3類)3g、ビャクジュツ(第2類)4g、 フクリョウ(条第3類)4g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)6g、センキュウ(第2類)3g、ソウジュツ(第2類)4g、タクシャ(第2類)4g、トウキ(第3類)3g、 フクリョウ(条第3類)4g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)4g、センキュウ(第2類)3g、タクシャ(第2類)4g、トウキ(第3類)3g、ビャクジュツ(第2類)4g、 フクリョウ(条第3類)4g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)4.0g、センキュウ(第2類)3.0g、タクシャ(第2類)4.0g、トウキ(第3類)3.0g、ビャクジュツ(第2類)4.0g、 フクリョウ(条第3類)4.0g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)4.0g、センキュウ(第2類)3.0g、タクシャ(第2類)4.0g、トウキ(第3類)3.0g、ビャクジュツ(第2類)4.0g、 フクリョウ(条第3類)4.0g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)4.0g、センキュウ(第2類)3.0g、タクシャ(第2類)4.0g、トウキ(第3類)3.0g、ビャクジュツ(第2類)4.0g、 フクリョウ(条第3類)4.0g	第2類	1	0
シャクヤク(第3類)4.0g、センキュウ(第2類)3.0g、ソウジュツ(第2類)4.0g、タクシャ(第2類)4.0g、トウキ(第3類)3.0g、 フクリョウ(条第3類)4.0g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)4.0g、センキュウ(第2類)3.0g、ソウジュツ(第2類)4.0g、タクシャ(第2類)4.0g、トウキ(第3類)3.0g、 フクリョウ(条第3類)4.0g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)4.0g、センキュウ(第2類)3.0g、タクシャ(第2類)4.0g、トウキ(第3類)3.0g、ビャクジュツ(第2類)4.0g、 フクリョウ(条第3類)4.0g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)3.3g、 センキュウ(条第3類)1.65g 、 ソウジュツ(条第3類)2.2g 、 タクシャ(条第3類)2.2g 、トウキ(第3類)1.65g、 フクリョウ(条第3類)2.2g	第3類	1	0
シャクヤク(第3類)3.2g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、タクシャ(第2類)3.2g、トウキ(第3類)2.4g、ビャクジュツ(第2類)3.2g、 フクリョウ(条第3類)3.2g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)3.2g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、タクシャ(第2類)3.2g、トウキ(第3類)2.4g、ビャクジュツ(第2類)3.2g、 フクリョウ(条第3類)3.2g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)3.2g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、タクシャ(第2類)3.2g、トウキ(第3類)2.4g、ビャクジュツ(第2類)3.2g、 フクリョウ(条第3類)3.2g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)3.2g、 センキュウ(条第3類)2.4g 、ソウジュツ(第2類)3.2g、タクシャ(第2類)3.2g、トウキ(第3類)2.4g、 フクリョウ(条第3類)3.2g	第2類	0	0
シャクヤク(第3類)3g、 センキュウ(条第3類)1.5g 、 タクシャ(条第3類)2g 、トウキ(第3類)1.5g、 ビャクジュツ(条第3類)2g 、 フクリョウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シャクヤク(第3類)3.0g、 センキュウ(条第3類)1.5g 、 タクシャ(条第3類)2.0g 、トウキ(第3類)1.5g、 ビャクジュツ(条第3類)2.0g 、 フクリョウ(条第3類)2.0g	第3類	0	0

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
シヤクヤク(第3類)3.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ビヤクジュツ(条第3類)2.0g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第3類	2	0
シヤクヤク(第3類)3.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2.0g、タクシャ(条第3類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ビヤクジュツ(条第3類)2g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ビヤクジュツ(条第3類)2g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ビヤクジュツ(条第3類)2g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ビヤクジュツ(条第3類)2g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ビヤクジュツ(条第3類)2g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2g、タクシャ(条第3類)2g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2.4g、センキュウ(条第3類)1.8g、タクシャ(条第3類)2.4g、トウキ(第3類)1.8g、ビヤクジュツ(第2類)2.4g、ブクリヨウ(条第3類)2.4g	第2類	0	0
シヤクヤク(第3類)2.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2.0g、タクシャ(第2類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第2類	2	0
シヤクヤク(第3類)2.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2.0g、タクシャ(第2類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第2類	0	0
シヤクヤク(第3類)2.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2.0g、タクシャ(条第3類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2.0g、タクシャ(条第3類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)2.0g、センキュウ(条第3類)1.5g、ソウジュツ(条第3類)2.0g、タクシャ(条第3類)2.0g、トウキ(第3類)1.5g、ブクリヨウ(条第3類)2.0g	第3類	0	0
シヤクヤク(第3類)1.96g、センキュウ(条第3類)1.48g、ソウジュツ(条第3類)1.96g、タクシャ(条第3類)1.96g、トウキ(第3類)1.48g、ブクリヨウ(条第3類)1.96g	第3類	0	0