

広島市原子爆弾被爆実態調査研究

原爆体験者等健康意識調査報告書

平成22年(2010年)5月

広島市

目 次

第1はじめ	1
1 調査の背景	1
2 調査の目的	1
3 研究会、研究班の設置	1
第2調査方法	1
1 構成	1
2 調査内容	1
(1) 基本調査(郵送による自記式質問紙調査)	1
① 対象者	2
② 調査期間	2
③ 調査項目	2
④ 回答状況	3
(2) 個別調査(面談による自記式質問紙の確認と構造化面接)	4
① 調査対象者(抽出方法)	4
② 依頼方法	4
③ 調査時期	4
④ 主な調査項目	5
⑤ 調査員	6
⑥ 面談会場	6
⑦ 面談者数(実績)	6
⑧ 個別調査(面談)時の倫理的配慮等	6
第3調査結果	7
1 解析の内容と対象	7
(1) 主な内容	7
(2) 情報の取扱い	7
① 既存情報との連結	7
② 原爆体験内容の区分	7
(3) 解析対象となる体験区分と対象者数	7
① 解析対象区分	7
② 区分の定義と解析対象者数	8
2 解析の方法と結果	8
(1) 心身の健康影響	8
① 基本属性要因について	8
② 精神健康機能、不安抑うつ症状等について	9
③ 影響を与えた要因について	10

④ 健康不安と差別・偏見体験の及ぼす影響について	13
⑤ 被爆群の体験内容別心身の健康影響について	14
⑥ 黒い雨関係群の心身の健康影響について	14
⑦ 原爆体験後の精神的成長度（変化）について	15
(2) PTSD 症状	16
(3) 身体的な症状	17
① 自覚的な急性症状の有無について	17
② 現在治療等を行っている病気について	18
(4) 黒い雨の体験状況	19
① 降雨時間の長さについて	20
② 時刻毎の降雨の状況について	21
③ 降雨の強さについて	22
④ 降雨の色について	22
3 考察	23
(1) 被爆者及び黒い雨体験者の心身の健康影響について	23
(2) 原爆体験後のポジティブな精神変化について	23
(3) PTSD 症状について	24
(4) 身体的な症状について	24
(5) 黒い雨の体験状況について	24
4 結論	25
(資料)	
1 委員名簿	30
2 調査研究の流れ	31
3 質問内容	
(1) 基本調査	32
(2) 個別調査	42
(3) 基本調査（転入群用）	55

第1 はじめに

1 調査の背景

広島市では、原爆被害の一層の実態解明を進めるため、平成13年度(2001年度)から有識者による広島市原子爆弾被爆実態調査研究会を組織し、平成14年度(2002年度)には、原爆にかかわる体験とこれに伴う心身の状況について把握するため、約1万人を対象としたアンケート調査を実施した。

その結果、何らかの原爆体験が、心身への影響を生じさせている可能性が示唆された。また、原爆体験の中で、被爆者^{*}以外においては、原爆投下直後に降った黒い雨を体験したことによる影響が、その他の体験によるものより大きいことなどが示唆された。

こうした中で、原爆体験による心身への健康影響について更なる実態解明を進めるため、平成19年度(2007年度)から有識者によるワーキング会議を開催して調査対象者や調査手法等について再検討を行い、翌年の平成20年度(2008年度)から「広島市原子爆弾被爆実態調査研究会」(以下「研究会」という。)を再組織し、同年6月から「原爆体験者等健康意識調査」を実施した。

* 被爆者とは、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」による被爆者健康手帳所持者及び健康診断受診者証所持者をいう。

2 調査の目的

原爆体験（原爆被爆及び黒い雨の体験）による心身への健康影響等を科学的に検証するとともに、実態に即した対応策の検討に資する。

3 研究会、研究班の設置

本調査を行うにあたり、専門的見地から必要な指導助言を得るために、平成20年(2008年)4月に、研究会を設置した。また、より専門的かつ詳細に検討していくため、本研究会の下に「健康意識調査研究班」(以下「研究班」という。)を設置した。

- ・構成員（委員） 資料1のとおり
- ・調査研究の流れ 資料2のとおり

第2 調査方法

1 構成

原爆体験者等健康意識調査は、郵送自記式質問紙調査による基本調査と、基本調査結果を検証するための個別（面談）調査により構成した。

また、個別調査は、PTSD診断や原爆体験後の心境の変化の検証等も目的として実施した。

2 調査内容

- (1) 基本調査（郵送による自記式質問紙調査）

① 対象者

- ア 平成 20 年（2008 年）6 月現在の広島市内又は県域の一部※に、昭和 20 年（1945 年）の原爆投下前から居住し続けている者※
 イ 平成 20 年（2008 年）6 月現在の広島市内又は県域の一部に、昭和 25 年（1950 年）1 月 1 日から昭和 27 年（1952 年）12 月 31 日までに転入し、居住し続けていると思われる者で、かつ、昭和 20 年（1945 年）8 月 5 日以前に生まれた被爆者以外の者
 ※1 県域の一部とは、広島市の周辺 2 町（現在の安芸太田町及び北広島町の一部）であり、広島県と 2 町が調査を実施した。
 ※2 住民基本台帳及び外国人登録原票の情報により把握できる者全員を対象とした。

② 調査期間

平成 20 年（2008 年）6 月 30 日～11 月 30 日
 （県域分は 8 月に発送）

③ 調査項目

- 1) 性別、生年月日
- 2) 生活状況（現在の居住状況、収入、介護度）
- 3) 原爆体験の有無、内容、その影響について
- 4) 原爆以外の戦争体験、その他の災害体験の有無
- 5) 黒い雨体験の有無、体験内容
- 6) 健康関連 QOL 尺度：SF-8™ (MOS Short-Form 8-Item Health Survey) ※
 SF-8™は日本語版は福原ら（2004）により作成・標準化されている。スコアリングでは、対応する項目の回答カテゴリー（5～6 件法）に日本一般住民から得られた SF-36™ 下位尺度得点の平均を割り当てる。そして、さらに各項目得点を重み付けして加算し、身体的健康状態を測定する「身体的サマリースコア (PCS-8)」と精神的健康状態を測定する「精神的サマリースコア (MCS-8)」を計算する。なお、重み付けの係数と定数は、2002 年日本一般住民のサマリースコア平均が 50 点となるようになっている。
- 7) PTSD 症状評価尺度：IES-R (Impact of Event Scale-Revised) ※
 IES-R は日本語版は飛鳥井ら（2002）により標準化されており、現在国内における各種の被災者・被害者調査で広く使用されている。心理検査として保険診療報酬適用を認可された。
- 8) 心理的ストレス評価尺度：K6 (Kessler's Psychological Distress Scale) ※
 K6 は精神疾患（うつ病性障害および不安障害）を効率よくスクリーニングするための尺度として、2002 年に米国の Kessler らが提案した 6 項目の自記式質問票。不安、抑うつ症状の頻度を 5 件法で求め、合計得点 6～30 点で症状評価を行う。別に 10 項目からなる K10 もある。K6/K10 は既存の 18 個のスクリーニング尺度から得られた質問文を候補とし、項目反応理論によって選ばれた項目である。従来の標準的な尺度よりも鋭敏とされ、北米やオーストラリアでの大規模疫学調査で使用されている。日本語版は、古川ら（2003）によって尺度特性を検証され、調査票として確立されている。
- 9) 現在治療中の病気
- 10) 面談調査への協力の可否(面談協力同意者のみ住所・氏名・連絡先を記入する選択記名式)
- 11) その他（自由記載欄）

全 16 問、A4 版 12 頁（転入者用は上記の抜粋版 10 問 A4 版 6 頁）

（評価尺度の説明）

※1 SF-8™：健康関連 QOL (Health Related Quality of Life: HRQOL) 尺度として広く使用されている SF-36™ と同じ 8 つの健康概念（①身体機能、②日常役割機能（身体）、③体の痛み、④全体的健康感、⑤活力、⑥社会生活機能、⑦日常役割機能（精神）、⑧心の健康）をより簡便に測定する尺度として開発された、8 項目の自記式質問票。国勢調査のような大規模調査や、サンプル数の大きい集団レベルでの比較調査において有用であることが実証されている。日本語版は福原ら（2004）により作成・標準化されている。スコアリングでは、対応する項目の回答カテゴリー（5～6 件法）に日本一般住民から得られた SF-36™ 下位尺度得点の平均を割り当てる。そして、さらに各項目得点を重み付けして加算し、身体的健康状態を測定する「身体的サマリースコア (PCS-8)」と精神的健康状態を測定する「精神的サマリースコア (MCS-8)」を計算する。なお、重み付けの係数と定数は、2002 年日本一般住民のサマリースコア平均が 50 点となるようになっている。

※2 IES-R : 1997 年に Weiss らが、PTSD（心的外傷後ストレス障害）関連症状を評価する目的で、旧版の改訂版として開発した自記式質問票。PTSD の 3 症状クラスターに対応して、侵入（再体験）症状 8 項目、回避症状 8 項目、過覚醒症状 6 項目の計 22 項目により構成される。各症状がどの程度の強さで存在したかの回答を求め、得点の合計により症状評価を行う。回答は 5 件法からなり、合計得点は 0～88 点である。日本語版は、飛鳥井ら（2002）により標準化されており、現在国内における各種の被災者・被害者調査で広く使用されている。心理検査として保険診療報酬適用を認可された。

※3 K6 : 精神疾患（うつ病性障害および不安障害）を効率よくスクリーニングするための尺度として、2002 年に米国の Kessler らが提案した 6 項目の自記式質問票。不安、抑うつ症状の頻度を 5 件法で求め、合計得点 6～30 点で症状評価を行う。別に 10 項目からなる K10 もある。K6/K10 は既存の 18 個のスクリーニング尺度から得られた質問文を候補とし、項目反応理論によって選ばれた項目である。従来の標準的な尺度よりも鋭敏とされ、北米やオーストラリアでの大規模疫学調査で使用されている。日本語版は、古川ら（2003）によって尺度特性を検証され、調査票として確立されている。

④ 回答状況

（単位：件）

区分	発送数	回答数	有効回答率	備考
広島市域分	35,377	26,469	74.8%	前回調査の有効回答率は 52.1%
広島県域分	1,237	678	54.8%	周辺 2 町分
計	36,614	27,147	74.1%	

（注）発送数には、あて先不明で返戻されたものは含まない。

回答数には、回答が白紙又は記載内容が不備の者、回答不能と電話連絡があった者は含まない。

回答率向上のため、広島市域分については、未回答者に対し葉書による協力依頼等を行った。

（内訳）

（単位：件）

区分	性	発送数	回答数	有効回答率	備考	
原爆投下前からの居住者	男	14,419	11,111	77.1%		
	女	17,179	12,669	73.7%		
	計	31,598	23,780	75.3%		
内訳	被爆者	男	8,203	6,666	81.3%	
		女	12,742	9,695	76.1%	
		計	20,945	16,361	78.1%	
被爆者以外	男	6,216	4,445	71.5%	被爆者健康手帳所持者及び健康診断受診者証所持者	
		女	4,437	2,974	67.0%	
		計	10,653	7,419	69.6%	
昭和 25～27 年転入者	男	1,791	1,175	65.6%		
		女	3,225	2,072	64.2%	上記 2 (1)①のイ
		不明	—	120	—	（全て被爆者以外）
		計	5,016	3,367	67.1%	
計	男	16,210	12,286	75.8%		
		女	20,404	14,741	72.2%	
		不明	—	120	—	
		計	36,614	27,147	74.1%	

(2) 個別調査（面談による自記式質問紙の確認と構造化面接）

① 調査対象者（抽出方法）

<被爆群^{※1}>

- ア 被爆者の基本調査回答者（日程的な都合により、平成20年（2008年）8月までに回収したもの）から、体験の記憶の明確さと調査協力の身体的負担を考慮し、年齢^{※2}71～82歳の者を抽出した。
イ アを性別、年齢（71～76歳、77～82歳）、IES-R得点（25点未満、25点以上）別に分類し、さらに被爆区分（直接被爆、入市被爆、要護・看護被爆）別に分類して計24区分における人数割合を算出した。（注：基本調査におけるIES-Rの合計得点中央値=25点）
ウ 面談に協力すると回答した者の中から、500人及び予備サンプルを、上記24区分ごとに各人数割合に従って無作為に抽出した。

なお、以下の者を抽出対象から除外した。

- ・要介護認定を受けている者
- ・収入が未回答の者
- ・基本調査の問8（原爆体験）について、9項目中4項目以上未回答の者
- ・基本調査の問10（原爆の影響）について、5項目中2項目以上未回答の者

<黒い雨関係群^{※3}（比較对照群^{※4}も含む）>

- ア 被爆者以外の基本調査回答者（平成20年（2008年）8月までに回収したもの）から、被爆群と同様に年齢^{※2}71～82歳の者を抽出した。

イ 以下の者を抽出対象から除外した。

- ・要介護認定を受けている者
- ・収入が未回答の者
- ・基本調査の問8（原爆体験）について、9項目中4項目以上未回答の者
- ・基本調査の問10（原爆の影響）について、5項目中2項目以上未回答の者
- ・基本調査の問15(1)（黒い雨体験の有無）で「わからない」と回答した者又は未回答の者
- ・基本調査の問15(2)（黒い雨体験曝露）で「わからない」と回答した者

ウ 指定地域群^{※5}及び未指定地域群^{※6}については、面談へ協力すると回答した者全員を対象とした。また、比較对照群については、面談へ協力すると回答した者が指定地域群、未指定地域群よりも多かったため、未指定地域群対象者と男女及び年齢層分布をマッチングさせた上で無作為に抽出した。

※1 被爆群、黒い雨関係群、比較对照群等の説明は、後述第3の1(3)の各区分の定義参照。

※2 年齢は全て基本調査実施時のもの

② 依頼方法

上記①の調査対象者に対し、文書により個別調査への協力を要請するとともに、電話でも協力を依頼し、日程、調査会場を調整した。この結果、個別調査の実施が確定した者に対し、正式な調査協力依頼書等を送付した。

③ 調査時期

平成20年（2008年）11月28日～平成21年（2009年）3月29日（83日間）

④ 主な調査項目

- 1) 氏名、性別、生年月日
- 2) 生活習慣（喫煙歴）、教育を受けた年数、身体的疾患の受療歴
- 3) 健康関連QOL尺度：SF-36^{※7} (MOS 36-Item Short-Form Health Survey)^{※8}
- 4) 精神健康調査：GHQ28 (The General Health Questionnaire 28)^{※9}
- 5) 外傷後成長尺度：PTGI (Posttraumatic Growth Inventory)^{※10}
- 6) 人格目録アズ：MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)K尺度^{※11}
- 7) 健康不安尺度^{※12}
- 8) 差別・偏見体験尺度^{※13}
- 9) 原爆体験の有無、その内容に関する質問
- 10) PTSD 臨床診断面接尺度：CAPS (Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-IV)^{※14}

（評価尺度の説明）

※1 SF-36^{※7}：基本調査の評価尺度参照

※2 GHQ28：英国の Goldberg によって 1970～74 年に開発された自記式質問票。神経症や抑うつの症状把握、評価及び発見にきわめて有効なスクリーニングテストとされる。日本語版は中川ら（1996）により作成・標準化されている。本調査で使用した 28 項目版は、4 因子（身体的症状、不安と不眠、社会的活動障害、うつ傾向）の代表項目（各 7 項目）から構成される。回答は 4 件法であるが 2 段階で探点し、合計点 0～28 点で症状評価する。

※3 PTGI：心的外傷体験後のポジティブな精神的変化を測定することを目的として、米国の Tedeschi と Calhoun (1996) が開発した 21 項目の自記式質問票。心的外傷体験後の精神的成长 (post-traumatic growth) に関する国内外の研究で広く使用されている。日本語版は、宅ら (2007) により標準化されている。英語版は 5 因子であるが、日本語版では 4 因子（他者との関係、新たな可能性、人間としての強さ、スピリチュアルな変容および人生に対する感謝）が抽出されている。今回の調査では Tedeschi, Calhoun および宅の了承を得て、原爆体験者用に質問文の字句を一部修正し、使用した。

※4 MMPI：米国ミネソタ大学の Hathaway と McKinley (1940) によって開発された人格目録質問票。今回の調査では、その中の妥当性尺度である K 尺度を、回答者の回答態度（防衛的傾向、率直さ、自己批判的傾向など）を参照するため使用した。K 尺度で高得点の人は、精神病理を否定して自分を好ましく見せようとしている可能性があり、逆に低得点の人は、精神病理を誇張してひどく好ましくないように見せようとしている可能性がある。日本語版は MMPI 新日本版研究会により 1993 年に再標準化されている。

※5 健康不安尺度：原爆放射線の影響がもたらす健康上の懸念の程度を測定する 5 項目、4 件法の尺度で、合計点 0～15 点で評価する。今回の個別調査実施にあたり独自に作成した。（具体的な質問内容については資料 3(2) 参照）

※6 差別・偏見体験尺度：原爆によるスティグマ体験がもたらす精神的苦痛の程度を測定する 5 項目、4 件法の尺度で、合計点 0～15 点で評価する。今回の個別調査実施にあたり独自に作成した。（具体的な質問内容については資料 3(2) 参照）

※7 CAPS：米国の国立 PTSD センターで 1995 年に開発された、PTSD 診断のための構造化臨床診断面接尺度。現在、最も精度の優れた診断尺度として、国内外での各種調査研究や治験などで広く使用

されている。DSM-IV 基準に則り、PTSD の 17 症状を含め A~F 基準を評価する。日本語版は、飛鳥井ら (2003) によって翻訳作成され、信頼性と妥当性を検証されている。心理検査として保険診療報酬適用を認可された。

⑤ 調査員

- ア 臨床心理士 (広島県臨床心理士会会員) 87 人が従事した (広島市、県の行政関係者は除く)。
イ 全員が事前に面談調査専門トレーニングを受講した。
・ トレーニング実施日 平成 20 年 (2008 年) 10 月 25 日、26 日
・ 講師 飛鳥井 望 (東京都精神医学総合研究所社会精神医学研究分野長) *現所長代行
加藤 寛 (兵庫県こころのケアセンター副センター長・研究部長)

⑥ 面談会場

広島市の公的施設 (各区の公民館、地域福祉センター) 計 34箇所で、個室又はパーテーションで区切った場所で面談を実施した。

⑦ 面談者数 (実績)

891 人 (面談を途中で中止し無効となったものは含まない。)

⑧ 個別調査 (面談) 時の倫理的配慮等

- ア 調査会場等において調査対象者のプライバシーや健康に最大限配慮するようにした。
イ 調査の目的、方法及び調査のもたらす個人への不利益等について調査対象者へ説明し、協力の自発性の原則を守り、調査対象者の明確な同意に基づいて調査を進めた。
ウ 調査対象者が途中で答えたくないと思った場合や体調が悪くなった場合のほか、調査員の判断により面談を休止又は中止することができる様にした。(会場には看護師を常駐させた。)
エ 原則として、調査対象者は一人で面談を受けるものとするが、調査対象者が付添者の同席を求め、調査員が必要であると判断した場合は、同席を許可した。
オ 面談後に心理的に不安定になる調査対象者のケアのために、調査期間終了後まで広島市の原爆被害対策部内に専用電話 (フリーダイヤル) を設置した。
なお、面談終了後に体調を悪くしたなどの報告はなかった。
カ 倫理面については、「広島大学疫学研究倫理審査委員会」及び「東京都精神医学総合研究所研究倫理委員会」の承認を受けて実施した。
キ 調査時に、調査対象者の同意を得た場合には録音し、調査員が講習内容に沿って調査を行っているか、トレーニングを行った講師が定期的に確認した。
また、調査員には、事前に調査対象者の原爆体験の内容について知らせないようにするなど、調査内容の均一化、信頼性向上に努めた。
ク 面談会場の入口には「調査会場」とのみ表示し、特別な案内表示は行わなかった。
(一人当たりの面談時間は概ね 1.5~2 時間 (最長 4 時間 40 分) であった。)

第3 調査結果

1 解析の内容と対象

(1) 主な内容

- ① 現在の心身の影響 (精神的健康状況、身体的健康状況、抑うつ症状、不安症状、差別・偏見体験、PTSD 症状) と、体験の内容別比較、その要因
- ② PTSD 現在有病率及び生涯有病率
- ③ 身体的影響 (自覚的な急性症状の有無、治療等を行っている病気の状況)
- ④ 原爆体験後の気持ちのポジティブな変化
- ⑤ 黒い雨の体験状況

(2) 情報の取扱い

① 既存情報との連絡

回答結果の正確性を期するため、市 (県) が保有する住民基本台帳情報、被爆者健康手帳情報、介護保険情報と連絡し、それらを解析に用いた。なお、その際は匿名化して作業を行った。

② 原爆体験内容の区分

直接被爆後に入市したように原爆体験が重複しているケースや、現在に至るまで被爆者健康手帳を申請・所持していないケースも考えられるが、今回の解析にあたっては調査時点における被爆者健康手帳、健康診断受診者証の有無や手帳に記載してある内容 (被爆区分) に基づいて整理を行った。

(3) 解析対象となる体験区分と対象者数

① 解析対象区分

ア 基本調査

- a 平成 20 年 (2008 年) 11 月末までに回収した調査票 (有効回答分) を対象とした。
- b 解析対象は、下表のとおり被爆群及び黒い雨関係群とした。

(理由) 当初、比較対照群として原爆非体験群を想定していたが、分類上、この群に含まれる者の回答内容には欠損項目が多く、群としての位置づけが曖昧になることから、これに代えて、黒い雨関係群のうちの非体験群を比較対照群とした。(より群間差が表れにくい設定となった。) また、転入群については、当初、原爆体験や原爆の影響が無い群 (原爆体験者全体の対照) として設定していたが、実際には合併前の周辺町からの転入者が多かったためか、回答者に何らかの原爆体験を持つと回答した者が多く、原爆体験が無い者としての代表性を欠くと考えられたため、解析対象から除外した。

- c 年齢は 71 歳以上の者とした。

(理由) 個別調査で、被爆当時の出来事を十分に語れるほどの記憶を有するものとして、71 歳以上を調査対象者の下限年齢としており、これに準じて基本調査の解析年齢を設定した。ただし、「現在治療等を行っている病気について」は現在の状況に関する解析であるため、71 歳未満についても頻度を確認した。

イ 個別調査

対象者の認知機能を評価するため、長谷川式簡易知能評価スケールより日付と曜日、3 語復唱と遅延再生、計算について検査した。合計 15 点満点のうち 7 点以下の者は認知機能に障害ありと判断し解析対象から除外した。(面談実施者 891 人のうち、解析対象から除外した者は 22 人であった。)

② 区分の定義と解析対象者数

体験区分	定義	(単位：人)	
		基本調査	個別調査
被爆群	① 直接被爆群 被爆者健康手帳所持者で、被爆区分が1号（直爆）の者	7,538 (11,301)	326
	② 入市被爆群 同被爆区分が2号（入市）の者	2,816 (3,438)	123
	③ 救護・看護被爆群 同被爆区分が3号（救護・看護被爆等）の者（ただし健康診断受診者証から切替の者は除く）	790 (879)	37
黒い雨関係群	④ 指定地域群（宇田大雨地域） 被爆者健康手帳所持者で、被爆区分が3号（健康診断受診者証からの切替の者のみ）又は健康診断受診者証所持者	470 (743)	63
	⑤ 未指定地域群（宇田小雨地域ほか） 被爆者健康手帳非所持者及び健康診断受診者証非所持者で、黒い雨にあっていると回答し、かつ体験場所も宇田大雨地域以外の宇田小雨及び周辺地域を回答している者	559 (845)	159
	⑥ 非体験群 → 比較対照群 被爆者健康手帳非所持者で黒い雨体験が無い者（その他の原爆体験やその影響について、いずれか一つでも「有り」と回答した者（本人又は家族に何らかの原爆体験又はその影響がある者））	2,200 (2,927)	161
原爆非体験群	被爆者健康手帳非所持者で黒い雨体験が無い者（その他の原爆体験やその影響について、全て「無い」、あるいは「わからない」と回答した者（本人又は家族に全く原爆体験が全く無い者））	(対象外)	
その他	上記区分に分類できないもの		
転入群	昭和25年から27年までに市内に転入してきた非被爆者		
計		14,373 (20,133)	869

(注) () 内は71歳未満を含む人数

個別調査対象者：被爆群=基本調査結果で被爆区分と性別、年齢、IES-R得点とで層化し無作為に抽出した者で、調査（面談）に協力すると回答した者。④指定地域群及び⑤未指定地域群=調査に協力すると回答した者全員。比較対照群=調査に協力すると回答した者が指定地域群、未指定地域群よりも多かったため、指定地域群より調査協力者の人数が多い未指定地域群の対象者と性別・年齢層分布をマッチングさせ無作為抽出した者。

2 解析の方法と結果

① 心身の健康影響

① 基本属性要因について

- 基本調査結果から、まず、心身の健康に関する各従属変数※1について、基本属性情報※2のみを説明変数とした重回帰分析※3を行い、それぞれの体験区分が比較対照群と比較して有意な違いがあるかを検討した。
- 次に、各従属変数について、基本属性情報、原爆体験、原爆体験の影響、原爆以外の戦争体験、その他の心的外傷体験を説明変数とした重回帰分析を行い、統計的にほぼ有意と認められる項目（p.

値<0.1）を選択した。（p値=統計的に差がないという仮説のもとで観測された程度の差を生じる確率）

さらに、各群によって、体験内容（直接的、間接的等）に差が想定されたことから、それに伴う体験項目による心身の健康に対する反応性の違いを調整するために、被爆区分と原爆体験、原爆体験の影響、原爆以外の戦争体験、その他の心的外傷体験それぞれについて、交互作用を説明変数に加えて検討した。（その他は単純集計による。）

※1 従属変数=PCS-8(SF-8™身体的サマリースコア)、MCS-8(SF-8™精神的サマリースコア)、IES-R (Total)、IES-R-I (再体験)、IES-R-A (回避)、IES-R-H (過覚醒)、K6のスコア

※2 基本属性情報=性別、年齢、現在の居住状況、介護度、世帯収入

※3 重回帰分析=従属変数が複数の説明変数によりどれくらい説明できるのかを定量的に分析する。

この結果、基本属性要因として調査対象者の性別、年齢、居住状況、介護度、世帯収入の違いが、全ての従属変数のスコアに有意な差をもたらしており、全般的に女性、高年齢、重い介護度、低い世帯収入が健康不良と有意に相関していた。

② 精神健康機能、不安抑うつ症状等について

基本属性要因を説明変数として投入し調整した上で、被爆群、黒い雨関係群（黒い雨関係群のうちの④指定地域群、⑤未指定地域群の2区分をいう。）、比較対照群（⑥非体験群をいう。）の尺度得点について重回帰分析を行ったところ、以下のような結果を得た（表1）。

ア 精神健康機能指標 (MCS-8) について

被爆群、黒い雨体験群のいずれも、比較対照群と比べて全て有意にスコアが低く、精神的健康状態に悪影響を受けていた。

イ 不安抑うつ指標 (K6) について

被爆群、黒い雨体験群のいずれも、比較対照群と比べて全て有意にスコアが高く、不安抑うつ傾向が大きかった。

ウ 心的外傷性ストレス症状指標 (IES-R) について

被爆群、黒い雨体験群のいずれも、比較対照群と比べて全て有意にスコアが高く、心的外傷性ストレス症状傾向が大きかった。

表1 原爆体験毎の比較対照群とのスコア差（精神健康尺度）

区 分	MCS-8		K6		IES-R		
	スコア差	p値	スコア差	p値	スコア差	p値	
被爆群	①直接被爆群	-2.415	<0.001	1.890	<0.001	12.941	<0.001
	②入市被爆群	-2.361	<0.001	1.675	<0.001	10.196	<0.001
	③救護・看護被爆群	-2.362	<0.001	1.622	<0.001	9.316	<0.001
黒い雨 体験群	④指定地域群	-1.526	0.002	1.393	<0.001	6.651	<0.001
	⑤未指定地域群	-2.356	<0.001	1.856	<0.001	9.262	<0.001
比較対照群	0.000		0.000		0.000		

(注) 上記は、性別、年齢、居住状況、要介護度、世帯収入の基本属性要因を調整し、解析したもの。

MCS-8は、マイナス値大であるほど精神的健康状態が低い。

K6は、プラス値大であるほど不安抑うつ傾向が大きい。

IES-R は、プラス値大であるほど心的外傷性ストレス症状傾向が大きい。

- 以上より、MCS-8、K6、IES-R の全てにおいて、被爆群、黒い雨体験群のいずれも、比較対照群との間に有意なスコア差が認められた。
- このうち、⑤未指定地域群は、MCS-8 についての差は被爆群に匹敵するほど大きく、K6 についての差は②入市被爆群及び③救護・看護被爆群よりも大きかった。また、IES-R についての差も③救護・看護被爆群に匹敵するほど大きかった。

③ 影響を与えた要因について

- これらスコアに関連する（影響を与えた）要因（体験等）を探るため、個別の原爆体験内容、原爆による健康不安や差別体験、原爆以外の戦争体験、その他の心的外傷体験を説明変数に加えて投入し、さらに原爆体験区分と具体的な体験の内容等との交互作用項も加えて調整を行った（表 2）。

表 2 要因（体験等）別のスコア差（精神健康尺度）

原爆体験等	MCS-8		K6		IES-R	
	スコア差	p 値	スコア差	p 値	スコア差	p 値
爆発による光・熱・風を感じた	0.812	0.050	—	n. s. *	—	n. s.
残骸・焼け跡・遺体などの光景を見た	—	n. s.	—	n. s.	1.010	0.017
ひどいやけどや大けがをした	—	n. s.	—	n. s.	1.223	0.005
やけどや大けがで苦しむ人を見た	—	n. s.	—	n. s.	—	n. s.
家族などを救えなかった	-0.929	<0.001	0.526	<0.001	3.896	<0.001
急性障害があった	-0.753	0.001	0.435	<0.001	3.365	<0.001
急性障害で苦しむ人を見た	—	n. s.	0.184	0.083	1.850	<0.001
爆発や急性障害で命を落とす危険を感じた	-0.859	<0.001	0.908	<0.001	5.617	<0.001
爆発や急性障害で家族などを失った	—	n. s.	0.354	<0.001	2.845	<0.001
戦後身近な人を放射線の病気で亡くした	—	n. s.	0.513	<0.001	2.570	<0.001
放射線が原因と思われる病気に罹ったことがある	-0.966	<0.001	0.439	<0.001	0.956	0.006
放射線の影響で病気になることがかなり不安	-2.411	<0.001	1.652	<0.001	6.865	<0.001
他の人からの差別や偏見などを強く感じた	-1.706	<0.001	1.802	<0.001	5.337	<0.001
原爆体験者であることはなるべく話さない	-0.916	<0.001	0.797	<0.001	5.630	<0.001
他の戦争体験での命の危険や大けが	-0.846	<0.001	0.797	<0.001	2.990	<0.001

戦争で家族を亡くした（原爆以外）	—	n. s.	0.486	<0.001	2.036	<0.001
災害・事故・暴力犯罪など他の心的外傷体験	-1.104	<0.001	1.328	<0.001	2.934	<0.001

(注) 上記は、基本属性要因を調整後、各体験内容等を説明変数として投入した上で、体験区分と要因との交互作用も調整した。

* n. s. = non-significant 「統計的に有意でない」

- 比較のために、原爆体験以外の「他の戦争体験での命の危険や大けが」や「災害・事故・暴力犯罪など他の心的外傷体験」といった要因についても確認し、よりスコア差が大きかったものを確認した。

ア MCS-8（精神健康機能指標）で関連が強かった要因は、「放射線による病気の不安」と「差別・偏見体験」であった。

イ K6 で関連が強かった要因は、同じく「放射線による病気の不安」と「差別・偏見体験」であった。

ウ IES-R で関連が強かった要因は、「家族などを救えなかった」「急性障害があった」「命の危険」など、心的外傷性ストレス症状尺度として予想されたように原爆をめぐる悲惨な状況と直接結びついた心的外傷体験も多く含まれたが、やはり「放射線による病気の不安」と「差別・偏見体験」及びこれにも影響すると思われる「原爆体験者であることを話さない」との関連が強かった。

- 一方、PCS-8（身体健康機能指標）では、被爆群（①直接被爆群、②入市被爆群）あるいは黒い雨体験群のいずれも、比較対照群と比べて差は僅少ながら有意に低いスコアであった（表 3）。
- また、基本属性要因を調整しても、被爆群は比較対照群に比べ、有意にスコアが低かった。

表 3 原爆体験区分ごとの対照群との尺度スコア差（身体健康尺度）

区分	PCS-8	
	スコア差	p 値
被爆群	①直接被爆群	-0.461 0.003
	②入市被爆群	-0.458 0.010
	③救護・看護被爆群	— n. s.
黒い雨体験群	④指定地域群	-0.669 0.037
	⑤未指定地域群	-0.515 0.082
比較対照群	0.000	

(注) 性別、年齢、居住状況、要介護度、世帯収入の基本属性要因を調整し解析した。

PCS-8 は、マイナス値大であるほど身体的健康状態が低い。

- なお、身体健康度の低さの説明変数として比較的関連していた体験内容は、「放射線が原因と思われる病気に罹った」「ひどいやけどや大けがをした」「急性障害があった」「放射線の影響による病気の不安」などであった。

以上の結果より、被爆群、黒い雨体験群のいずれも、比較対照群と比べてことに精神健康上の不良が、測定した 3 つの指標の全てにおいて示唆された。また、現在の精神健康不良と最も強い関連

を認めたのは「放射線による病気の不安」と「差別・偏見体験」であることが示唆された。

- 基本調査の単純集計の結果から、「放射線による病気の不安」に関する設問に対して「有る」と回答した者の割合は表4のとおりである。直接被爆者は半数以上の割合、また、それ以外の被爆群と黒い雨体験群も約4割であり、比較対照群に比べ高い数値であった。

表4 放射線による病気の不安 (単位: %)

区分		「ある」の割合
被爆群	①直接被爆群	56.0
	②入市被爆群	43.3
	③救護・看護被爆群	34.2
黒い雨 体験群	④指定地域群	38.5
	⑤未指定地域群	33.5
比較対照群		10.4

- 「差別・偏見体験」に関する設問に対して「有る」と回答した者の割合は表5のとおりであり、①直接被爆群が最も高い。

表5 差別・偏見を感じた (単位: %)

区分		「ある」の割合
被爆群	①直接被爆群	15.7
	②入市被爆群	10.2
	③救護・看護被爆群	6.2
黒い雨 体験群	④指定地域群	4.0
	⑤未指定地域群	5.7
比較対照群		2.5

- 「原爆体験を人に話さないようにしてきたか」の設問に対して「はい」と回答した者の割合は表6のとおりであり、被爆群については約3割の方が現在でも人に話していない状態にあった。

表6 原爆体験を人に話さないようにしてきた (単位: %)

区分		「はい」の割合
被爆群	①直接被爆群	34.7
	②入市被爆群	32.8
	③救護・看護被爆群	28.9
黒い雨 体験群	④指定地域群	23.4
	⑤未指定地域群	18.2
比較対照群		12.9

- 一方、個別調査の結果では、黒い雨を体験した者についての回答を見てみると、表7のとおりであり、「黒い雨を沢山浴びた（触れたり口にした）」と「黒い雨を少し浴びた（触れたり口にした）」を合わせると、④指定地域群、⑤未指定地域群でほとんどの者が黒い雨に直接曝露した体験を有していた。

表7 黒い雨体験の内容 (単位: %)

区分	被爆群	④指定地域群	⑤未指定地域群
黒い雨を沢山浴びた（触れたり口にした）	35.1	59.0	40.3
黒い雨を少し浴びた（触れたり口にした）	47.4	32.8	43.3
合 計	82.5	91.8	83.6

- さらに、黒い雨体験者全体で、黒い雨は放射線を含有していると考えている者の割合は75%以上であった。これらの数値は、被爆群に限らず、黒い雨体験群についても放射線による健康不安が増大していたことを裏付けるものであった（表8）。

表8 黒い雨と放射線の関係 (単位: %)

区分	「はい」の割合
全ての黒い雨は放射線が沢山含まれていたと思う	41.0
全ての黒い雨に放射線が少しあ含まれていたと思う	21.5
降った場所によっては沢山含まれていたり、あまり含まれていなかつたと思う	13.0
合 計	75.5

④ 健康不安と差別・偏見体験の及ぼす影響について

- 上記のように、基本調査の解析結果においては、凄惨な原爆体験がもたらした影響以上に、放射線曝露の影響による健康不安や社会的な差別・偏見の体験が、精神健康に悪影響をもたらしていたことが明らかとなつた。そこで、個別調査においては、本調査のために作成した健康不安尺度と差別・偏見体験尺度の得点とSF-36TM、GHQ28、CAPS各得点との関連を検討した。

ア 尺度の内部一貫性は、健康不安尺度（5項目）（ α 係数=.91）、差別・偏見体験尺度（5項目）（ α 係数=.78）とも優れていた。（ α 係数=個々の質問項目が、調べたいものとしての内的整合性を持つ質問項目群であるかを示す。）

イ 被爆群では、健康不安尺度得点はSF-36TMの全ての下位尺度得点（ $r=-.24$ ～-.45）と有意な負の相関がみられ、GHQ28（ $r=-.34$ ）、CAPS（ $r=-.37$ ）とは有意な正相関が認められた。したがって、健康不安が強いほどQOLは低く、精神健康度と心的外傷性ストレス症状は不良であった。一方、差別・偏見体験尺度得点も、SF-36TMの全ての下位尺度得点（ $r=-.23$ ～-.27）と有意な負の相関が示され、GHQ28（ $r=-.26$ ）、CAPS（ $r=-.39$ ）とは有意な正相関が認められた。また、健康不安尺度と差別・偏見体験尺度の間にも正相関（ $r=.57$ ）を認めた。

ウ ④指定地域群では、健康不安尺度得点はSF-36TMのPF（身体機能）（ $r=-.27$ ）、GH（全体的健康感）（ $r=-.44$ ）、SF（社会的機能）（ $r=-.35$ ）と有意な負の相関が認められ、GHQ28（ $r=.31$ ）、CAPS（ $r=.27$ ）とは有意な正相関が認められた。一方、差別・偏見体験尺度得点も、SF-36TMのSF（社会的機能）（ $r=-.32$ ）と有意な負の相関が示され、CAPS（ $r=.40$ ）とは有意な正相関が認められた。また、健康不安尺度と差別・偏見体験尺度の間にも正相関（ $r=.58$ ）を認めた。

エ ⑤未指定地域群では、健康不安尺度得点はSF-36TMの全ての下位尺度得点（ $r=-.38$ ～-.56）と有意な負の相関が示され、GHQ28（ $r=.50$ ）、CAPS（ $r=.32$ ）とは有意な正相関が認められた。一方、差別・偏見体験尺度得点も、SF-36TMの全ての下位尺度得点（ $r=-.23$ ～-.30）と有意な負の相関がみられており、GHQ28（ $r=.29$ ）、CAPS（ $r=.19$ ）とは有意な正相関が認められた。また健康不安尺度と差別・偏見体験尺度の間にも正相関（ $r=.58$ ）を認めた。

偏見体験尺度の間にも正相関 ($r=.61$) を認めた。

⑤ 被爆群の体験内容別心身の健康影響について

- 個別調査結果から、GHQ28、SF-36^m、CAPS 得点、健康不安尺度得点、差別・偏見体験尺度得点、PTGI 得点を用いて検討した。

(注) SF-36^mは得点が低いほど心身の健康状態が悪く、GHQ28、CAPS、健康不安、差別・偏見体験の各尺度は得点が高いほど不良な状態を示す。
PTGI は得点が高いほどポジティブな精神変化が大きい。

- 特に被爆群($N=486$)については、その体験内容により、爆心地から 2km 以内で被爆した直接被爆者(以下「近距離直爆群」という。)($n=134$)、同じく 2km 以遠の直接被爆者(以下「遠距離直爆群」という。)($n=192$)、入市及び救護・看護被爆者(以下「間接被爆群」という。)($n=160$)の 3 群に分け、それぞれの男女割合をカイ二乗検定により、年齢、教育年数及び各尺度得点を分散分析法(ANOVA=analysis of variance)により比較した。さらに、群間で差が見られた際、Tukey-Kramer の HSD 検定により、全てのペアの群間比較(有意水準 $p < .05$)を行った。その結果は次のとおりであった(Mは平均値を示す)。

- ア 男女比と教育年数には、3 群間で有意差を認めなかった。
- イ 年齢は、3 群間に有意差($F=6.47, p=.0017$)があり、近距離直爆群、遠距離直爆群、間接被爆群の順に高く、ペアごとの比較では、近距離直爆群は間接被爆群よりも有意に高かった(M: 近距離直爆群=77.60、遠距離直爆群=76.83、間接被爆群=76.30)。
- ウ GHQ28 得点は 3 群間に有意差を認めなかった(M: 近距離直爆群=8.00、遠距離直爆群=7.83、間接被爆群=7.87)。
- エ SF-36^mの 8 下位尺度得点(国民標準値に基づくスコアリング)では、PF(身体機能)、RP(日常役割機能・身体)、BP(体の痛み)、GH(全体的健康感)、VT(活力)、SF(社会生活機能)、RE(日常生活機能)、MH(心の健康)の全てにおいて 3 群間に有意差を認めなかった。
- オ CAPS 現在症状得点は 3 群間に有意差を認めなかった(M: 近距離直爆群=6.36、遠距離直爆群=5.02、間接被爆群=5.31)。
- カ 健康不安尺度得点は、3 群間に有意差($F=5.68, p=.0037$)があり、ペアごとの比較では近距離直爆群は間接被爆群よりも有意に高かった(M: 近距離直爆群=5.43、遠距離直爆群=4.48、間接被爆群=3.78)。
- キ 差別・偏見体験尺度得点は、3 群間に有意差($F=7.69, p=.0005$)があり、ペアごとの比較では、近距離直爆群は遠距離直爆群及び間接被爆群よりも有意に高かった(M: 近距離直爆群=3.56、遠距離直爆群=2.38、間接被爆群=2.26)。
- ク 回答の信頼性を検討するために実施した人格目録テスト(MMPI : Minnesota Multiphasic Personality Inventory)の K 尺度得点は 3 群間に有意差を認めなかった。

⑥ 黒い雨関係群の心身の健康影響について

- 個別調査結果から、黒い雨関係群の①指定地域群($n=63$)、⑤未指定地域群($n=159$)、比較対照群(非体験群)($n=161$)の男女割合をカイ二乗検定により、年齢、教育年数及び K 尺度得点を分散分

析法(ANOVA)により 3 群比較した。さらに、Tukey-Kramer の HSD 検定により、すべてのペアの群間比較(有意水準 $p < .05$)を行った。その結果は次のとおりであった。

- ア 男女比、年齢、教育年数について、3 群間で有意差を認めなかった。
- イ MMPI の K 尺度得点は、3 群間に有意差($F=4.87, p=.0082$)があり、ペアごとの比較では⑤未指定地域群は比較対照群よりも有意に低かった。また K 尺度得点は、SF-36 の各下位尺度と有意な正の相関($r=.20 \sim .37$)を、GHQ28 及び CAPS 現在症状得点と有意な負の相関($r=-.39$ 及び $r=-.22$)を示した。したがって自分を良く見せようしたり、逆に問題を誇張して悪く見せようとする回答態度が心身健康関連の尺度得点に与える影響を調整するため、回答者の K 尺度得点と、3 群区分と K 尺度得点との交互作用を共変量として投入した共分散分析法により 3 群間の各尺度得点を比較した。その結果、交互作用はいずれも有意でないことを確かめた上で、Tukey-Kramer の HSD 検定により、すべてのペアの群間比較(有意水準 $p < .05$)を行った。その結果は次のとおりであった。なお、以下に示す平均値(M)はいずれも調整済み平均値(最小二乗平均)である。
- ウ GHQ28 得点は、3 群間に有意差($F=4.84, p=.0084$)があり、ペアごとの比較では⑤未指定地域群が⑥比較対照群よりも有意に高かった(M: ④指定地域群=6.40、⑤未指定地域群=7.82、比較対照群=5.83)。
- エ SF-36 の 8 下位尺度得点(国民標準値に基づくスコアリング)は、PF(身体機能)($F=6.49, p=.0017$)、RP(日常役割機能)($F=7.15, p=.0009$)、BP(体の痛み)($F=9.42, p=.0001$)、GH(全体的健康感)($F=3.69, p=.0258$)、VT(活力)($F=6.32, p=.0020$)、SF(社会生活機能)($F=5.78, p=.0034$)、RE(日常生活機能)($F=5.72, p=.0036$)において 3 群間に有意差があり、ペアごとの比較では全てにおいて⑥未指定地域群が比較対照群よりも有意に低かった。また 5% 水準の有意差にはわずかにいたらなかったが、MH(心の健康)($F=2.77, p=.0641$)においても⑥未指定地域群が比較対照群よりも低かった。一方、④指定地域群は、BP(体の痛み)において⑥未指定地域群と同様に比較対照群よりも有意に低かったことを除いて、比較対照群との間に有意差を認めなかった。
- オ CAPS 現在症状得点は、3 群間に有意差($F=5.14, p=.0063$)があり、ペアごとの比較では⑤未指定地域群は比較対照群よりも有意に高かった(M: ④指定地域群=3.84、⑤未指定地域群=5.89、比較対照群=2.91)。
- カ 健康不安尺度得点は、3 群間に有意差($F=17.95, p < .0001$)があり、ペアごとの比較では④指定地域群と⑤未指定地域群はともに比較対照群よりも有意に高かった(M: ④指定地域群=2.84、⑤未指定地域群=3.45、比較対照群=1.24)。
- キ 差別・偏見体験尺度得点は 3 群間に有意差($F=11.98, p < .0001$)があり、ペアごとの比較では⑤未指定地域群は比較対照群よりも有意に高かったが、④指定地域群との間には有意差を認めなかった(M: ④指定地域群=1.23、⑤未指定地域群=1.88、比較対照群=0.87)。

⑦ 原爆体験後の精神的成長度(変化)について

個別調査結果から、PTGI(外傷後成長尺度)により原爆体験後のポジティブな精神変化について検討した。

- 本調査における PTGI(21 項目)の内部一貫性(α係数=.96)は優れていた。
- 被爆群及び黒い雨関係群とも、PTGI 得点は SF-36^m、GHQ28、CAPS、健康不安尺度、差別・偏見体験尺度のいずれとも、有意な相関関係を認めないか、有意であった場合も無相関であった。

- 被爆群のPTGI得点は、3群間に有意差 ($F=5.01$, $p=.0071$) があり、間接被爆群は近距離直爆群及び遠距離直爆群よりも有意に得点が高かった (M : 近距離直爆群=55.20、遠距離直爆群=55.91、間接被爆群=62.31)。原爆体験後のポジティブな精神変化は、間接被爆群に、より大きく認められた。
- 黒い雨関係群のPTGI得点(調整済み平均値)は3群間に有意差を認めなかった (M : ④指定地域群=55.96、⑤未指定地域群=59.27、比較対照群=54.78)。またPTGI得点とK尺度得点とに相関関係を認めなかった ($r=.05$)。

(2) PTSD 症状

- 個別調査のために特別の面接トレーニングを受けた臨床心理士(87名)が個別に実施した、構造化診断面接(PTSD臨床診断面接尺度: CAPS)の結果をもとにPTSD診断を行った。また、診断は調査時点における診断(現在診断)と原爆体験後に最も症状が強かったと思われる時点における診断(生涯診断)とに分けて行った。
- DSM-IVのPTSD診断基準では、B基準(再体験症状)5項目中1項目以上、C基準(回避・精神麻痺症状)7項目中3項目以上、D基準(過覚醒症状)5項目中2項目以上をすべて満たすことが必要とされる。

また、症状は1カ月以上持続し、症状のために臨床上強い苦痛、あるいは社会的、職業的又は他の重要な領域における機能の障害を引き起こしていることが条件とされる。その基準に従い下記のように分類した。

(注) PTSD: 上記のDSM-IV基準をすべて満たすもの

バーサルPTSD: B基準1項目以上で、C基準3項目以上又はD基準2項目以上のどちらかを満たすもの
ミックスPTSD: 上記以外で、B、C、D基準をそろって少なくとも各1項目は満たすもの

- その結果は次のとおりであった。被爆群(表9)黒い雨関係群(表10)

なお、被爆群(95%信頼区間)と黒い雨関係群では、個別調査対象者の抽出方法が異なっているため、単純な比較はできない。

表9 被爆群全体のPTSD診断割合(95%信頼区間)

区分	PTSD	バーサルPTSD	ミックスPTSD	(診断合計)	非PTSD
現在診断	1.2% (0.6-2.7%)	2.5% (1.4-4.3%)	1.6% (0.8-3.2%)	(5.4%) (3.7-7.7%)	94.7% (92.3-96.3%)
生涯診断	6.4% (4.5-8.9%)	10.1% (7.7-13.1%)	6.2% (4.4-8.7%)	(22.6%) (19.1-26.6%)	77.4% (73.4-80.9%)

(合計100.0%とならないのは少数点第2位以下を四捨五入したため)

- 表に示したように、PTSD診断に相当する割合は限られたものであり、ことに現在診断ではわずかとなっていた。ただし症状項目ごとの有病割合を見ると、被爆者には現在においても、フラッシュバック(侵入的想起)9.7%(7.0-12.3%)、苦痛な夢6.0%(3.9-8.1%)、きっかけにさらされた時の心理的苦痛8.4%(6.0-10.9%)、被爆体験に関する考え・感情・会話の回避9.3%(6.7-11.8%) (括弧内はいずれも95%信頼区間)といった割合で症状が認められた。

表10 黒い雨関係群のPTSD診断の人数と割合

(単位:人、%)

区分	PTSD	バーサルPTSD	ミックスPTSD	非PTSD	合計
現在診断	④指定地域群	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	62 (98.4) 63 (100.0)
	⑤未指定地域群	4 (2.5)	2 (1.3)	4 (2.5)	149 (93.7) 159 (100.0)
	比較対照群	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.2)	159 (98.8) 161 (100.0)
生涯診断	④指定地域群	6 (9.5)	2 (3.2)	0 (0.0)	55 (87.3) 63 (100.0)
	⑤未指定地域群	7 (4.4)	19 (12.0)	8 (5.0)	125 (78.6) 159 (100.0)
	比較対照群	1 (0.6)	8 (5.0)	6 (3.7)	146 (90.7) 161 (100.0)

(3) 身体的な症状

① 自覚的な急性症状の有無*について

- 基本調査結果から、自覚的な急性症状の有無について回答がある者で、71歳以上の者(心身の健康影響と同様に記憶の明確さを考慮)を解析対象とした。(解析対象者数10,926人)

* 自覚的な急性症状の有無 = 基本調査(アンケート)の質問項目である「原爆の直後からおよそ2か月間に出現する、発熱、鼻・歯茎・腸などからの出血、皮下出血、下痢、脱毛などで、1週間程度続いたもの」の自覚の有無をいう。これらの症状は当時の社会経済状況や栄養状況による可能性もあり、放射線との関連は必ずしも明らかではない。

- 性別原爆体験区分別急性症状の有無別頻度とその割合を表11に示す。

症状が有ったと回答した割合は、①直接被爆群で最も高く、男女ともに50%程度であった。

表11 性別原爆体験区分別自覚的急性症状の有無別頻度

(単位:人、%)

区分	男性			女性			
	症状有	症状無	計	症状有	症状無	計	
被爆群	①直接被爆群	1,053 (50.5)	1,034 (49.5)	2,087 (100.0)	1,799 (48.2)	1,932 (51.8)	3,731 (100.0)
	②入市被爆群	240 (26.7)	659 (73.3)	899 (100.0)	234 (20.6)	900 (79.4)	1,134 (100.0)
	③救護・看護被爆群	26 (19.3)	109 (80.7)	135 (100.0)	57 (12.6)	394 (87.4)	451 (100.0)
黒い雨体験群	④指定地域群	24 (15.1)	135 (84.9)	159 (100.0)	33 (16.6)	166 (83.4)	199 (100.0)
	⑤未指定地域群	20 (9.6)	188 (90.4)	208 (100.0)	24 (11.1)	192 (88.9)	216 (100.0)
比較対照群		36 (3.5)	979 (96.5)	1,015 (100.0)	17 (2.5)	675 (97.5)	692 (100.0)

- 次に、性別及び年齢の効果を調整した上で、自覚的な急性症状発生における被爆状況依存性を定量化するために、ロジスティック回帰分析を行った。自覚的急性症状の有無を目的変数とし、原爆体験内容をダミー変数で表現し、比較対照群を基準群として、性別と年齢の2変数を加えて説明変数とした。

- 被爆群、黒い雨体験群のいずれも、比較対照群に比べて有意に高かった。(図1)




図1 原爆体験区分別自覚的急性症状の有無に関するオッズ比
(Cat1=①直接被爆群、Cat2=②入市被爆群、Cat3=③救護・看護被爆群、
Cat4=④指定地域群、Cat5=⑤未指定地域群、Cat6=⑥比較对照群)

② 現在治療等を行っている病気について

- 基本調査結果から、「現在、病院で診断・検査や治療を受けている病気」として、表12の中でのいずれかに○の記載がある者全員を解析対象とした。(複数回答可) (解析対象者数 20,133人)

表12 病気の内訳

内 容	別表での表示
貧血など造血機能の病気	blood
肝硬変など肝臓の病気	liver
がん(悪性新生物)	cancer
脳出血、脳梗塞など脳の病気	brain
糖尿病、甲状腺機能低下症など内分泌腺の病気	internal
高血圧性心疾患、心臓病、心筋梗塞など心臓の病気	heart
腎炎、腎不全など腎臓の病気	kidney
白内障など目の病気	eye
肺気腫、慢性間質性肺炎など呼吸器の病気	respirat
変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など関節や骨の病気	bone
胃潰瘍、十二指腸潰瘍など胃や腸の病気	stomach
不眠、うつ、ストレスなどこころの病気	mental
婦人科の病気	women's
なし	Non

- その中で、調査時年齢が71歳未満群と71歳以上群とに分け、性年齢階級別の疾病別頻度を確認した。(別表13、14、15、16に性別年齢階級別疾病別の有病者頻度を示す。)
- この結果、「現在、病院で診断・検査や治療を受けている。」と回答した者の割合は、多くの病気に関して、①直接被爆群が最も高くなっていた。調査時年齢が71歳未満の場合、造血機能、関節や骨の病気が、また、調査時年齢が71歳以上の場合、造血機能及び脳の病気が、被爆群及び黒い雨体験群で比較対照群に比べて有意に高くなっていた。

- なお、がんについては、71歳未満の場合、①直接被爆群が比較対照群に比べて有意に高くなっていたり、71歳以上の場合は、①直接被爆群と②入市被爆群が比較対照群に比べて有意に高くなっていたが、それ以外では比較対照群との間に有意差はなかった。

※ 有病者=基本調査で「現在、病院で診断・検査や治療を受けている。」と回答した者をいう。

(4) 黒い雨の体験状況

- 解析する基本調査の調査項目は、黒い雨の体験(黒い雨を浴びたり、触れたり、口にしたり、見たりしたことをいう。)の有無、体験場所、雨の降り始めと降り止んだ時刻(時単位)、雨の強さ(強い、中程度、弱い)、雨の色(真っ黒、黒っぽい、茶色、透明に近い)についてである。
- 解析対象者は、黒い雨を体験したと回答した者のうち、その黒い雨を体験した場所(場所情報)を回答している者で、心身の健康影響と同様に記憶の明確さを考慮して、調査時の年齢が71歳以上の者に限定した。
- また、場所情報については、概ね旧町村単位(市内中心部については体験者が一定数集まる範囲)で統合し、その地域の代表地点(中心地の役場や学校)の位置情報(経度と緯度)に変換を行った。
なお、各図表には、目安として広島市の行政区域のほか、いわゆる宇田大雨、宇田小雨、増田小雨に相当する区域を既存資料から推測して挿入している。
- 表17は、黒い雨の降り始めと降り止んだ時刻に関する回答者の分布を示す。雨の降り始めと降り止んだ時刻が回答されているものをタイプA、降り始めの時刻のみが回答されている(降り止んだ時刻は不明)となっているものをタイプBとする。
- タイプAのデータについて、雨の降り始め時刻別降り終わり時刻別の2次元度数を表18に、タイプBのデータの降り止んだ時刻が不明の者の降り始めの時刻別回答者数を表19に示す。

表17 回答者数 (単位:人)

タイプ	降り始めの時刻(時)	降り止んだ時刻(時)	回答者数
A	8:00~16:00	8:00~18:00	1,084
B	8:00~16:00	不明	481
計	—	—	1,565

表18 タイプA: 黒い雨の降り始め・降り止んだ時刻別回答者数 (単位:人)

降り始めの時刻	降り止んだ時刻										計
	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	
8時	12	110	19	2	8	2	4	2	0	0	159
9時	0	25	147	52	26	13	4	9	2	2	0
10時	0	0	13	157	69	32	18	13	2	1	306
11時	0	0	0	9	62	28	22	10	7	2	0
12時	0	0	0	0	6	25	9	6	3	1	50
13時	0	0	0	0	0	1	24	12	4	3	1
14時	0	0	0	0	0	0	2	39	8	1	52
15時	0	0	0	0	0	0	0	2	25	13	2
16時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10
計	12	135	179	220	171	101	83	93	51	31	1,084

表19 タイプB；降り始めの時刻別回答者数

(単位：人)

降り始めの時刻									
8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	計
89	138	118	57	18	21	19	17	4	481

- 雨の降り始めの時刻と雨の降り終わりの時刻を図2に、また、雨の降り止んだ時刻と降り始めの時刻の差により求められた雨の降雨時間について、そのヒストグラムを図3に示す。




図2 黒い雨の降り始めの時刻のヒストグラム(左図)と降り止んだ時刻のヒストグラム(右図)





図3 黒い雨の降雨時間のヒストグラム

- 黒い雨は、午前10時辺りをピークに1時間～2時間程度降ったと回答した者が多かった。
- 黒い雨の体験者については、その場所毎に類別され、それぞれの調査項目について、回答結果について平均値や比率により要約を行った。さらに、その要約値に対して局所線形回帰モデルに基づいたノンパラメトリック回帰分析を適用し、黒い雨の各特性値に関する昭和20年(1945年)8月6日当時の時空間分布を推定した。

① 降雨時間の長さについて

- 黒い雨体験者で、黒い雨の降り始めと降り止んだ時間を回答した者(タイプAのみ)を解析対象として、降雨時間の地理分布を求めた。なお、解析精度を保持させるため、地区別回答者数が10人以上の場所のみを解析の対象とした。(解析対象者数 903人)
- 推定された降雨時間の長さの地理分布を図4に示す。(Tは時間)




(図4 推定された広島の黒い雨の降雨時間の地理分布)

- 降雨があった(降雨時間>0時間)と推定された地域は、いわゆる宇田雨域よりも広く、場所によっては増田雨域の外縁部に近似する結果が得られた。
- 比較的長い降雨時間が推定された地域は、宇田雨域の北西部及びその周辺部であり、その時間は1時間半から2時間程度と推定された。

② 時刻毎の降雨の状況について

- 黒い雨体験者で、黒い雨の降り始めについて回答した者(タイプA+B)を解析対象とした。解析精度を保持させるため、回答者数が10人以上の地区に限定した。(解析対象者数 1,413人)
- タイプBの降り止んだ時間を回答していない者については降雨時間を降り始めから1時間として解析した。(タイプAの中では、降雨時間は1時間と回答した者が最も多かったため。)
- 時刻毎の黒い雨の体験率(厳密には、条件付き体験率というべき)の地理分布を図5に示す。




(図5 推定された黒い雨の体験率の時間空間分布)

- 黒い雨は、午前9時頃に広島市西方近郊から降り始め、その後北西に拡がり 午前10時～11時頃に最も広い範囲で降り、その後縮小し、午後3時頃計付近で消失している。

③ 降雨の強さについて

- 黒い雨体験者で、雨の強さについて回答した者を解析対象とした。解析精度を保持させるため、回答者数が10人以上の地区に限定した。(解析対象者数 1,378人)
- 推定された降雨強度の最大値の地理分布を図6に示す。




(図6 推定された降雨の強さの分布図)

- 「強い雨で土砂降りに降った」と推定された地域(図6の強い雨の地域)は、宇田大雨地域のほぼ北半分を含み、さらにその北側(湯来町東部)にも分布している。

④ 降雨の色について

- 黒い雨体験者で、雨の色について回答した者を解析対象とした。解析精度を保持させるため、回答者数が10人以上の地区に限定した。(解析対象者数 1,248人)
- 雨の色についての地理分布を図7に示す。



(図7 推定された雨の色の分布図)

- 真っ黒い雨の降った領域は広島市の北西近郊(沼田地区、湯来町東部)と推定され、その範囲は「強い雨で土砂降りに降った」と推定された地域とほぼ一致している。

3 考察

本調査は、原爆体験者の心身の健康影響等を調査するため、基本調査とその結果を検証するための個別調査で構成している。また、個別調査は、PTSD診断や原爆体験後の心境の変化の検証等も目的として実施したものである。その結果については次のとおりである。

(1) 被爆者及び黒い雨体験者の心身の健康影響について

- 基本調査の結果、被爆群(直爆、入市、救護・看護の各被爆者)と黒い雨体験群(指定地域群、未指定地域群)のいずれも、比較対照群(非被爆者で黒い雨も体験していない群)に比べて、心身の健康面が不良であった。

個別調査の結果、被爆群においては、近距離被爆群、遠距離被爆群、間接被爆群(入市、救護・看護)の間では差はなかった。また、黒い雨体験群では、未指定地域群が全般的に心身健康面が不良であった。

- 基本調査の結果、心身健康面の不良にもっとも強く影響を与えていた要因は、「放射線による健康不安」と「差別・偏見体験」であった。

個別調査の結果においても、この二つの程度は、心身健康機能の不良と有意に関連していた。

また、健康不安尺度得点と差別・偏見尺度得点で単純に比較すると、いずれも近距離被爆群、遠距離被爆群、間接被爆群、黒い雨体験群、比較対照群の順にその程度が強いことが示唆された。

- 基本調査の結果、特に、「放射線による健康不安」は、現時点においても、被爆群、黒い雨体験群のそれぞれ4～5割もが有しており、比較対照群と比べて、明らかに高い割合であった。

- 基本調査の結果、黒い雨体験者全体の8割以上が直接曝露した体験を有していた。また、個別調査の結果では、黒い雨体験者の75.5%が、黒い雨には放射線を含有していたと認識していた。これらの傾向については、黒い雨体験群の指定地域群と未指定地域群との間で差は認められなかつた。

- 個別調査の結果、黒い雨の未指定地域群が比較対照群と比べて心身健康面、心的外傷性ストレス状況のいずれも不良であった。また、不良の程度は、被爆群と四段するほど大きいことがうかがわれた。

- また、黒い雨の未指定地域群の健康不安は、黒い雨の指定地域群、比較対照群よりも高く、間接被爆群データに近いものであった。未指定地域群においては、健康不安のために心身健康面が不良な結果となったことが示唆された。

黒い雨の未指定地域群については、今まで黒い雨の実態やその健康影響が十分に解明されていない中で、健康不安を増大させていた可能性がある。

- 被爆者や黒い雨体験者が高齢化する中で、その健康不安はさらに大きくなることが予想される。原爆体験者の今後の健康不安への対処が重要となることが示唆されているものと考えられる。

(2) 原爆体験後のポジティブな精神変化について

原爆体験後のポジティブな精神変化は、現在の心身健康面との関連を認めなかつた。ただし、PTGI(外傷後成長尺度)得点は直爆群よりも間接被爆群で有意に高く、一方比較対照群ではもっとも低くなつており、いわゆる逆U字型の傾向が示唆された。つまり、原爆体験後のポジティブな精神変化は、被爆体

験が強度と軽度の場合に比べ、中程度の場合に最も大きく認めることができた。

(3) PTSD症状について

① 被爆後 63 年が経過した時点での被爆者の PTSD の生涯有病率は 5~9% であり、閾値下 PTSD (パーシャル+ミニマム) まで含めた生涯有病率は 19~27% であった。

一方、調査時点における PTSD 有病率は 1~3% であり、閾値下 PTSD まで含めた有病率は 4~8% であった。ただし症状項目ごとの有病割合でみると、「フラッシュバック」と「考え方・感情・会話の回遊」をそれぞれ 7~12% に認めるなど、現在においても被爆体験のトラウマ記憶は影響をもたらしていた。

なお、個別調査回答者の被爆区分の割合は直爆群 67%、入市群 25%、救護看護群 8% であったが、これは広島市在住被爆者全体（2008 年 3 月末現在）の被爆区分割合である直爆群 63%、入市群 26%、救護看護群 11% にはほぼ見合っていた。

一方、個別調査回答者の性別割合は男性 51%、女性 49% であったが、広島市在住被爆者全体での性別割合は男性 39%、女性 61% であり性比に差が認められた。これは被爆者全体に比べて、基本調査回答者の年齢 71 歳~82 歳の男性割合がやや高かったことと、調査協力率も男性がやや高かったことによると思われた。しかしながら今回調査での PTSD 診断割合は男女でほぼ等しかったため、性比の差による結果の補正は不要と考えられた。また仮に米国での疫学研究知見のように女性の PTSD 有病率が男性の 2 倍程度であった場合でも、性比の差の補正により上記の推定有病率は 0.1~0.2% 上昇する程度であり、結果の数値にはほぼ変わりはない。

② 一般に、PTSD 有病率は個別の暴力犯罪被害と比べ災害や事故では低い傾向がある。わが国でのこれまでの研究では、阪神淡路大震災（44 カ月後）の全壊・全焼被災者群で 9.3%、救命救急センターに収容された重症交通事故患者群（6 カ月後）で 8.5% と報告されている。また、米国同時多発テロ事件後のマンハッタン地域住民の無作為抽出電話調査では、PTSD が疑われた者の割合（事件後 6 カ月間）は、直接まきこまれた者（現場にいた、受傷、死別、救助活動従事、失職等）では 14.7% であったが、全体では 7.4% であった。したがって被爆者の PTSD 生涯有病率は、それらの数値に概ね近いものであった。

被爆体験の悲惨さは、大規模災害や重度交通事故の惨状を大きく上回るものであったとはいえ、面談時に多くの調査回答者が語ったように、直後に訪れた終戦の解放感などが心の回復を促す方向に作用した可能性が考えられる。

いずれにしても本調査の対象者は、戦後 63 年間を生き抜いてきた被爆者であり、すでに他界した被爆者ではより PTSD 有病率が高かった可能性がある。

なお、黒い雨関係群にも PTSD 症状を有した者がいたが、診断がついた者の面談調査記録をみると、黒い雨を体験したことによる心理的な不安だけでなく、肉親が悲惨な原爆体験を有していたことや、避難してきた多くの被災者を目撃したことなどが強烈な記憶として残っており、それがトラウマ体験として PTSD 症状の原因となっていた。

(4) 身体的な症状について

今回の調査で、被爆者及び黒い雨体験者において、多くの者が自覚的な急性症状を有しており、また、現在においても病院で治療等を受けている状況が明らかになった。高齢化が進む中で、治療等を受ける割合は今後も大きくなっていくことが予想される。

(5) 黒い雨の体験状況について

① 本解析は、「黒い雨を体験した」という回答に基づいており、その体験した時刻を無視すると、黒い雨の体験率は 100% となる。そこで、原爆投下当日の午前 8 時から午後 4 時までの 8 時間を 1 時間おきに分割し、各時刻での「黒い雨の体験率」を求めた。この結果は、黒い雨の降雨域の地理分布の時間変化を概観するのにはよいが、黒い雨の体験率の値そのものが高い精度で推定されていることを保証するものではない。

統計解析の理念からすると、黒い雨の非体験者も含めた無作為抽出による回答に基づく体験率を用いるべきであり、さらに、被爆当日における回答者の時刻毎の所在地情報も必要であるが、現実にはそうした情報を入手することは不可能であるという事情がある。よって、今回の解析対象は、「どこかの時点で黒い雨を体験した」という人から得られたという条件付きのものであることに留意する必要がある。

② こうした限られた情報を基にした黒い雨の降雨域の推定にあたっては、降雨時間に焦点を当て、補足的に降雨強度及び雨の色などにより解釈を行った。黒い雨の降雨時間については、黒い雨の体験者にとっても降り終わりの時刻が降り始めの時刻と一致する場合（単位を「時」としているため、この状況は生じうる）、降雨時間の長さは 0 時間となり、黒い雨非体験者にとっての黒い雨の降雨時間（必然的に、それは 0 時間である）と同じ値となる。雨域と雨域外との境界付近では、降雨時間は 0 時間に近い値になっているはずなので、この基本調査において黒い雨の雨域を推定するには、その降雨時間の推定値に基づくことが妥当と考えられる。

③ その結果、黒い雨は、従来から言われていた降雨地域（宇田雨域）よりも広範囲に降り、現在の広島市域の東側、北東側を除くほぼ全域と周辺部で降った可能性が示唆された。また、黒い雨が降った時間の長さ、時間帯、色などについては、地域によって異なっている可能性が示唆された。

4 結論

原爆体験者は、今なお心身の健康面が不良であり、「放射線による健康不安」がその重要な要因の一つであることが明らかになった。今後、原爆体験者の高齢化が進む中で、健康不安がさらに大きくなることが予想される。

また、被爆後 63 年という長期間が経過した今日においても、被爆者の 1~3% が被爆による PTSD（閾値下 PTSD まで含めた有病率は 4~8%）に相当する実態が初めて明らかになった。

原爆体験者の健康不安等に対処するためには、健康診断の受診率向上や、相談事業の充実などの具体的な対応策の検討が必要と考えられる。

未指定地域の黒い雨体験者は、心身健康面が被爆者に匹敵するほど不良であった。また、今回の基本調査で、黒い雨は従来言われていた範囲よりも広く、現在の広島市域の東側、北東側を除くほぼ全域と周辺部で降った可能性が示唆された。

これまで黒い雨等に含まれる放射性降下物の実態解明が十分に行われていない中で、何らの対応策もとられていないかったことなどが未指定地域の黒い雨体験者の健康不安を増大させていた可能性がある。

未指定地域の黒い雨体験者についても、健康診断の実施などの対応策を検討することが必要と考える。

※詳細なデータ等は資料編に掲載

(別表)

表13 性別年齢階級別疾病別有病者頻度(調査時年齢71歳未満)

(単位:人、%)

性別	年齢	blood	liver	cancer	brain	internal	heart	kidney	eye	respirat	bone	stomach	mental	women's	non	対象者数
男性	62-64	33 (3.5)	72 (7.6)	60 (6.3)	50 (5.3)	197 (20.8)	278 (29.4)	31 (3.3)	184 (19.4)	45 (4.8)	163 (17.2)	105 (11.1)	78 (8.2)	0 (0.0)	174 (18.4)	947 (100.0)
	65-70	124 (4.5)	249 (9.1)	210 (7.7)	204 (7.5)	616 (22.5)	975 (35.6)	125 (4.6)	691 (25.3)	165 (6.0)	575 (21.0)	363 (13.3)	289 (10.6)	0 (0.0)	370 (13.5)	2,736 (100.0)
	計	157 (4.3)	321 (8.7)	270 (7.3)	254 (6.9)	813 (22.1)	1,253 (34.0)	156 (4.2)	875 (23.8)	210 (5.7)	738 (20.0)	468 (12.7)	367 (10.0)	0 (0.0)	544 (14.8)	3,683 (100.0)
女性	62-64	57 (6.8)	47 (5.6)	61 (7.3)	21 (2.5)	162 (19.4)	204 (24.4)	16 (1.9)	249 (29.7)	26 (3.1)	236 (28.2)	73 (8.7)	108 (12.9)	40 (4.8)	121 (14.5)	837 (100.0)
	65-70	132 (5.4)	143 (5.8)	140 (5.7)	108 (4.4)	451 (18.4)	747 (30.5)	60 (2.4)	943 (38.5)	88 (3.6)	875 (35.7)	212 (8.7)	403 (16.5)	92 (3.8)	233 (9.5)	2,449 (100.0)
	計	189 (5.8)	190 (5.8)	201 (6.1)	129 (3.9)	613 (18.7)	951 (28.9)	76 (2.3)	1,192 (36.3)	114 (3.5)	1,111 (33.8)	285 (8.7)	511 (15.6)	132 (4.0)	354 (10.8)	3,286 (100.0)

表14 性別年齢階級別疾病別有病者頻度(調査時年齢71歳以上)

(単位:人、%)

性別	年齢	blood	liver	cancer	brain	internal	heart	kidney	eye	respirat	bone	stomach	mental	women's	non	対象者数
男性	71-79	319 (7.1)	366 (8.2)	496 (11.1)	535 (11.9)	1,127 (25.1)	1,803 (40.2)	262 (5.8)	1,580 (35.2)	419 (9.3)	1,066 (23.8)	659 (14.7)	527 (11.8)	0 (0.0)	342 (7.6)	4,484 (100.0)
	80-89	205 (8.0)	149 (5.8)	269 (10.6)	382 (15.0)	479 (18.8)	977 (38.3)	192 (7.5)	985 (38.6)	294 (11.5)	575 (22.5)	317 (12.4)	271 (10.6)	0 (0.0)	171 (6.7)	2,554 (100.0)
	90-99	43 (11.4)	12 (3.2)	26 (6.9)	45 (11.9)	50 (13.2)	142 (37.6)	35 (9.3)	144 (38.1)	44 (11.6)	82 (21.7)	45 (11.9)	47 (12.4)	0 (0.0)	36 (9.5)	378 (100.0)
	100+	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (33.3)	1 (8.3)	6 (50.0)	0 (0.0)	5 (41.7)	0 (0.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	1 (8.3)	12 (100.0)
	計	567 (7.6)	527 (7.1)	791 (10.6)	962 (13.0)	1,656 (22.3)	2,926 (39.4)	490 (6.6)	2,715 (36.6)	757 (10.2)	1,728 (23.3)	1,021 (13.7)	847 (11.4)	0 (0.0)	550 (7.4)	7,428 (100.0)
女性	71-79	323 (8.5)	276 (7.3)	256 (6.8)	286 (7.6)	842 (22.3)	1,452 (38.4)	171 (4.5)	1,895 (50.1)	157 (4.2)	1,731 (45.8)	449 (11.9)	766 (20.3)	147 (3.9)	192 (5.1)	3,780 (100.0)
	80-89	439 (10.8)	195 (4.8)	206 (5.1)	393 (9.7)	722 (17.8)	1,771 (43.7)	218 (5.4)	2,073 (51.1)	209 (5.2)	1,904 (46.9)	391 (9.6)	734 (18.1)	88 (2.2)	172 (4.2)	4,056 (100.0)
	90-99	173 (12.0)	43 (3.0)	51 (3.5)	141 (9.8)	159 (11.0)	631 (43.7)	93 (6.4)	595 (41.2)	75 (5.2)	579 (40.1)	100 (6.9)	208 (14.4)	23 (1.6)	98 (6.8)	1,445 (100.0)
	100+	18 (17.6)	1 (1.0)	5 (4.9)	7 (6.9)	9 (8.8)	43 (42.2)	7 (6.9)	39 (38.2)	6 (5.9)	34 (33.3)	7 (6.9)	13 (12.7)	1 (1.0)	11 (10.8)	102 (100.0)
	計	953 (10.2)	515 (5.5)	518 (5.5)	827 (8.8)	1,732 (18.5)	3,897 (41.5)	489 (5.2)	4,602 (49.0)	447 (4.8)	4,248 (45.3)	947 (10.1)	1,721 (18.3)	259 (2.8)	473 (5.0)	9,383 (100.0)

表 15 性別被爆区分別疾病別有病者頻度（調査時年齢 71 歳未満）

(単位：人、%)

性別	区分	blood	liver	cancer	brain	internal	heart	kidney	eye	respirat	bone	stomach	mental	women's	non	対象者数
男性	①直接被爆群	84 (4.6)	187 (10.3)	147 (8.1)	116 (6.4)	446 (24.6)	707 (39.0)	77 (4.2)	585 (32.2)	119 (6.6)	466 (25.7)	250 (13.8)	208 (11.5)	0 (0.0)	159 (8.8)	1,814 (100.0)
	②入市被爆群	12 (4.1)	22 (7.6)	25 (8.6)	29 (10.0)	74 (25.5)	99 (34.1)	17 (5.9)	83 (28.6)	19 (6.6)	64 (22.1)	40 (13.8)	39 (13.4)	0 (0.0)	24 (8.3)	290 (100.0)
	③救護・看護被爆群	3 (6.5)	6 (13.0)	3 (6.5)	1 (2.2)	9 (19.6)	12 (26.1)	1 (2.2)	9 (19.6)	2 (4.3)	14 (30.4)	4 (8.7)	2 (4.3)	0 (0.0)	3 (6.5)	46 (100.0)
	④黒い雨・指定地域群	12 (6.3)	20 (10.4)	16 (8.3)	15 (7.8)	45 (23.4)	63 (32.8)	11 (5.7)	29 (15.1)	19 (9.9)	63 (32.8)	32 (16.7)	17 (8.9)	0 (0.0)	14 (7.3)	192 (100.0)
	⑤黒い雨・未指定地域群	11 (5.8)	16 (8.4)	13 (6.8)	16 (8.4)	38 (19.9)	62 (32.5)	7 (3.7)	34 (17.8)	9 (4.7)	31 (16.2)	30 (15.7)	18 (9.4)	0 (0.0)	36 (18.8)	191 (100.0)
	⑥比較对照群	9 (2.1)	27 (6.3)	25 (5.8)	27 (6.3)	82 (19.1)	132 (30.8)	12 (2.8)	45 (10.5)	17 (4.0)	41 (9.6)	36 (8.4)	27 (6.3)	0 (0.0)	115 (26.8)	429 (100.0)
女性	①直接被爆群	138 (7.1)	134 (6.9)	136 (7.0)	79 (4.1)	402 (20.6)	579 (29.7)	43 (2.2)	825 (42.3)	75 (3.8)	734 (37.7)	185 (9.5)	343 (17.6)	343 (17.6)	110 (5.6)	1,949 (100.0)
	②入市被爆群	19 (5.7)	15 (4.5)	14 (4.2)	12 (3.6)	72 (21.7)	117 (35.2)	7 (2.1)	141 (42.5)	13 (3.9)	143 (43.1)	35 (10.5)	47 (14.2)	47 (14.2)	17 (5.1)	332 (100.0)
	③救護・看護被爆群	2 (4.7)	1 (2.3)	3 (7.0)	2 (4.7)	12 (27.9)	20 (46.5)	3 (7.0)	15 (34.9)	1 (2.3)	12 (27.9)	2 (4.7)	7 (16.3)	7 (16.3)	4 (9.3)	43 (100.0)
	④黒い雨・指定地域群	2 (2.5)	5 (6.2)	7 (8.6)	3 (3.7)	19 (23.5)	18 (22.2)	2 (2.5)	29 (35.8)	3 (3.7)	38 (46.9)	6 (7.4)	21 (25.9)	21 (25.9)	4 (4.9)	81 (100.0)
	⑤黒い雨・未指定地域群	7 (7.4)	6 (6.3)	4 (4.2)	4 (4.2)	11 (11.6)	28 (29.5)	2 (2.1)	24 (25.3)	4 (4.2)	28 (29.5)	8 (8.4)	19 (20.0)	19 (20.0)	13 (13.7)	95 (100.0)
	⑥比較对照群	5 (1.7)	14 (4.7)	16 (5.4)	10 (3.4)	36 (12.1)	75 (25.2)	10 (3.4)	66 (22.1)	8 (2.7)	69 (23.2)	21 (7.0)	30 (10.1)	30 (10.1)	79 (26.5)	298 (100.0)

表 16 性別被爆区分別疾病別有病者頻度（調査時年齢 71 歳以上）

(単位：人、%)

性別	区分	blood	liver	cancer	brain	internal	heart	kidney	eye	respirat	bone	stomach	mental	women's	non	対象者数
男性	①直接被爆群	250 (9.3)	240 (8.9)	328 (12.2)	362 (13.4)	685 (25.4)	1,154 (42.8)	217 (8.1)	1,237 (45.9)	313 (11.6)	765 (28.4)	425 (15.8)	388 (14.4)	0 (0.0)	114 (4.2)	2,695 (100.0)
	②入市被爆群	116 (9.3)	101 (8.1)	170 (13.6)	168 (13.5)	300 (24.0)	533 (42.7)	97 (7.8)	545 (43.7)	161 (12.9)	339 (27.2)	183 (14.7)	153 (12.3)	0 (0.0)	36 (2.9)	1,248 (100.0)
	③救護・看護被爆群	14 (8.2)	15 (8.8)	17 (9.9)	20 (11.7)	57 (33.3)	75 (43.9)	9 (5.3)	48 (28.1)	23 (13.5)	54 (31.6)	28 (16.4)	17 (9.9)	0 (0.0)	4 (2.3)	171 (100.0)
	④黒い雨・指定地域群	29 (13.8)	15 (7.1)	18 (8.6)	34 (16.2)	52 (24.8)	80 (38.1)	5 (2.4)	66 (31.4)	22 (10.5)	71 (33.8)	42 (20.0)	22 (10.5)	0 (0.0)	5 (2.4)	210 (100.0)
	⑤黒い雨・未指定地域群	13 (4.7)	18 (6.6)	27 (9.9)	30 (10.9)	63 (23.0)	108 (39.4)	18 (6.6)	70 (25.5)	10 (3.6)	46 (16.8)	50 (18.2)	26 (9.5)	0 (0.0)	28 (10.2)	274 (100.0)
	⑥比較对照群	66 (4.8)	77 (5.6)	119 (8.7)	160 (11.7)	249 (18.2)	502 (36.7)	75 (5.5)	411 (30.1)	113 (8.3)	234 (17.1)	149 (10.9)	122 (8.9)	0 (0.0)	174 (12.7)	1,367 (100.0)
女性	①直接被爆群	545 (9.3)	317 (8.9)	325 (12.2)	438 (13.4)	982 (25.4)	2,029 (42.8)	278 (8.1)	2,652 (45.9)	245 (11.6)	2,299 (28.4)	516 (15.8)	953 (14.4)	143 (0.0)	177 (4.2)	4,843 (100.0)
	②入市被爆群	194 (9.3)	88 (8.1)	175 (13.6)	148 (13.5)	301 (24.0)	684 (42.7)	90 (7.8)	817 (43.7)	84 (12.9)	777 (27.2)	163 (14.7)	312 (12.3)	42 (0.0)	40 (2.9)	1,568 (100.0)
	③救護・看護被爆群	54 (8.2)	37 (8.8)	21 (9.9)	64 (11.7)	110 (33.3)	289 (43.9)	41 (5.3)	301 (28.1)	35 (13.5)	302 (31.6)	51 (16.4)	120 (9.9)	16 (0.0)	18 (2.3)	619 (100.0)
	④黒い雨・指定地域群	27 (13.8)	5 (7.1)	10 (8.6)	26 (16.2)	42 (24.8)	103 (38.1)	7 (2.4)	109 (31.4)	6 (10.5)	131 (33.8)	33 (20.0)	40 (10.5)	11 (0.0)	11 (2.4)	260 (100.0)
	⑤黒い雨・未指定地域群	26 (4.7)	15 (6.6)	19 (9.9)	34 (10.9)	55 (23.0)	116 (39.4)	11 (6.6)	115 (25.5)	15 (3.6)	110 (16.8)	39 (18.2)	42 (9.5)	9 (0.0)	27 (10.2)	285 (100.0)
	⑥比較对照群	46 (4.8)	26 (5.6)	36 (8.7)	47 (11.7)	109 (18.2)	318 (36.7)	30 (5.5)	287 (30.1)	27 (8.3)	302 (17.1)	73 (10.9)	112 (8.9)	21 (0.0)	89 (12.7)	833 (100.0)

委員名簿

○広島市原子爆弾被爆実態調査研究会

(敬称略 50音順)

氏名	職名	備考
笠置 文善	財団法人放射線影響研究所疫学部部長代理（副部長）	
片山 賢治	広島県健康福祉局総務管理部被爆者対策課長	～H21.3.31
加藤 寛	財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構 兵庫県こころのケアセンター副センター長・研究部長	
神谷 研二	広島大学原爆放射線医科学研究所教授（所長）	座長
佐伯 俊成	広島大学病院医系総合診療科・大学院医歯薬学総合研究科 総合診療医学准教授	
佐々木 英夫	財団法人広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター所長	
財満 義輝	広島修道大学人間環境学部教授	
豊後 晴一	広島県健康福祉局総務管理部被爆者対策課長	H21.4.1～
山田 美智子	財団法人放射線影響研究所臨床研究部副部長	

○健康意識調査研究班


(敬称略 50音順)

氏名	職名	備考
飛鳥井 望	財団法人東京都医学研究機構、東京都精神医学総合研究所 社会精神医学研究分野長（所長代行）	
大瀧 慶	広島大学原爆放射線医科学研究所放射線システム医学研究部 門計量生物研究分野教授	H21.12.21～
加藤 寛	財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構 兵庫県こころのケアセンター副センター長・研究部長	研究会委員兼務
佐伯 俊成	広島大学病院医系総合診療科・大学院医歯薬学総合研究科 総合診療医学准教授	リーダー 研究会委員兼務
杉山 裕美	財団法人放射線影響研究所疫学部研究員	
中嶋 みどり	広島国際大学心理科学部臨床心理学科助教	

※職名は就任時のもので、() 内は22年3月現在のものである。

(資料)

調査研究の流れ



基本調査の内容（報告書添付用に文字サイズ等変更）

以下の問い合わせについて、該当する番号に○をつけるなどして、ご回答ください。

問1 あなたの性別と生年月日をお答えください。（○は1つ）

1 男性	2 女性			
(生年月日) 1 明治 2 大正 3 昭和				
年	月	日	生まれ	(歳)

問2 あなたは、現在どなたと暮らしていますか。（○は1つ）

1 一人で暮らしている	2 家族などと暮らし ている	3 施設などで暮らし ている
-------------	-------------------	-------------------

問3 あなたは、現在、介護保険における要介護認定等を受けていますか。（○は1つ）

1 認定を受けていない
2 要支援の認定を受けている（区分に○をしてください）
要支援 (1 · 2)
3 要介護の認定を受けている（区分に○をしてください）
要介護度 (1 · 2 · 3 · 4 · 5)

問4 次の(1)～(8)の質問は、あなたがご自分の健康をどのように考えているかをおうかがいするものです。それぞれの質問について、一番よくあてはまるものを選んでください。迷われた場合は空欄とせず、最も近いと思われるものを選んでください。（いずれも○は1つ）

(1) 全体的にみて、過去1か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。

1 最高に良い	2 とても良い	3 良い	4 あまり 良くない	5 良くない	6 ぜんぜん 良くない
---------	---------	------	---------------	--------	----------------

(2) 過去1か月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが身体的な理由でどのくらい妨（さまた）げられましたか。

1 ぜんぜん妨 げられなかつた	2 わずかに 妨げられた	3 少し 妨げられた	4 かなり 妨げられた	5 体を使う日常活動 ができなかつた
--------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------------

(3) 過去1か月間に、いつもの仕事（趣味、家事も含みます）をすることが、身体的な理由でどのくらい妨（さまた）げられましたか。

1 ぜんぜん妨 げられなかつた	2 わずかに 妨げられた	3 少し 妨げられた	4 かなり 妨げられた	5 いつもの仕事がで きなかつた
--------------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------

(4) 過去1か月間に、体の痛みがどのくらいありましたか。

1 ぜんぜんな かった	2 かすかな痛 み	3 軽い痛み	4 中くらい の痛み	5 強い痛み	6 非常に激し い痛み
----------------	--------------	--------	---------------	--------	----------------

(5) 過去1か月間、どのくらい元気でしたか。

1 非常に元気だつ た	2 かなり 元気だった	3 少し 元気だった	4 わざかに 元気だった	5 ぜんぜん元気でな かった
----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------

(6) 過去1か月間に、家族や友人とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どのくらい妨(さまた)げられましたか。

1 ぜんぜん妨 げられなかつた	2 わざかに 妨げられた	3 少し 妨げられた	4 かなり 妨げられた	5 つきあいができな かつた
--------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------------

(7) 過去1か月間に、心理的な問題(不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラしたり)に、どのくらい悩まされましたか。

1 ぜんぜん悩ま れなかつた	2 わざかに 悩まされた	3 少し 悩まされた	4 かなり 悩まされた	5 非常に 悩まされた
-------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

(8) 過去1か月間に、日常行う活動(仕事、趣味、家事などのふだんの行動)が、心理的な理由で、どのくらい妨(さまた)げられましたか。

1 ぜんぜん妨 げられなかつた	2 わざかに 妨げられた	3 少し 妨げられた	4 かなり 妨げられた	5 日常行う活動がで きなかつた
--------------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------

問5 あなたの世帯の世帯員全員の平成19年の税込所得額(総収入額)の合計はどのくらいですか。(○は1つ)

1 100万円未満	2 100万円以上 300万円未満
3 300万円以上 500万円未満	4 500万円以上 1,000万円未満
5 1,000万円以上	

問6 あなたは、現在、病院で診断・検査や治療を受けている病気がありますか。

(○はいくつでも、どれもない方は、「なし」に○をつけてください)

1 貧血など造血機能の病気	2 肝硬変など肝臓の病気
3 がん(悪性新生物)	4 脳出血、脳梗塞など脳の病気
5 糖尿病、甲状腺機能低下症など内分泌腺の病気	6 高血圧性心疾患、心臓病、心筋梗塞など心臓の病気
7 腎炎、腎不全など腎臓の病気	8 白内障など目の病気
9 肺気腫、慢性間質性肺炎など呼吸器の病気	10 变形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など関節や骨の病気
11 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など胃や腸の病気	12 不眠、うつ、ストレスなどこころの病気
13 婦人科の病気	14 なし
15 その他()	

問7 あなたは、原爆が投下されたとき(昭和20年8月6日午前8時15分)に、広島にいましたか。(いずれも○は1つ)

1 いた	2 いなかった(疎開や出征を含む)
広島のどこにいましたか。 どんなところだったか、覚えている範囲でご記入ください。	
1 自宅	2 職場
3 学校	4 その他()
その場所の地名(できるだけ当時の地名でお書きください)	

問8 あなたの原爆体験(次の(1)~(8)までの体験)についておうかがいします。なるべく「はい」か「いいえ」のどちらか近い方に○をつけてください。どうしても思い出せない場合は、「よくわからない」に○をつけてください。(いずれも○は1つ)

- (1) 原爆が投下されたとき、爆発による光や熱、風などを感じたりしましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (2) 爆発により残骸となった建物や焼け跡、遺体などの光景を目にしましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (3) 爆発により、あなた自身はひどい「やけど」や「大けが」をしましたか

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (4) 爆発により、他の人がひどい「やけど」や「大けが」で苦しむ姿を見ましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (5) そばにいた家族や身近な人、あるいは助けを求める人を救えなかったようなことがありましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (6) あなた自身は放射線による「急性障害」がありましたか。
(「急性障害」とは原爆の直後からおよそ2か月間に出現する、発熱、鼻・歯茎・腸などからの出血、皮下出血、下痢、脱毛などで、1週間程度続いたものです。)

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (7) 他の人が放射線による「急性障害」で苦しむ姿を見ましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------
- (8) あなた自身は、爆発ないしは「急性障害」によって、あやうく命を落としそうな危険を感じましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

(9) 爆発や「急性障害」が原因で、家族やとても身近だった人を亡くされましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

問9 次の(1)～(22)の項目はいずれも、強いストレスを伴うような出来事にまきこまれた方々に、後に
なって生じることのあるものです。前の質問でうかがった原爆体験に関して、最近1か月間にどの程
度悩まされたかお答えください。

また、原爆体験のない方は、戦時に体験されたこと、あるいは平和記念資料館や原爆体験記・原
爆の報道などで見聞いた体験に関して、最近1か月間にどの程度影響があったかをお答えください。
なお、答えに迷われた場合は、最も近いと思うものを選んでください。(いずれも〇は1つ)

(1) どんなきっかけでも、その体験（原爆体験など）を思い出すと、そのときの気持ちがぶりかえし
てくる。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(2) 眠眠の途中で目がさめてしまう。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(3) 別のことをしていても、その体験のことが頭から離れない。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(4) イライラして、怒りっぽくなっている。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(5) その体験について考えたり思い出すときは、なんとか気を落ちつかせるようにしている。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(6) 考えるつもりはないのに、その体験のことを考えてしまうことがある。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(7) その体験は、実際には起きなかったとか、現実のことではなかったような気がする。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(8) その体験を思い出させるものには近よらない。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(9) その体験の場面が、いきなり頭にうかんでくる。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(10) 神経が敏感になっていて、ちょっとしたことでどきっとしてしまう。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(11) その体験のことは考えないようにしている。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(12) その体験については、まだいろいろな気持ちがあるが、それには触れないようにしている。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(13) その体験についての感情は、マヒしたようである。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(14) 気がつくと、まるでその体験をしたときにもどってしまったかのように、ふるまつたり感じたりすることがある。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(15) 寝つきが悪い。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(16) その体験について、感情が強くこみあげてくることがある。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(17) その体験のことを何とか忘れようとしている。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(18) ものごとに集中できない。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(19) その体験を思い出すと、身体が反応して、汗ばんだり、息苦しくなったり、むかむかしたり、
どきどきすることがある。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(20) その体験についての夢を見る。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(21) 警戒して用心深くなっている気がする。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

(22) その体験については話さないようにしている。

0 全くなし	1 少し	2 中くらい	3 かなり	4 非常に
--------	------	--------	-------	-------

問 10 原爆による影響についてうかがいます。なるべく「はい」か「いいえ」のどちらか近い方に○をつけてください。どうしても思い出せない場合は、「よくわからない」に○をつけてください。(いずれも○は1つ)

(1) 戦後に、家族・親族・身近な人のどなたかを、原爆による放射線が原因と思われるような病気で亡くされましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

(2) あなた自身は、原爆による放射線が原因と思われるような病気に、これまで罹(かか)ったり、今罹(かか)っていることはありますか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

(3) これまで、原爆による放射線の影響で深刻な病気に罹(かか)るのではと、かなり心配したり、あるいは体の具合が悪くなるたびに、放射線を浴びたせいではないかと不安になることがありましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

(4) これまでの人生の中で、自分が被爆者または原爆体験者であるために、他の人から差別されたり、遠ざけられたり、偏見をもたれたと強く感じたようなことがありましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

(5) 被爆者または原爆体験者であることは、なるべく人には話さないようにして いましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

問 11 あなたは、被爆者健康手帳又は健康診断受診者証をお持ちですか。○をつけて記入してください。
(○は1つ)

1 被爆者健康手帳を持っている
① 1号 (直接被爆 ...) 爆心地から キロメートル
② 2号 (入市被爆 ...) 入市日 8月 日)
③ 3号 (救護・看護等)
④ 3号 (健康診断受診者証の交付を受けたが、被爆者健康手帳に切り替えた)
2 健康診断受診者証を持っている
3 持っていない

問 12 原爆以外の空襲や機銃掃射、あるいは戦地や引揚げなどの戦争体験についておうかがいします。(いずれも○は1つ)

(1) 原爆以外の戦争体験の中で、あなた自身があやうく命を落としそうな危険を感じたり、「大けが」をしたことがありますか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

(2) 原爆以外の戦争体験や出征で、ご家族のどなたかを亡くされましたか。

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

問 13 あなたは原爆あるいは戦争体験以外にも、災害や火事、大きな事故、強盗や暴力犯罪など精神的ショックとなるような被害を体験されたことがありますか。(○は1つ)

1 はい	2 いいえ	3 よくわからない
------	-------	-----------

問 14 過去1か月間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか。最もよくあてはまると思われるものを○で囲んでください。(いずれも○は1つ)

(1) 神経過敏に感じましたか。

1 全くない	2 少しだけ	3 時々	4 たいてい	5 いつも
--------	--------	------	--------	-------

(2) 絶望的だと感じましたか。

1 全くない	2 少しだけ	3 時々	4 たいてい	5 いつも
--------	--------	------	--------	-------

(3) そわそわ、落ち着かなく感じましたか。

1 全くない	2 少しだけ	3 時々	4 たいてい	5 いつも
--------	--------	------	--------	-------

(4) 気分が沈みこんで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか。

1 全くない	2 少しだけ	3 時々	4 たいてい	5 いつも
--------	--------	------	--------	-------

(5) 何をするのも骨折りだと感じましたか。

1 全くない	2 少しだけ	3 時々	4 たいてい	5 いつも
--------	--------	------	--------	-------

(6) 自分は価値のない人間だと感じましたか。

1 全くない	2 少しだけ	3 時々	4 たいてい	5 いつも
--------	--------	------	--------	-------

問 15 原爆投下後に降った黒い雨などについておたずねします。

(1) あなたは黒い雨を体験されましたか。

1 はい	⇒ (2)以下の質問にお答えください
------	--------------------

2 いいえ ⇒ 11ページの「面談調査ご協力のお願い」へお進みください

3 わからない ⇒ 11ページの「面談調査ご協力のお願い」へお進みください

(2) 黒い雨を浴びたり、触れたり、口にしたり、見たりしましたか。(○は1つ)

1 たくさん浴びた（触れたり、口にした）

2 少し浴びた（触れたり、口にした）

3 浴びたり（触れたり、口にしたり）はしなかったが、降っているのを見た

4 わからない

(3) 黒い雨が降ったとき、どこにいましたか。（○は1つ）

どんなところだったか、覚えている範囲でご記入ください。

1 自宅 2 職場 3 学校 4 その他（）

その場所の地名（できるだけ当時の地名でお書きください）

(4) 黒い雨はどの程度の強さで降りましたか。（最も近いもの1つに○）

1 強い雨で、土砂降りに降った

2 中くらいの雨で、ザーバーと降った

3 弱い雨で、パラパラと降った

4 わからない

(5) 黒い雨は原爆が投下された日の何時から何時ころまで降りましたか。記憶の範囲内でお答えください。（午前か午後に○をつけて時間を記入してください）

1 何時ころから (①午前 ②午後) 時ころから

2 何時ころまで (①午前 ②午後) 時ころまで

3 わからない

(6) 雨の色などはどうでしたか。（○は1つ）

1 真っ黒（どす黒い、どろどろ・ねばねばした感じ）

2 黒っぽい

3 茶色っぽい

4 透明に近い

5 わからない

(7) 紙くずや破片などが遠くから飛んできたのを見ましたか。

1 はい 2 いいえ 3 よくわからない

面談調査ご協力のお願い

- このアンケート調査をもとに、今後、面談による詳しい「健康状態の調査」を予定しております。

これは、原爆を体験した方と原爆を体験していない方の両方から、無作為に対象者を選び、1~2時間程度の面談により健康状況の把握等を行うものです。

面談は、プライバシーや心身の様子に十分配慮したうえで、臨床心理士（心理的な問題を取り扱う「心の専門家」）等がゆっくりと聞き取りを行います。

この調査は、皆様の心身の状態について、面談にて詳しくお聞きする調査ですので、できるだけ多くの方のいつわらざる思いや声をおうかがいしたいと思っております。どうぞよろしくお願ひいたします。

なお、面談調査は秋以降に行うこととしており、場所は未定ですが、お住まいから近い複数の会場で実施し、会場までの交通費相当額をお支払いする予定です。

問16 あなたは、この面談調査にご協力いただけますか。（○は1つ）

1 協力する（面談を受けてもよい）⇒下の欄に連絡先をご記入ください

2 協力しない（面談は受けたくない）

ご協力いただける方の中から別途無作為に候補者を選ばせていただき、改めてご連絡の上、依頼させていただきます。

- ご協力いただける方は、ご住所とお名前、連絡先をお教えください。

ご住所			
お名前			
お電話番号	() -	①自宅 ②職場 ③携帯電話	
代理人（代筆者）の 電話番号	代理人氏名 (続柄)		
		①自宅 ②職場 ③携帯電話	

これまでお答えいただいた内容について、さらに付け加えたいことがございましたらご記入ください。(原爆にかかる体験についての事や、この調査に関するご意見でも結構です)

ここに書かれた原爆体験を、匿名で別途引用させていただくことになった場合に、ご了承いただけ
る方は、右欄に○印をご記入ください。



長時間、調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。

恐縮ですが、記入漏れなどないか今一度ご確認いただき、同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストに投かんしてください。（貴重な資料として活用させていただきたいと思います）

個別調査の内容

1 構成

- (1) 自記式質問紙（確認書）

事前に面談対象者に送付し、記入していただくもの。面談当日、会場にて調査員や看護師、市職員が回答内容を確認する。

- ## (2) 面談質問細

面談時に調査員が使用し記載する

2 設問内容

- ### (1) 自記式質問紙

別紙1のとおり

- ## (2) 面談質問紙

別紙2のとおり

※設問内容は、使用登録等が必要な評価尺度以外のものを表示している。
(報告書添付用に文字サイズ等変更)

<別紙1 自記式質問紙(表題名 確認書)>

○ 氏名、住所、代筆者氏名、緊急連絡先、かかりつけの病院

問1～問11(健康関連QOL尺度: SF-36™ (MOS 36-Item Short-Form Health Survey)) 36問

問12 あなたは次の病気で治療を受けたことがありますか。また、その病気で手術や内視鏡による切除、心臓のステント挿入等の外科的治療を受けたことがありますか。

「受けた」「受けない」のいずれかに○をつけて下さい。

病名	治療(通院、入院)	手術等外科的治療
1 高血圧	受けた	受けない
2 脳卒中(脳出血・脳血栓)	受けた	受けない
3 心筋梗塞	受けた	受けない
4 狹心症	受けた	受けない
5 糖尿病	受けた	受けない
6 貧血などの血液の病気	受けた	受けない
7 骨粗しょう症	受けた	受けない
8 変形性関節症や変形性脊椎症	受けた	受けない
9 白内障	受けた	受けない
10 白内障以外の視力障害	受けた	受けない
11 難聴	受けた	受けない
12 腎炎や腎不全	受けた	受けない
13 慢性肝炎や肝硬変	受けた	受けない
14 胃潰瘍や十二指腸潰瘍	受けた	受けない
15 胃ポリープ	受けた	受けない
16 大腸ポリープ	受けた	受けない
17 肺炎	受けた	受けない
18 子宮筋腫	受けた	受けない
19 大腿骨骨折	受けた	受けない
20 大腿骨以外の骨折	受けた	受けない
21 前立腺肥大症	受けた	受けない
22 うつ	受けた	受けない
23 甲状腺機能亢進症や低下症	受けた	受けない
24 甲状腺の良性腫瘍 (がん)	受けた	受けない
25 肺がん	受けた	受けない
26 胃がん	受けた	受けない
27 甲状腺がん	受けた	受けない
28 大腸がん	受けた	受けない
29 肝がん	受けた	受けない
30 乳がん	受けた	受けない

31	子宮がん	受けた	受けない	受けた	受けない
32	前立腺がん	受けた	受けない	受けた	受けない
33	血液のがん	受けた	受けない	受けた	受けない
34	その他のがん	受けた	受けない	受けた	受けない

問13 あなたの生活習慣について教えてください。

(1) たばこは吸いますか。あてはまるものに○をつけて下さい。

1. はい	2. いいえ	3. 以前は吸っていたが現在はやめた
-------	--------	--------------------

2の「いいえ」の人は問14へ

(2) 1の「はい」の方にお聞きします

1日に 何本吸りますか _____本/1日

(3) 何年間吸っていますか 通算 _____年間

(4) 3の「以前は吸っていたが現在はやめた」方にお聞きします

過去に吸っていたのは何歳から何歳までですか _____歳から _____歳まで

(5) そのとき、1日に大体何本吸っていましたか 大体 _____本/1日

問14(精神健康調査: GHQ28(The General Health Questionnaire 28)) 28問

問15(外傷後成長尺度: PTGI(Posttraumatic Growth Inventory))~原爆体験者用修正版

あなたが筆舌にも尽くしがたい原爆体験(黒い雨の体験を含みます。また、原爆体験が無い人は戦時中の体験に置き換えてください。)をされたことは、戦後の人生におけるあなたの心のあり方をどのように変えたでしょうか。以下の項目のそれぞれについて、どの程度あてはまるか、よくあてはまると思われる箇所を○で囲んでください(答えに迷われた場合は不明とせずに、最も近いと思われるもの一つをお選びください)。

あなたは原爆体験(黒い雨体験を含む)あるいは戦時中のことを体験したことで、

1. 人生において、何を優先して大事にするかが変わった	0まったくなし	1ごくわずか	2少し	3中程度	4強く	5かなり
2. 自分の命の大切さが良くわかるようになった	0まったくなし	1ごくわずか	2少し	3中程度	4強く	5かなり
3. 新たな関心事を持つようになった	0まったくなし	1ごくわずか	2少し	3中程度	4強く	5かなり
4. 自らを信頼する気持ちが強まった	0まったくなし	1ごくわずか	2少し	3中程度	4強く	5かなり
5. 人間の魂の問題への理解が深まった	0まったくなし	1ごくわずか	2少し	3中程度	4強く	5かなり
6. 困難なときには、人を頼りにできることがはつきりとわかった	0まったくなし	1ごくわずか	2少し	3中程度	4強く	5かなり

7. 自分の人生に、新たな道筋を築いた	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
8. 人に対して親密な気持ちをもつようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
9. 自分の感情を、表に出しても良いと思えるようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
10. 困難にも自分は対処していけるといふことを、はっきりと感じるようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
11. 自分の人生で、より良い事ができるようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
12. 物事の結果を、よりうまく受け入れられるようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
13. 一日一日を、より大切にできるようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
14. もしこの体験をしていなかったならばめぐりあわなかつたような機会を得ることができた	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
15. 人のことを思いやる気持ちが強まった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
16. 人間関係に、より心配りをするようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
17. 変えることが必要な事に対しては、自ら変えようとするようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
18. 宗教的な思いが強まった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
19. 自分は思っていたよりも強い人間であることに気づいた	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
20. 人間が、いかに素晴らしいものであるかについて、多くを学んだ	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり
21. 他人を必要とするということを、受け入れられるようになった	0 まったくなし	1 ごくわずか	2 少し	3 中程度	4 強く	5 かなり

(※今回の調査用に Tedeschi、Calhoun 及び宅氏の了承を得て原爆体験者用に質問文の字句を一部修正し使用している。)

問 16 あなたは通算で何年間学校に行きましたか。(専門学校・海軍／陸軍士官学校含む。)
() 年間

問 17 (人格目録テスト : MMPI(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)K尺度) 29 問
(※残る1問は、現在においては表現上好ましくないと判断し実施せず。)

<別紙2 面談質問紙>

問 1 (生年月日、年齢の確認)

問 2 (健康状態の確認)

問 3 (認知機能確認)

問 4 まず昭和 20 年 8 月 6 日の原爆投下当時のことを教えてください。

(1) あなたはどこに住んでおられましたか。

(2) 原爆が投下されたとき、どこにいましたか。

(3) あなたご自身はどちらかの原爆体験(黒い雨体験や原爆の二次的な影響も含む)をお持ちですか。(この原爆体験には、本人の体験だけでなく、家族等の原爆死の影響なども含む。)

問 5 (自記式質問紙の確認)

問 6 そのとき(原爆投下時)の体験の内容については、後ほどゆっくりと伺いますが、まず現在の状況、お考えについてお伺いします。

(1) あなたは原爆の投下により放射線の影響を受けたと思いますか。

0. そうは思わない	1. ややそう思う	2. かなりそう思う	3. とてもそう思う
------------	-----------	------------	------------

→ 0 そうは思わない人の場合は問 7へ

それでは、原爆(黒い雨)による放射線はあなたの健康状態にどのような影響を与えていると思われますか。

次の 5 個の質問について、それぞれの中から一番よくあてはまるものを選んでください。

(2) その(放射線の)影響で、病気がちとなり健康とはいえない体となったと思いますか。

0. そうは思わない	1. ややそう思う	2. かなりそう思う	3. とてもそう思う
------------	-----------	------------	------------

(3) その(放射線の)影響で、普通の人よりも体力的に劣ってしまったと思いますか。

0. そうは思わない	1. ややそう思う	2. かなりそう思う	3. とてもそう思う
------------	-----------	------------	------------

(4) その(放射線の)影響で、いつ発病するかと思うと不安になりますか。

0. そうは思わない	1. ややそう思う	2. かなりそう思う	3. とてもそう思う
------------	-----------	------------	------------

(5) どこか体の具合が悪くなるとその(放射線の)影響ではないかと気になりますか。

0. そうは思わない	1. ややそう思う	2. かなりそう思う	3. とてもそう思う
------------	-----------	------------	------------

(6) その(放射線の)影響が子や孫にも遺伝しているのではないかと心配になりますか。

0. そうは思わない	1. ややそう思う	2. かなりそう思う	3. とてもそう思う
------------	-----------	------------	------------

問 7 次に、これまでのお気持ちについてお聞きします。原爆を体験したことから、これまでの人生で何か社会的につらい体験をされたことがありますか。次の 5 個の質問について、それぞれ 4 つ

の中から一番よくあてはまるものを選んでください。

(1) 短命だとか、いつ発病するかわからないなどといった噂を耳にするのがつらかった。

0. つらい思いはまつたくなかった	1. ややつらい思いをした	2. かなりつらい思いをした	3. 非常につらい思いをした
-------------------	---------------	----------------	----------------

(2) 原爆はうつる（伝染する）といわれ、人から遠ざけられたり、陰口をいわれたりした。

0. つらい思いはまつたくなかった	1. ややつらい思いをした	2. かなりつらい思いをした	3. 非常につらい思いをした
-------------------	---------------	----------------	----------------

(3) 自分や親族の結婚問題でつらい思いをした。

0. つらい思いはまつたくなかった	1. ややつらい思いをした	2. かなりつらい思いをした	3. 非常につらい思いをした
-------------------	---------------	----------------	----------------

(4) 就職や進学問題でつらい思いをした。

0. つらい思いはまつたくなかった	1. ややつらい思いをした	2. かなりつらい思いをした	3. 非常につらい思いをした
-------------------	---------------	----------------	----------------

(5) 原爆体験者であることを口に出せなかつたり、肩身の狭い思いをしてつらかった。

0. つらい思いはまつたくなかった	1. ややつらい思いをした	2. かなりつらい思いをした	3. 非常につらい思いをした
-------------------	---------------	----------------	----------------

問8 それでは詳しく原爆体験（又は原爆投下時の体験）についてお伺いします。

（ここで面談の続行に関する確認）

(1) 原爆の体験(又は原爆投下時の体験)はどのようなものでしたか？

（何歳で、どこで、そのときの光景や状況は？家族や回りの人々は？命の危険がありましたか。大けがをしましたか。）

(2) あなたの気持ちの上での反応はどのようにでしたか？（強い不安や怖さを感じましたか。どうにもできないという無力感でしたか。ぼう然としたりショックのあまり全く何も感じませんでしたか。それはどんな感じでしたか。）

(3) 原爆投下後、黒い雨にあいましたか。

1 はい	⇒ 問9へ
2 いいえ	→ CAPSへ
3 わからない	→ CAPSへ

問9 (黒い雨の体験内容等)

(1)～(4) 基本調査と同様の質問

(5) 黒い雨と放射線の関係についてお伺いします。次の事項について、あてはまると思うものを選んでください。

1. 全ての黒い雨に放射線が沢山含まれていたと思う
2. 全ての黒い雨に放射線が少しは含まれていたと思う
3. 黒い雨は、降った場所によって沢山含まれていたり、あまり含まれていなかつたりしたと思う
4. 黒い雨は火災でも発生するため、放射線が含まれているとは限らないと思う
5. わからない

問10～ (PTSD 臨床診断面接尺度：CAPS(Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-IV))
⇒ 次ページ

CAPS

問8、問9的回答を基に基準Aを満たすかどうか判断する。

A.(1)

生命の危険？ 無 有（自分 他者）

大けが？ 無 有（自分 他者）

身体保全の脅威？ 無 有（自分 他者）

A.(2)

強い恐怖／無力感／恐れ？

無 有（出来事の間 出来事の後）

基準Aを満たすか？ いいえ たぶん はい

基準A. その人は、次の2項目がともにあてはまるような外傷的出来事にさらされた：

(1) 死や重傷のけがの危険、身体の保全への脅威をもたらすような、1つあるいは複数の出来事を、自分自身が体験したか、あるいは他人がさらされるのを目撃したり、直面した。

(2) その人の反応は、強い恐怖感、無力感、あるいは戦慄をともなった。(注)：小児では、この反応は、まとまりのない、ないしは落ち着きのない行動として現れることがある。

→ 何らかの原爆体験の有る人は、基準Aを満たさない場合も現在診断は行う。

原爆体験（又は原爆投下時の体験）内容の聴取を終えたら、B項目以下に移る。

B項目以下への導入

それではこれから、いまお話しㄧだいたい原爆体験（又は原爆投下時の体験）が、あなたにどのような影響を及ぼしたかについておたずねします。質問の間はそれらの出来事のことを頭に置いてお答えください。

質問は全部で22あります。ほとんどの質問はふたつの部分に分かれています。まず、ある特定の問題となる状態があなたに起きたかどうか、もしそうならば、過去1ヶ月間に何回くらい起きたかをおたずねします。つぎに、その問題となる状態は、どの程度の強さで気持ちの負担や不快な感じとなつたかについておたずねします。面接の最後の方で、それらの症状のために、あなたの社会生活や仕事に、全体としてどの程度影響があったかについてもおききます。

この面接は一定の形式にそったものですので、それぞれの症状に関する質問をしたあと、それにそつた内容の答をお聞きします。お答は手短かに、要点のみをお話しください。あなたの答をわたしがすぐに理解できなかつたり、答の内容をもっとはつきりさせたいという場合は別として、それ以外は、それ以上細かくお話ししていただく必要はありません。ここまでのことでは何かご質問はありますか？ → なしの場合、次ページに進む。

基準B. その外傷的な出来事は、次に示す1つないしそれ以上の形で再体験され続けている。

1. (B-1) その出来事について、繰り返し、侵入的に生じる苦痛な記憶で、イメージ、思考、知覚などを含む。
(注)：小児の場合は、外傷のテーマやある局面を表現するような遊びを繰り返すことがある。

頻度	強度	現在症
これまで、（出来事）についての記憶で、思い出したくないのに思い出てしまったことがありますか？それはどのようなものでしたか？（何を思い出しましたか。）【はっきりしなければ次を確認する】（それは、目を覚ましているときでしたか、あるいは夢の中だけですか。）【記憶が夢の中だけで見られた場合は除外する】	そのような記憶は、どの程度の苦痛や不快な感じをともないましたか？頭の中から追い出しても他のことを考えることができますか？（そうするのにどれくらい努力が必要でしたか。）そのような記憶は、どれくらいあなたの生活のさまたげになりましたか？	頻度 _____ 強度 _____ 症状：有 無
0 - 全くなし	0 - 全くなし	生涯診断
1 - 1回か2回	1 - 軽度、わずかな苦痛ないし活動へのさまたげとなる程度	頻度 _____ 強度 _____
2 - 週に1回か2回	2 - 中等度、苦痛は明らかに存在するが、対処可能な範囲であり、活動にいくらかさまたげとなる程度	頻度 _____ 強度 _____
3 - 週に数回	3 - 重度、かなりの苦痛があり、記憶を振り払うことなどが難しく、活動上顕著なさまたげがある	頻度 _____ 強度 _____
4 - 毎日あるいはほとんど毎日	4 - 極度、その人の能力をだめにするような苦痛、記憶を振り払うことも不可能で、活動を続けることもできない	頻度 _____ 強度 _____ 症状：有 無
記述/例	回答に疑問（ ）	

2. (B-2) その出来事に関する苦痛な夢の繰り返し。
(注)：小児では、はっきりと内容を把握できない恐ろしい夢としてあらわれることもある。

頻度	強度	現在症
これまで、（出来事）について不快な夢を見たことがありますか？典型的な夢について教えてください。（夢の中でどんなことがおきるのですか。）	そのような夢は、どの程度の苦痛や不快な感じをともないましたか？そのような夢のために目が覚めたことがありますか？【答が「はい」なら】（目が覚めた時はどうなりましたか。もう一度眠るのに、どれくらい時間がかかりましたか。）【目が覚めたときの不安、叫び声、夢の中にいるよう行動してしまった、などに注意して聞く】（あなたの夢はあなた以外の人にも影響を与えたましたか。どのような影響でしたか。）	頻度 _____ 強度 _____ 症状：有 無
この1ヶ月間では、どれくらいの頻度でそのような夢を見ましたか？		生涯診断
0 - 全くなし	0 - 苦痛はなし	頻度 _____
1 - 1回か2回	1 - 軽度、わずかな苦痛、目が覚めない場合もある	強度 _____
2 - 週に1回か2回	2 - 中等度、苦痛で目が覚めることもあるが、すぐ再入眠できる	頻度 _____ 強度 _____ 症状：有 無
3 - 週に数回	3 - 重度、かなりの苦痛で、簡単には再入眠できない	
4 - 毎日あるいはほとんど毎日	4 - 極度、その人の能力をだめにするような苦痛、再入眠できない	
記述/例	回答に疑問（ ）	

CAPS

3. (B-3) 外傷的出来事が再び起こっているかのように行動したり感じたりする(もう一度その体験をしているような感覚、錯覚、幻覚、あるいは解離性フラッシュバックなど。睡眠から目覚める時に見られるもの、あるいは飲酒、薬物使用時に見られるものを含む)。
- (注) 小児では、外傷的出来事の特徴を示すような、特有の行動を再演する場合がある。

頻度 (出来事)がまた起きているかのように突然行動したり、あるいは感じたりしたことがありましたか? ([出来事]に関するフラッシュバックがあつたことがありますか?) 〔もしもはつきりしなければ次を確認する〕 (それは、目を覚ましている時に起きましたか、あるいは夢の中だけで起きましたか) 〔夢の中だけの場合を除外する〕そのことにについてもう少し教えて下さい。 この1ヶ月間にどれくらい起きましたか? (訳注:ここでは解離を伴う体験について書いています)	強度 もう一度(出来事)が起きているような感じというには、どの程度の強さでしたか? (その時自分が実際にはどこにいるのかがわからなくなってしまったか。あるいはその時あなたたちは何をしていましたか)それが起きた時はどれくらい続きましたか。それが起きた時、どうしましたか?(他の人はあなたの行動に気づきましたか。何といいましたか)	現在症 頻度 _____ 強度 _____ 症状:有 無
	0 - 再体験はなかった 1 - 軽度、そのことを単に考えているというよりは、少し生々しい程度 2 - 中等度、あきらかな再体験であるが、一過性の解離で、周囲の状況はよくわかつており、白昼夢のような性質のもの 3 - 重度、強い解離状態(イメージ、音、においなどを述べる)であるが、周囲の状況は多少わかっている 4 - 極度、完全な解離状態(フラッシュバック)、周囲の状況は全くわからなくなり、反応がなくなり、そのエピソードについて健忘を残すこともある(ブラックアウト)	生涯診断 頻度 _____ 強度 _____ 症状:有 無
回答に疑問()		

4. (B-4) 外傷的出来事のある局面を象徴したり、それに類似する内的ないし外的きっかけにさらされたときの強い精神的苦痛

頻度 何かのきっかけで(出来事)のことを思い出させられたとき、気持ちが動搖することがありましたか? (何かが引金になって[出来事]にまつわる不快な気持ちが起きたことがありますか) どのようなきっかけで気持ちが動搖しましたか? この1ヶ月間にどれくらい起きましたか?	強度 (思い出させたきっかけ)は、どの程度の苦痛や不快な感じを起こさせましたか?どれくらい続きましたか?どれくらい生活のさまたげになりましたか?	現在症 頻度 _____ 強度 _____ 症状:有 無
	0 - 苦痛なし 1 - 軽度、ごくわずかな苦痛あるいは活動のさまたげ 2 - 中等度、苦痛が明らかに存在するが、まだ対処可能な範囲であり、活動にいくらかさまたげがある程度 3 - 重度、かなりの苦痛、活動上も顕著なさまたげとなる程度 4 - 極度、その人の能力をだめにするような苦痛、活動を続けることもできない程度	生涯診断 頻度 _____ 強度 _____ 症状:有 無
回答に疑問()		

中 略

CAPS

現在のPTSD症状

基準A (外傷的出来事あり) を満たすか?	いいえ	はい
#基準B (症状が1個以上) を満たすか?	いいえ	はい
#基準C (症状が3個以上) を満たすか?	いいえ	はい
#基準D (症状が2個以上) を満たすか?	いいえ	はい
基準E (症状が1ヶ月以上持続) を満たすか?	いいえ	はい
基準F (苦痛/機能障害) を満たすか?	いいえ	はい

現在PTSDがある(基準A-Fを満たす)か?

→ 現在PTSDの診断基準を満たしていないければ、生涯診断がつくかどうか評価する。外傷的出来事から少なくとも1ヶ月たった後で、症状が今より悪かった時期を特定する。(現在診断が付く場合はそこで終了する。)

(原爆体験)の後、これら(PTSD症状)が、この1ヶ月間よりもずっと悪かった時期がありましたか?それはいつでしたか?それはどれくらい続きましたか?(少なくとも1ヶ月は続きましたか)?

そのような時期がいくつかある場合:あなたがこれら(PTSD症状)に一番困ったのはどの時期でしたか? (頃から 頃まで)

少なくとも1つの時期でもあれば、項目1-22の症状頻度の質問を一番悪い時期のことに合わせて回答してもらおう:その時期には、症状がありましたか?どれくらいの頻度でしたか?

PTSDの生涯診断

基準A (外傷的出来事あり) を満たすか?	いいえ	はい
#基準B (症状が1個以上) を満たすか?	いいえ	はい
#基準C (症状が3個以上) を満たすか?	いいえ	はい
#基準D (症状が2個以上) を満たすか?	いいえ	はい
基準E (症状が1ヶ月以上持続) を満たすか?	いいえ	はい
基準F (苦痛/機能障害) を満たすか?	いいえ	はい

過去にPTSDがあった(基準A-Fを満たす)か?

CAPS

P T S D 臨床診断面接尺度 (C A P S) サマリー・シート

A. 外傷的出来事:							
B. 再体験症状		現在症		生涯診断			
		頻度	強度	頻度+強度	頻度	強度	頻度+強度
(1) 侵入的想起							
(2) 苦痛な夢							
(3) 出来事が再現したかのような行動、感情							
(4) きっかけにさらされた時の心理的苦痛							
(5) きっかけにさらされた時の生理学的反応性							
基準Bの合計							
基準Bの症状の数 (1つ必要)	()		()				
C. 回避と感情麻痺症状		現在症		生涯診断			
		頻度	強度	頻度+強度	頻度	強度	頻度+強度
(6) 考え・感情・会話の回避							
(7) 活動・場所・人物の回避							
(8) 出来事の重要な局面の想起不能							
(9) 好奇・活動参加の減退							
(10) 疏隔化・疎遠化							
(11) 感情の幅の減少							
(12) 人生の将来が短縮した感覚							
基準Cの合計							
基準Cの症状の数 (3つ必要)	()		()				
D. 対人関係亢進症状		現在症		生涯診断			
		頻度	強度	頻度+強度	頻度	強度	頻度+強度
(13) 入眠困難・睡眠継続困難							
(14) イライラ感・怒りの爆発							
(15) 集中困難							
(16) 過剰な警戒心							
(17) 過剰な驚愕反応							
基準Dの合計							
基準Dの症状の数 (2つ必要)	()		()				
E. 障害の持続時間		現在症		生涯診断			
(19) 少なくとも1ヶ月持続	いいえ	はい	いいえ	はい			
F. 顕著な苦痛あるいは機能障害		現在症		生涯診断			
(20) 主観的苦痛							
(21) 社会的機能の障害							
(22) 職業上の機能障害							
少なくとも1つは2以上?	いいえ	はい	いいえ	はい			
P T S D 診断		現在症		生涯診断			
P T S D あり - 診断基準 (A-F) を満たすか?	いいえ	はい	いいえ	はい			
原爆体験から発症までの時間	()年()ヶ月		()年()ヶ月				
合計得点	現在症		生涯診断				
B+C+D							

CAPS

関連症状	現在症		生涯診断			
	頻度	強度	頻度+強度	頻度	強度	頻度+強度
(26) 行動、あるいは行動しなかったことに 対する罪責感						
(27) 生き残り罪責感						

基本調査(転入群用)の内容 (報告書添付用に文字サイズ等変更)

資料3(3)

この調査回答票は、戦後に広島へ転入してこられた方へ送付しております。

本調査は、非常に重要な調査であり、戦後に広島へ転入してこられ原爆体験のない方についても、健康状態に関する情報を必要としております。

あなた様の回答は、重要なデータとなりますので、是非ご協力いただきますようお願いします。

以下の問い合わせについて、該当する番号に○をつけるなどして、最後までご回答ください。

問1 あなたの性別と生年月日をお答えください。(○は1つ)

1 男性	2 女性
(生年月日) 1 明治 2 大正 3 昭和 年 月 日 生まれ (歳)	

問2 あなたは、現在どなたと暮らしていますか。(○は1つ)

1 一人で暮らしている	2 家族などと暮らしている	3 施設などで暮らしている
-------------	---------------	---------------

問3 あなたは、現在、介護保険における要介護認定等を受けていますか。(○は1つ)

1 認定を受けていない
2 要支援の認定を受けている (区分に○をしてください) 要支援 (1 2)
3 要介護の認定を受けている (区分に○をしてください) 要介護度 (1 2 3 4 5)

問4 次の(1)～(8)の質問は、あなたがご自分の健康をどのように考えているかをおうかがいするものです。それぞれの質問について、一番よくあてはまるものを選んでください。迷われた場合は空欄とせず、最も近いと思われるものを選んでください。(いずれも○は1つ)

(1) 全体的にみて、過去1か月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。

1 最高に良い	2 とても良い	3 良い	4 あまり良くない	5 良くない	6 ぜんぜん良くない
---------	---------	------	-----------	--------	------------

(2) 過去1か月間に、体を使う日常活動(歩いたり階段を昇ったりなど)をすることが身体的な理由でどのくらい妨(さまた)げられましたか。

1 ぜんぜん妨げられなかった	2 わずかに妨げられた	3 少し妨げられた	4 かなり妨げられた	5 体を使う日常活動ができなかった
----------------	-------------	-----------	------------	-------------------

(3) 過去1か月間に、いつもの仕事(趣味、家事も含みます)をすることが、身体的な理由でどのくらい妨(さまた)げられましたか。

1 ぜんぜん妨げられなかった	2 わずかに妨げられた	3 少し妨げられた	4 かなり妨げられた	5 いつもの仕事ができなかった
----------------	-------------	-----------	------------	-----------------

(4) 過去1か月間に、体の痛みがどのくらいありましたか。

1 ぜんぜんなかった	2 かすかな痛み	3 軽い痛み	4 中くらいの痛み	5 強い痛み	6 非常に激しい痛み
------------	----------	--------	-----------	--------	------------

(5) 過去1か月間、どのくらい元気でしたか。

1 非常に元気だった	2 かなり元気だった	3 少し元気だった	4 わずかに元気だった	5 ぜんぜん元気でなかつた
------------	------------	-----------	-------------	---------------

(6) 過去1か月間に、家族や友人とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どのくらい妨(さまた)げられましたか。

1 ぜんぜん妨げられなかった	2 わずかに妨げられた	3 少し妨げられた	4 かなり妨げられた	5 つきあいができなかつた
----------------	-------------	-----------	------------	---------------

(7) 過去1か月間に、心理的な問題(不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラしたり)に、どのくらい悩まされましたか。

1 ぜんぜん悩まされなかった	2 わずかに悩まされた	3 少し悩まされた	4 かなり悩まされた	5 非常に悩まされた
----------------	-------------	-----------	------------	------------

(8) 過去1か月間に、日常行う活動(仕事、趣味、家事などのふだんの行動)が、心理的な理由で、どのくらい妨(さまた)げられましたか。

1 ぜんぜん妨げられなかった	2 わずかに妨げられた	3 少し妨げられた	4 かなり妨げられた	5 日常行う活動ができなかつた
----------------	-------------	-----------	------------	-----------------

問5 あなたは、現在、病院で診断・検査や治療を受けている病気がありますか。

(○はいくつでも、どれもない方は、「なし」に○をつけてください)。

1 貧血など造血機能の病気	2 肝硬変など肝臓の病気
3 がん(悪性新生物)	4 脳出血、脳梗塞など脳の病気
5 糖尿病、甲状腺機能低下症など内分泌腺の病気	6 高血圧性心疾患、心臓病、心筋梗塞など心臓の病気
7 腎炎、腎不全など腎臓の病気	8 白内障など目の病気
9 肺気腫、慢性間質性肺炎など呼吸器の病気	10 变形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など関節や骨の病気
11 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など胃や腸の病気	12 不眠、うつ、ストレスなどこころの病気
13 婦人科の病気	14 なし
15 その他()	

問6 あなたの世帯の世帯員全員の平成19年の税込所得額(総収入額)の合計はどのくらいですか。(○

は1つ)

1 100万円未満	2 100万円以上 300万円未満
3 300万円以上 500万円未満	4 500万円以上 1,000万円未満
5 1,000万円以上	

問7 過去1か月間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか。最もよくあてはまると思われるものを○で囲んでください。(いずれも○は1つ)

(1) 神経過敏に感じましたか。

1 全くない 2 少しだけ 3 時々 4 たいてい 5 いつも

(2) 絶望的だと感じましたか。

1 全くない · 2 少しだけ 3 時々 4 たいてい 5 いつも

(3) そわそわ、落ち着かなく感じましたか。

1 全くない 2 少しだけ 3 時々 4 たいてい 5 いつも

(4) 気分が沈みこんで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか

1 全くない 2 少しだけ 3 時々 4 たいてい 5 いつも

(5) 何をするのも骨折りだと感じましたか。

1 全くない 2 少しだけ 3 時々 4 たいてい 5 いつも

(6) 自分は価値のない人間だと感じましたか?

1 全くない 2 少しだけ 3 時々 4 たいてい 5 いつも

問8 下記の1~4の項目にあてはまるものがあれば○をつけてください。どれもあてはまらなければ△に、よくわからなければ□に○をつけてください。

- 1 昭和 20 年 8 月の原爆投下当時からの一定時期（昭和 24 年末頃までの間）に、広島か長崎どちらかの市内（近隣町も含む）に住んでいたことがある
- 2 広島か長崎で、原爆投下後の被爆地の惨状を直接目にしたことがある
- 3 広島か長崎で、原爆による黒い雨や「ほこり」を体験したことがある
- 4 家族・親族・身近な人を、広島か長崎の原爆による放射線が原因と思われるような病気で亡くしたことがある
- 5 上記のどれもあてはまらない
- 6 よくわからない

問9 戦時中の空襲や機銃掃射、あるいは戦地や引揚げなどの戦争体験についておうかがいします。(いずれも○は1つ)

(1) 戦争体験の中で、あなた自身があやうく命を落としそうな危険を感じたり、「大けが」をしたことがありますか。

1 はい 2 いいえ 3 よくわからない

(2) 戦争体験や出征で、ご家族のどなたかを亡くされましたか。

1 はい 2 いいえ 3 よくわからない

問 10 あなたは戦争体験以外にも、災害や火事、大きな事故、強盗や暴力犯罪など精神的ショックとなるような被害を体験されたことがありますか。(〇は1つ)

1 はい 2 いいえ 3 よくわからない

これまでお答えいただいた内容について、さらに付け加えたいことがございましたらご記入ください。（この調査に関するご意見でも結構です）

長時間、調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。

恐縮ですが、記入漏れなどないか一度ご確認いただき、同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストに投かんしてください。（貴重な資料として活用させていただきたいと思います）

登録番号	広 H8-2010-109
名 称	原爆体験者等健康意識調査報告書
主管課 所在地	健康福祉局原爆被害対策部調査課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町 1・6・34 TEL 082 (504) 2191 FAX 082 (504) 2257
登録年月日	平成 22 年 5 月
印刷所	鯉城印刷株式会社

