抗がん剤等による健康被害の救済に関する検討会

膵臓がん患者支援団体の立場から

NPO法人パンキャンジャパン
理事 眞島喜幸

Advance Research
がん研究の促進

Patient Support
患者・家族の支援

Create Hope
希望をつくる

膵臓がん患者の現状

米国部位別がんと5年生存率

Source: SEER 17 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, Atlanta, San Jose-Monterey, Los Angeles, Alaska Native Registry, Rural Georgia, California excluding SF/SJM/LA,

米国部位別がんと5年生存率

Source: SEER 17 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, Atlanta, San Jose-Monterey, Los Angeles, Alaska Native Registry, Rural Georgia, California excluding SF/SJM/LA,

罹患数

21,386 (2002)

死亡数

21,148 (2003)

罹患数 ≒ 死亡数

21世紀に残された難治性がんの代表

余命3ヶ月

発見されたとき進行している

抗がん剤による延命効果

少ない抗がん剤

あきらめたくない

何もしないよりは治療してほしい

重篤な副作用が
あってもいい

一日でも長く家族といたい

やれることはすべてやる

やり残して後悔したくない

家族全員で力いっぱい支えよう

一日でも長く元気でいてほしい

膵臓がんの治療法

外科切除

放射線治療

緩和治療

免疫療法

温熱療法

化学療法

その他

膵臓がん治療アルゴリズム

- ▶ CQ 5-3
- ▶ CQ 5-4

膵臓がん外科切除は高難度手術

低難度		中難度	高難度
食道がん		食道切除術(切除のみ) 食道再建術再建のみ(胃管再建)	食道切除再建術 食道再建術再建のみ(結腸再建)
胃がん		胃切除術	胃全摘術(噴門側胃切除を含む) 左上腹部内臓全摘術
直腸がん 肛門がん		高位前方切除術 Hartmann手術	直腸切断術(悪性) 低位前方切除術 骨盤内臓器全摘術 直腸・肛門悪性腫瘍切除術
肝がん	肝部分切除術	肝外側区域切除	肝切除術(外側区域を除く区域以上) 系統的亜区域切除術 肝移植術
胆嚢がん 胆管がん			胆嚢悪性腫瘍手術(単純胆嚢摘出術を除く) 胆管悪性腫瘍手術
膵がん			膵頭十二指腸切除術 膵体尾部切除術(悪性) 膵全摘術

欧米手術症例数と術後合併症

手術症例数	病院数	膵頭十二指腸切除数	在院死亡率
1-5	20	42	19.1%
6-10	9	63	14.3%
11-15	6	69	13.0%
16-20	3	56	8.9%
>20	1	271	2.2%

*Gordon TA, et al.: Ann Surg
1995*

手術症例数	病院数	膵切除(1,972例)	在院死亡率
<10	124	24%	18.9%
10-50	57	54%	11.8%
51-80	1	3%	12.9%
>81	2	19%	5.5%

*Lieberman MD, et al.: Ann Surg
1995*

腭頭部がん手術の死亡リスク

報告			例数	在院死亡率%
Trede M	Ann Surg	1990	133	2.2
Geer RJ	Am J Surg	1993	146	3.4
Willett CG	Ann Surg	1993	72	5.5
Nitecki SS	Ann Surg	1995	174	3.0
Allema JH	Cancer	1995	67	7.4
Yeo CJ	Ann Surg	1995	201	5.0
Benassai G	J Surg Oncol	2000	75	5.3
Richter A	World J Surg	2003	194	3.1
Wagner M	Br J Surg	2004	211	2.8
Cameron JL	Ann Surg	2006	405	1.0
Raut CP	Ann Surg	2007	300	1.0
Zacharias T	J Gastrointest Surg	2007	81	1.0

腭頭部がん手術の死亡リスク

報告	例数	在院死亡率%
Trede M	1000	0.2
Gee		
Wil		
Nite		
Alle		
Yeo		
Ber		
Ric		
Wa		
Car		
Rau		
Zachar		10

ハイボリ्यूームセンターでも
死亡率はゼロにはならない

膵頭部癌

**切除できても
合併症と再発のリスク
が存在する**

部位別がんと保険適用薬

FDAおよび国内承認の分子標的薬（低分子化合物）

一般名	商品名	標的分子	FDA承認年	国内承認年
ゲフィチニブ	イレッサ	EGFR	非小細胞肺癌 (2002)	2002.7
エルロチニブ	タルセバ	EGFR	非小細胞肺癌 (2004)	2007.10
ラパチニブ	タイケルブ	HER2、EGFR	乳癌 (2007)	2009
メシル酸イマチニブ	グリベック	BCRABL,KIT, PDGFR	CML (2001) GIST(2001)	2001.12 2003.7
ダサチニブ	スプリセル	BCRABL,KIT, SRC	CML (2006)	2009
塩酸ニロチニブ	タシグナ	BCRABL,KIT, PDGFR	CML (2007)	2009
リンゴ酸スニチニブ	スーテント	VEGFR,PDGF R,KIT,FLT3	胃癌 (2006) 肝細胞癌(2006)	2008.6 2008.6
ソラフェニブ	ネクサバル	BRAF,VEGFR2 ,EGFR,PDGFR	腎癌 (2005) 肝細胞癌 (2007)	2008.4 2009
ポルテゾミブ	ベルケード	28S proteasome	多発性骨髄腫 (2003)	2006.12
ポリノスタット	Zolinza	HDAC s	CTCL(2006)	2011.7

一般名	商品名	標的分子	FDA承認年	国内承認年
ゲフィチニブ	イレッサ	EGFR	非小細胞肺癌 (2002)	2002.7
エルロチニブ				2007.10
ラパチニブ				
メシル酸イマチニブ				2007.12
ダサチニブ				
塩酸ニロチニブ				
リンゴ酸スニチニブ				2005.5
ソラフェニブ				2005.4
ポルテゾミブ	カマルグマ	26S proteasome	多発性骨髄腫 (2003)	2006.12
ポリノスタット	Zolinza	HDAC s	CTCL(2006)	2011.7

これらの抗がん剤は
すべて欧米からの輸入
 欧米の抗がん剤に依存する
 日本のがん患者

FDAおよび国内承認の分子標的薬（抗体薬）

一般名	商品名	標的分子	FDA承認年	国内承認年
セツキシマブ	アービタックス	EGFR	大腸癌（2004）	2008.9
パニツムマブ	Vectivix	EGFR	大腸癌（2006）	2010.4
トラツズマブ	ハーセプチン	HER2	乳癌（1998）	2001.6
ベバシズマブ	アバスチン	VEGF	大腸癌（2004）	2007.8
リツキシマブ	リツキサソ	CD20	B細胞リンパ腫（1997）	2001.8
イブリツモマブ・チウキセタン	ゼパリン	CD20	B細胞リンパ腫（2002）	2008.1
トシツモマブ・ヨウ素	Bexxar	CD20	B細胞リンパ腫（2003）	未承認
ゲムツズマブ・オゾガマイシン	マイロターグ	CD33	急性骨髄性白血病 AML（2000）	2005.8
アレムツズマブ	Campath	CD52	B細胞性慢性リンパ性白血病B-CELL（2001）	未承認

一般名	商品名	標的分子	FDA承認年	国内承認年
セツキシマブ	アービタックス	EGFR	大腸癌（2004）	2008.9
パニツムマブ				
トラツズマブ				
ベバシズマブ				
リツキシマブ				
イブリツモマブ				
トシツモマブ・ミ				
ゲムツズマブ・オゾガマイシン	マイロターゲット	CD33	急性骨髄性白血病 AML（2000）	2005.8
アレムツズマブ	Campath	CD52	B細胞性慢性リン パ性白血病B-CELL （2001）	未承認

**海外で新薬が承認されても
日本ではすぐには使えない**

ドラッグラグ問題

PRINCIPLES OF CHEMOTHERAPY (1 of 3)

Systemic therapy is used in the neoadjuvant or adjuvant setting and in the management of locally advanced unresectable and metastatic disease.

- Goals of systemic therapy should be discussed with patients prior to initiation of therapy and enrollment in a clinical trial is strongly encouraged.

Close follow-up of patients undergoing chemotherapy is indicated.

Metastatic

- Acceptable monotherapy options include:

- Gemcitabine at 1000 mg/m² over 30 minutes, weekly for 3 weeks every 28 days (category 1).
- Fixed-dose rate gemcitabine (10 mg/m²/minute) may substitute for standard infusion of gemcitabine over 30 minutes (category 2B).
- Capecitabine

- Acceptable chemotherapy combinations (for patients with good performance status):

- Gemcitabine + erlotinib¹ (category 1)
- FOLFIRINOX² (category 1)
- Gemcitabine + capecitabine³
- Gemcitabine + cisplatin (especially for patients with possible hereditary cancers)⁴ (category 2B)
- Fixed dose rate gemcitabine, docetaxel, capecitabine (GTX regimen) (category 2B)⁵
- Gemcitabine + nab-paclitaxel⁶ (category 2B)

- Second-line therapy may consist of gemcitabine for those patients not previously treated with the drug. Other options include capecitabine (1000 mg/m² PO twice daily, days 1-14 every 21 days) or 5-FU/leucovorin/oxaliplatin⁷ or CapeOx.⁸ Results of the CONKO 003 trial demonstrated a significant improvement in overall survival with addition of oxaliplatin to 5-FU /leucovorin.⁷

Locally Advanced

- Depending on performance status, mono- or combination systemic chemotherapy, as noted above, may be considered as initial therapy prior to chemoradiation for appropriate patients with locally advanced, unresectable disease. Patients should be evaluated for recovery from hematologic and non-hematologic toxicity prior to initiation of chemoradiation. Patients who progress with metastatic disease are not candidates for chemoradiation unless required for palliative purposes.

[See Adjuvant, Neoadjuvant, and Salvage on PANC-E 2 of 3](#)

[See References on PANC-E 3 of 3](#)

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

PRINCIPLES OF CHEMOTHERAPY (1 of 3)

Systemic therapy is used in the neoadjuvant or adjuvant setting and in the management of locally advanced unresectable and metastatic disease.

- Goals of systemic therapy should be discussed with patients prior to initiation of therapy and enrollment in a clinical trial is strongly encouraged.

Close follow-up of patients

Metastatic

- Acceptable monotherapy
 - > Gemcitabine at 1000 mg/m² IV q3w
 - > Fixed-dose rate gemcitabine at 1000 mg/m² IV q3w
 - > Capecitabine
- Acceptable chemotherapy
 - > Gemcitabine + erlotinib
 - > FOLFIRINOX² (category 2B)
 - > Gemcitabine + capecitabine
 - > Gemcitabine + cisplatin
 - > Fixed dose rate gemcitabine + erlotinib
 - > Gemcitabine + nab-paclitaxel

- Second-line therapy may include gemcitabine (1000 mg/m² PO twice weekly) if not previously demonstrated a significant benefit.

Locally Advanced

- Depending on performance, patients may be considered for chemoradiation for a limited number of patients with hematologic and non-hematologic toxicity. Patients with performance grade 2 or worse are not candidates for chemoradiation unless required for palliative purposes.

米国NCCN膵臓がんガイドライン 2011年2月(毎年改訂)

10種類以上の抗がん剤が 掲載されている

[See Adjuvant, Neoadjuvant, and Salvage on PANC-E 2 of 3](#)

[See References on PANC-E 3 of 3](#)

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

ドラッグラグの問題

米国

FDA Gem
 Cape
Gem+Erl
 FOLFIRINOX
 GemCape
 GemCis
 GTX
 GemNab
 CapeOx
 5 FU+Leu+Ox

日本

Gem+Erl

Gem
 TS-1

[See References on PANC-E 3 of 3](#)

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

承認後の適応拡大: ゲムシタビン (Gem)

承認
1999

肺がん

年間死亡者数
• 67,600人

未承認薬問題

適応拡大
2001

膵がん

• 26,800人

適応拡大
2006

胆道がん

• 17,600人

適応拡大
2008

尿路上
皮がん

• 6,600人 (※膀胱がん)

適応拡大
2010

再発乳
がん

• 11,900人

適応拡大
2011

卵巣がん

• 4,600人

適応外薬問題

ドラッグラグ問題に取り組む患者団体

1999年～2000年
ゲムシタビンの膵臓がん
適応を求めて

2001年～2002年
肝癌再発予防薬の
承認を求めて

2003年～2004年
大腸がんにおキサリプラチンの
承認を求めて

当時の報道では「未承認薬問題」という取り上げられ方ではあったが、ドラッグラグ問題が「がん対策基本法」設立の大きなきっかけになった。

ドラッグラグ問題に取り組む患者団体

2011年 エルロチニブの膵臓がん適応を求めて

2011年 エルロチニブの膵臓がん適応を求めて

ゲムシタビン(ジェムザール®)

米国 1996.5

日本 2001.4

※ ドラッグラグ 5.0年

署名活動、厚生労働省提出

エルロチニブ(タルセバ®)

米国 2005.11

日本 2011.7

※ ドラッグラグ 5.7年

署名活動、厚生労働省提出

副作用救済制度について

治療には合併症・副作用がある

患者は医師と相談し「リスクとベネフィット」を知った上で「治療する・しない」を決める権利がある
(インフォームドコンセント)

合併症・副作用のリスクを避けるために
「治療しない」患者もいる

合併症・副作用のリスクがあっても
「治療を望む」患者は多い

治療

もある

患者
「治療
(イン

上で

合

に

合併症（副作用のリスクがあっても
「治療を望む」患者は多い

目前に迫る死 VS 副作用

- ・ 有効性の高い、延命効果につながる新薬が欧米で開発されている
- ・ 日本のがん患者は欧米の薬剤に依存している部分が多い
- ・ 抗がん剤のライフサイクル・コスト上昇が海外の製薬企業に与える影響

すでに…

- ・ 国際共同治験の**Japan Passing**
- ・ 薬剤開発拠点の**海外移転**

ドラッグラグにより作られる
医療者と患者の間の溝

患者・家族はあきらめたくない

もう治療できません

あきらめられ見放される患者

退院してください

検討会に望むこと

進行末期がん患者の場合、症状の悪化なのか副作用なのかわからないため混乱を招き、臨床試験に影響がでるのではないかという不安

副作用被害救済制度のコストが薬価に反映され、いまでも高い抗がん剤がさらに高くなるのではという医療負担増の不安

海外製薬企業によるJapanPassing現象の拡大によるドラッグラグ問題深刻化に関する不安

エビデンスのある適応外薬を使うケースにより、がん患者はドラッグラグの弊害から救われている現実がある。治療の選択が狭まり、医療の萎縮、がん難民増大につながるのではないかという不安

難治がんの治療はリスクが伴い、外科切除、抗がん剤ともに死亡リスクはゼロではない。有効性が高く、副作用・合併症の少ない薬剤・治療の開発等、がん医療全体の改善、がん制圧につながる取り組みが大切。

副作用被害救済制度のベネフィット

VS

がん医療に与える影響・リスク

がん患者・家族の希望

有効性の高い、副作用の少ない薬剤
ドラッグラグ解消