

第2類の生薬を含む漢方製剤

注1) 非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があった数を記載してある。
注2) 重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成22年度までの期間に、PMDAに報告があった数を記載し、副作用名一覧を添付してある。

紫: 指定2類、緑: 第2類、赤: 条件付2類、黒: 第3類、橙色: 区分不明

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
1	安中散		桂皮3-5、延胡索3-4、牡蛎3-4、茴香1.5-2、縮砂1-2、甘草1-2、良姜0.5-1	有	8	0	
2	安中散加茯苓		桂皮3-5、延胡索3-4、牡蛎3-4、茴香1.5-2、縮砂1-2、甘草1-2、良姜0.5-1、茯苓5	有	8	3 (参照 p5)	
5	茵陳蒿湯		茵陳蒿4-14、山梔子1.4-5、大黃1-3	有	0	0	
13	延年半夏湯		半夏3-5、柴胡2-5、別甲2-5、桔梗2-4、檳榔子2-4、人參0.8-2、生薑1-2、枳實0.5-2、吳茱萸0.5-2	無	0	0	
17	応鐘散	芎藭散	大黃1、川芎2	有	0	0	
21	乙字湯		当帰4-6、柴胡4-6、黄芩3-4、甘草1.5-3、升麻1-2、大黃0.5-3	有	2	0	
28	葛根紅花湯		葛根3、芍薬3、地黄3、黄連1.5、山梔子1.5、紅花1.5、大黃1、甘草1	無	0	0	
33	加味解毒湯		黄連2、黄芩2、黄柏2、山梔子2、柴胡2、茵陳蒿2、竜胆2、木通2、滑石3、升麻1.5、甘草1.5、燈心草1.5、大黃1.5 (大黃のない場合も可)	無	0	0	大黃がない場合、半量処方でも第2類
43	甘露飲		熟地黄2-3、乾地黄2-2.5、麦門冬2-3、枳實1-2.5、甘草2-2.5、茵陳蒿2-2.5、枇杷葉2-2.5、石斛2-2.5、黄芩2-3、天門冬2-3	無	0	0	
46	枳縮二陳湯		枳實1-3、縮砂1-3、半夏2-3、陳皮2-3、香附子2-3、木香1-2、草豆蔻1-2、乾姜1-2、厚朴1.5-2.5、茴香1-2.5、延胡索1.5-2.5、甘草1、生薑1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)、茯苓2-3	無	0	0	
49	芎藭調血飲		当帰2-2.5、地黄2-2.5、川芎2-2.5、白朮2-2.5(蒼朮も可)、茯苓2-2.5、陳皮2-2.5、烏薬2-2.5、大棗1-1.5、香附子2-2.5、甘草1、牡丹皮2-2.5、益母草1-1.5、乾姜1-1.5、生薑0.5-1.5(生薑はなくても可)	無	0	0	
50	芎藭調血飲第一加減		当帰2、川芎2、地黄2、白朮2(蒼朮も可)、茯苓2、陳皮2、烏薬2、香附子2、牡丹皮2、益母草1.5、大棗1.5、甘草1、乾姜1-1.5、生薑0.5-1.5(生薑はなくても可)、芍薬1.5、桃仁1.5、紅花1.5、枳實1.5、桂皮1.5、牛膝1.5、木香1.5、延胡索1.5	有	8	0	
51	響声破笛丸		連翹2.5、桔梗2.5、甘草2.5、大黃1、縮砂1、川芎1、訶子1、阿仙藥2、薄荷葉4 (大黃のない場合も可)	有	3	0	
55	九味檳榔湯		檳榔子4、厚朴3、桂皮3、橘皮3、蘇葉1-2、甘草1、大黃0.5-1、木香1、生薑1(ヒネショウガを使用する場合3) (大黃を去り、吳茱萸1、茯苓3を加えても可)	無	0	0	
64	桂枝加芍薬大黃湯		桂皮3-4、芍薬4-6、大棗3-4、生薑1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、甘草2、大黃1-2	有	0	0	
79	鷄鳴散加茯苓		檳榔子3-4、木瓜3、橘皮2-3、桔梗2-3、茯苓4-6、吳茱萸1-1.5、蘇葉1-2、生薑1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3)	無	0	0	

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
82	香砂平胃散		蒼朮4-6(白朮也可)、厚朴3-4.5、陳皮3-4.5、甘草1-1.5、縮砂1.5-2、香附子2-4、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)、大棗2-3、藿香1(藿香はなくても可)	無	0	0	
83	香砂養胃湯		白朮2.5-3、茯苓2.5-3、蒼朮2、厚朴2-2.5、陳皮2-2.5、香附子2-2.5、白豆蔻2(小豆蔻代用可)、人參1.5-2、木香1.5、縮砂1.5-2.5、甘草1.5-2.5、大棗1.5-2.5、生姜0.7-1	有	0	0	
84	香砂六君子湯		人參3-4、白朮3-4(蒼朮也可)、茯苓3-4、半夏3-6、陳皮2-3、香附子2-3、大棗1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1-2)、甘草1-1.5、縮砂1-2、藿香1-2	無	0	0	
85	香蘇散		香附子3.5-4.5、蘇葉1-3、陳皮2-3、甘草1-1.5、生姜1-2	有	0	0	
89	牛膝散		牛膝3、桂皮3、芍薬3、桃仁3、当帰3、牡丹皮3、延胡索3、木香1	有	0	0	
93	五物解毒散		川芎5、金銀花2、十葉2、大黃1、荊芥1.5	有	0	0	
97	柴胡加竜骨牡蛎湯		柴胡5、半夏4、茯苓3、桂皮3、大棗2.5、人參2.5、竜骨2.5、牡蛎2.5、生姜0.5-1、大黃1、黄芩2.5、甘草2以内(大黃、黄芩、甘草のない場合も可)	有	5	0	大黃がない場合、半量処方でも第二類
98	柴胡桂枝乾姜湯		柴胡6-8、桂皮3、栝楼根3-4、黄芩3、牡蛎3、乾姜2、甘草2	有	1	1 (参照 p5)	
100	柴胡清肝湯		湯: 柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黄1.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、栝楼根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5 散: 柴胡2、当帰1.5-2.5、芍薬1.5-2.5、川芎1.5-2.5、地黄1.5-2.5、黄連1.5、黄芩1.5、黄柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5-2.5、桔梗1.5-2.5、牛蒡子1.5-2.5、栝楼根1.5-2.5、薄荷葉1.5-2.5、甘草1.5-2.5	有	0	0	
101	柴胡疎肝湯		柴胡4-6、芍薬3-4、枳実2-3、甘草2-3、香附子3-4、川芎3、青皮2	無	0	0	
103	柴蘇飲		柴胡5、半夏5、黄芩3、人參3、大棗3、香附子4、蘇葉1.5-3、甘草1.5、陳皮2、生姜1	無	0	0	
107	三黄散		大黃1-2、黄芩1、黄連1	有	0	0	
108	三黄瀉心湯		大黃1-5、黄芩1-4、黄連1-4	有	0	0	
110	三物黄芩湯		黄芩1.5-3、苦参3、地黄6	有	0	0	
112	滋陰至宝湯		当帰2-3、芍薬2-3、白朮あるいは蒼朮2-3、茯苓2-3、陳皮2-3、柴胡1-3、知母2-3、香附子2-3、地骨皮2-3、麦門冬2-3、貝母1-2、薄荷葉1、甘草1	有	0	0	
118	滋血潤腸湯		当帰4、地黄4、桃仁4、芍薬3、枳実2-3、黄2-3、大黃1-3、紅花1	無	0	0	
119	紫根牡蛎湯		当帰4-5、芍薬3、川芎3、大黃0.5-2、升麻1-2、牡蛎3-4、黄耆2、紫根3-4、甘草1-2、忍冬1.5-2	有	0	0	
120	滋腎通耳湯		当帰2.5-3、川芎2.5-3、芍薬2.5-3、知母2.5-3、地黄2.5-3、黄柏2.5-3、白芷2.5-3、黄芩2.5-3、柴胡2.5-3、香附子2.5-3	無	0	0	
125	炙甘草湯		炙甘草3-4、生姜0.8-1(ヒネショウガを使用する場合3)、桂皮3、麻子仁3-4、大棗3-7.5、人參2-3、地黄4-6、麦門冬5-6、阿膠2-3	有	0	0	

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
128	鸛鴛菜湯	三味鸛鴛菜湯	海人草3-5、大黃1-1.5、甘草1-2	無	0	0	
132	潤腸湯		当帰3-4、熟地黄・乾地黄 各3-4(又は地黄6)、麻子仁2、桃仁2、杏仁2、枳実0.5-2、黄芩2、厚朴2、大黃1-3、甘草1-1.5	無	0	0	
138	小承気湯		大黃2-4、枳実2-4、厚朴2-3	無	0	0	
143	椒梅湯		烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、甘草2、乾姜2	無	0	0	
145	消風散		当帰3、知母1-2、地黄3、胡麻1-1.5、石膏3-5、蟬退1-1.5、防風2、苦参1-1.5、蒼朮2-3(白朮も可)、荊芥1-2、木通2-5、甘草1-1.5、牛蒡子2	有	0	0	
151	秦艽防風湯		秦艽2、沢瀉2、陳皮2、柴胡2、防風2、当帰3、蒼朮3、甘草1、黄柏1、升麻1、大黃1、桃仁3、紅花1	有	0	0	
156	清肌安痢湯		柴胡6-7、半夏5-6、生姜1-1.5(ヒネショウガを使用する場合3-4)、人参3、黄芩3、甘草2、海人草3、麦門冬3	無	0	0	
157	清湿化痰湯		天南星3、黄芩3、生姜1(ヒネショウガを使用する場合3)、半夏3-4、茯苓3-4、蒼朮3-4(白朮も可)、陳皮2-3、羌活1.5-3、白芷1.5-3、白芥子1.5-3、甘草1-1.5	無	0	0	
158	清上瀉痛湯	驅風触痛湯	麦門冬2.5-6、黄芩3-5、羌活2.5-3、独活2.5-3、防風2.5-3、蒼朮2.5-3(白朮も可)、当帰2.5-3、川芎2.5-3、白芷2.5-3、蔓荊子1.5-2、細辛1、甘草1、藁本1.5、菊花1.5-2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合1.5-2.5)(藁本、菊花、生姜はなくても可)	有	0	0	
164	清肺湯		黄芩2-2.5、桔梗2-2.5、桑白皮2-2.5、杏仁2-2.5、山梔子2-2.5、天門冬2-2.5、貝母2-2.5、陳皮2-2.5、大棗2-2.5、竹茹2-2.5、茯苓3、当帰3、麦門冬3、五味子0.5-1、生姜1、甘草1	有	0	0	
165	折衝飲		牡丹皮3、川芎3、芍薬3、桂皮3、桃仁4-5、当帰4-5、延胡索2-2.5、牛膝2-2.5、紅花1-1.5	有	0	0	
166	川芎茶調散		白芷2、羌活2、荊芥2、防風2、薄荷葉2、甘草1.5、細茶1.5、川芎3、香附子3-4	有	1	0	
167	千金鷄鳴散		大黃1-2、当帰4-5、桃仁4-5	無	0	0	
173	大黃甘草湯		大黃4-10、甘草1-5	有	305	7 (参照 p5)	
174	大黃牡丹皮湯		大黃1-5、牡丹皮1-4、桃仁2-4、芒硝3.6-4、冬瓜子2-6	有	0	0	
176	大柴胡湯		柴胡6-8、半夏2.5-8、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合4-5)、黄芩3、芍薬3、大棗3-4、枳実2-3、大黃1-2	有	263	9 (参照 p5)	
180	竹茹温胆湯		柴胡3-6、竹茹3、茯苓3、麦門冬3-4、陳皮2-3、枳実1-3、黄連1-4.5、甘草1、半夏3-5、香附子2-2.5、生姜1、桔梗2-3、人参1-2	無	0	0	
182	治打撲一方		川芎3、檳榔(又は桜皮)3、川骨3、桂皮3、甘草1.5、丁子1-1.5、大黃1-1.5	有	0	0	
183	治頭痛一方		連翹3-4、蒼朮3-4、川芎3、防風2-3、忍冬2-3、荊芥1-4、甘草0.5-1.5、紅花0.5-2、大黃0.5-2	有	0	0	
188	調胃承気湯		大黃2-6.4、芒硝1-6.5、甘草1-3.2	有	1	0	
193	通導散		当帰3、大黃3、芒硝3-4、枳実(枳殼でも可)2-3、厚朴2、陳皮2、木通2、紅花2-3、蘇木2、甘草2-3	有	0	0	
195	桃核承気湯		桃仁5、桂皮4、大黃3、芒硝2、甘草1.5	有	0	0	
196	当帰飲子		当帰5、芍薬3、川芎3、養梨子3、防風3、地黄4、荊芥1.5、黄耆1.5、何首烏2、甘草1	有	2	2 (参照 p6)	

	処方名	別名	成分・分量	製剤の報告の有無	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数	備考
206	当帰貝母苦参丸料		当帰3、貝母3、苦参3	無	0	0	
208	独活湯		独活2、羌活2、防風2、桂皮2、大黃2、沢瀉2、当帰3、桃仁3、連翹3、防己5、黄柏5、甘草1.5	有	0	0	
209	二朮湯		白朮1.5-2.5、茯苓1.5-2.5、陳皮1.5-2.5、天南星1.5-2.5、香附子1.5-2.5、黄芩1.5-2.5、威靈仙1.5-2.5、羌活1.5-2.5、半夏2-4、蒼朮1.5-3、甘草1-1.5、生姜0.6-1	有	0	0	
211	女神散	安栄湯	当帰3-4、川芎3、白朮3(蒼朮も可)、香附子3-4、桂皮2-3、黄芩2-4、人參1.5-2、檳榔子2-4、黄連1-2、木香1-2、丁子0.5-1、甘草1-1.5、大黃0.5-1(大黃はなくても可)	無	0	0	
234	分消湯	実脾飲	白朮2.5-3、蒼朮2.5-3、茯苓2.5-3、陳皮2-3、厚朴2-3、香附子2-2.5、猪苓2-2.5、沢瀉2-2.5、枳実(枳殼)1-3、大腹皮1-2.5、縮砂1-2、木香1、生姜1、燈心草1-2 (但し、枳殼を用いる場合は実脾飲とする)	有	0	0	
246	麻子仁丸		麻子仁4-5、芍薬2、枳実2、厚朴2-2.5、大黃3.5-4、杏仁2-2.5 (甘草1.5を加えても可)	有	0	0	

<安中散加茯苓>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
ウイキョウ(第3類)0.225g、エンゴサク(第2類)0.45g、カンゾウ(条第3類)0.15g、ケイヒ(第3類)0.6g、シュクシャ(第3類)0.15g、ブクリョウ(条第3類)0.75g、ボレイ(第3類)0.45g、リョウキョウ(第3類)0.075g	偽アルドステロン症	軽快
	偽アルドステロン症	不明
	高血圧性脳症	不明
	左室不全	不明
	心室細動	軽快
	低カリウム血症	軽快

<柴胡桂枝乾姜湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)3.0g、カロコン(第2類)3.0g、カンキョウ(第3類)2.0g、カンゾウ(第2類)2.0g、ケイヒ(第3類)3.0g、サイコ(第2類)6.0g、ボレイ(第3類)3.0g	肝障害	軽快

<大黄甘草湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
カンゾウ(条第3類)0.268g、ダイオウ(第2類)1.068g	スティーブンス・ジョンソン症候群	後遺症あり
	肝機能異常	回復
	偽アルドステロン症	回復
	好酸球性肺炎	軽快
	好酸球性肺炎	軽快
	多形紅斑	回復
	低カリウム血症	軽快

<大柴胡湯>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウゴン(第2類)1.5g、キジツ(第3類)1.0g、サイコ(第2類)3.0g、シャクヤク(第3類)1.5g、ショウキョウ(第3類)0.5g、ダイオウ(第2類)0.5g、タイソウ(第3類)1.5g、ハンゲ(第2類)2.0g	肝障害	回復
オウゴン(第2類)1.5g、キジツ(第3類)1.0g、サイコ(第2類)3.0g、シャクヤク(第3類)1.5g、ショウキョウ(第3類)0.5g、ダイオウ(第2類)0.5g、タイソウ(第3類)1.5g、ハンゲ(第2類)2.0g	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	不明
	肝機能異常	軽快
	肝機能異常	回復
	肝機能異常	回復
	急性腎不全	軽快
	腎炎	回復
	流産	回復

<当帰飲子>

成分(区分)・分量	副作用名PT	副作用転帰
オウギ(第3類)0.75g、カシウ(第2類)1g、カンゾウ(条第3類)0.5g、ケイガイ(条第3類)0.75g、ジオウ(第2類)2g、シツリシ(第2類)1.5g、シャクヤク(第3類)1.5g、センキュウ(条第3類)1.5g、トウキ(第3類)2.5g、ボウフウ(第2類)1.5g	黄疸	軽快
	肝機能異常	軽快
オウギ(第3類)0.75g、カシウ(第2類)1g、カンゾウ(条第3類)0.5g、ケイガイ(条第3類)0.75g、ジオウ(第2類)2g、シツリシ(第2類)1.5g、シャクヤク(第3類)1.5g、センキュウ(条第3類)1.5g、トウキ(第3類)2.5g、ボウフウ(第2類)1.5g	剥脱性皮膚炎	軽快

注)副作用数を掲載しているため症例数と異なる場合がある。