

## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成23年12月1日から平成24年3月31日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成23年12月1日から平成24年3月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)  
(平成23年12月1日～平成24年3月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	集計	類別	販売経路
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	中毒性表皮壊死融解症	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 酸化マグネシウム100mg	腎障害	1	指定第二類	不明
	1錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	大腸穿孔	1	指定第二類	不明
		大腸潰瘍	1		
	1日量2包(1包1,400mg)中アセトアミノフェン 600mg, エテンザミド 1000mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 120mg, 無水カフェイン 240mg, ビスベンチアミン 25mg, カンゾウ末 500mg	薬疹	1	指定第二類	配置販売
	1錠中 エテンザミド 200mg, アセトアミノフェン 80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg, 無水カフェイン 40mg, ジセチアミン塩酸塩水和物 4mg	薬疹	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
	3錠中アセトアミノフェン900mg	肝機能異常	1	第二類	薬局又は店舗販売
	6錠中アセトアミノフェン900mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	第二類	不明
		中毒性表皮壊死融解症	1		
	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	尿管間質性腎炎	1	指定第二類	不明
	2錠中 イブプロフェン 144mg, エテンザミド 84mg, プロモパレリル尿素 200mg, 無水カフェイン 50mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg	アナフィラキシーショック	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
		アナフィラキシー反応	1		
	2錠中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	各種物質毒性	1	指定第二類	不明
	アセトアミノフェン 600mg, エテンザミド 1000mg, 無水カフェイン 200mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 120mg, ベンフォチアミン 25mg, カンゾウ乾燥エキス 72mg (甘草504mg)	特発性血小板減少性紫斑病	1	指定第二類	配置販売
1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシー様ショック	1	指定第二類	薬局又は店舗販売	
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
6カプセル中アスピリンアルミニウム600mg, アセトアミノフェン600mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 硝酸チアミン15mg, ヘスベリジン30mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン120mg, リボフラビン6mg, リン酸ジヒドロコデイン20mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	配置販売	
	9錠中イブプロフェン450mg, フマル酸クレマスチン 1.34mg(クレマスチン1mg), 塩酸プロムヘキシン12mg, リン酸ジヒドロコデイン22mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg	喘息	1	指定第二類	不明
	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	喘息	1	指定第二類	不明
	9錠中 アセトアミノフェン 900mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg, デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 48mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, ヘスベリジン 45mg, カンゾウエキス 187.5mg (カンゾウ750mgに相当), ショウキョウ末 150mg, 無水カフェイン 75mg	尿管間質性腎炎	1	指定第二類	不明
	6カプセル中ゴオウ3mg, ジリュウ乾燥エキス90mg, キキョウ乾燥エキス末120mg, アセトアミノフェン675mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, クエン酸チベジン60mg, 無水カフェイン60mg	皮膚粘膜眼症候群	1	指定第二類	不明
	6カプセル中 L-カルボシステイン 750mg, プロムヘキシン塩酸塩 12mg, アセトアミノフェン 900mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, ジフェニルピラリン塩酸塩 4mg, 無水カフェイン 75mg	黄疸	1	指定第二類	薬局又は店舗販売

総合感冒剤

1日量(9錠)中〔芯錠〕ヘスペリジン 60mg, チアミン硝化物 24mg, リボフラビン 4.8mg, ゴオウ 3mg, アスコルビン酸カルシウム 200mg, 〔外層〕グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg, リボフラビン 7.2mg, マレイン酸カルビノキサミン 7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, 無水カフェイン 75mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, アセトアミノフェン 900mg, ノスカピン 48mg, リゾチーム塩酸塩 60mg(力価)	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	配置販売
3錠中 アセトアミノフェン 300mg, グアヤコールスルホン酸カリウム 83.33mg, デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg	アナフィラキシー反応	1	第二類	不明
1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応	1	指定第二類	不明
	横紋筋融解症	1		薬局又は店舗販売
	薬疹	1		不明
	薬物性肝障害	1		不明
3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	1	指定第二類	不明
3錠中ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, アセトアミノフェン300mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	1	指定第二類	不明
1包(1.2g)中ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, アセトアミノフェン300mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	中毒性表皮壊死融解症	1	指定第二類	不明
9錠中 プロムヘキシン塩酸塩 12mg, クレマスチンフマル酸塩 1.34mg (クレマスチン1mg), アセトアミノフェン 900mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, 無水カフェイン 75mg, チアミンジスルフィド 24mg, リボフラビン 12mg, カンゾウ乾燥エキス 120mg (甘草936mg)	中毒性表皮壊死融解症	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	アナフィラキシーショック	1	指定第二類	不明
	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1		薬局又は店舗販売
3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム300mg	中毒性表皮壊死融解症	1	指定第二類	不明
9錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	全身性皮疹	1	指定第二類	不明
6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン(ビタミンPの一種)90mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	不明
9錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, トラネキサム酸420mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	痙攣	1	指定第二類	不明
6錠中トラネキサム酸750mg, イブプロフェン450mg, クレマスチンフマル酸塩1.34mg, クレマスチンとして1mg, プロムヘキシン塩酸塩12mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, チアミン硝化物25mg, リボフラビン12mg	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1	指定第二類	不明
	心肺停止	1		不明

	イブプロフェン 450mg、ブロムヘキシソール塩酸塩 12mg、クレマスチンフマル酸塩 1.34mg (クレマスチンとして1mg)@ ジヒドロコデインリン酸塩 22mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg	間質性肺疾患	1	指定第二類	不明
	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	劇症肝炎	1	指定第二類	不明
	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ペンフォチアミン24mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	不明
	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ペンフォチアミン24mg	アナフィラキシーショック	1	指定第二類	不明
ステイーブンス・ジョンソン症候群		1			
急性汎発性発疹性膿疱症		1			
好酸球性肺炎		1			
低血糖症		1			
転倒		1			
	1日量(9錠)中クレマスチンフマル酸塩 1.34mg、リゾチーム塩酸塩(リゾチーム) 90mg(力価)、ペラドンナ総アルカロイド 0.3mg、アセトアミノフェン 900mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、ノスカピン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ペンフォチアミン 24mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	不明
耳鼻科用剤	9錠中塩酸ブソイドエフェドリン180mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, サイシンエキス30mg, カンゾウ末300mg, シンイエキス21mg, ショウキョウエキス末100mg, 無水カフェイン90mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	不明
	ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg (ケトチフェン1mg)	呼吸困難	1	第二類	薬局又は店舗販売
鎮暈剤	1カプセル中マレイン酸フェニラミン30mg, 臭化水素酸スコポラミン0.2mg, 塩酸ピロキシン5mg, アミノ安息香酸エチル50mg, 無水カフェイン20mg	肝機能異常	1	指定第二類	不明
鎮咳去たん剤	60mL中リン酸コデイン50mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), マレイン酸クロルフェニラミン12mg, 無水カフェイン60mg, セネガ流エキス1.5g	健忘	1	指定第二類	不明
	12錠中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 50mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg, リゾチーム塩酸塩(塩化リゾチーム) 60mg(力価), クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg, 無水カフェイン 60mg, セネガ乾燥エキス(原生薬換算量) 89.82mg (1500mg)	意識消失	1	指定第二類	不明
	4包(6g)中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 60mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg, テオフィリン160mg, グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg	意識消失	1	第一類	不明
		肺炎	1		
	3包(360mg)中 ジヒドロコデインリン酸塩 30mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, 無水カフェイン 90mg, リゾチーム塩酸塩 60mg(力価), セネガ末 300mg	緑内障	1	指定第二類	不明
	9錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg, dl-塩酸メチルエフェドリン75mg, ノスカピン60mg, 塩酸ブロムヘキシソール12mg, トラネキサム酸420mg	肝機能異常	1	指定第二類	不明
		倦怠感	1		
30mL中リン酸ジヒドロコデイン15mg, グアイフェネシン100mg, マレイン酸クロルフェニラミン4.2mg, 無水カフェイン40mg	ミオクローヌス	1	指定第二類	不明	

止しゃ剤、整腸剤	3錠中ロートエキス3倍散(ロートエキスとして60mg)180mg, タンニン酸ベルベリン300mg	腎障害	1	第二類	不明
健胃消化剤	3包(2.4g)中 テブレノン 112.5mg, ソウジュツ乾燥エキス 150mg (原生薬としてソウジュツ 1.5g), コウボク乾燥エキス 83.4mg (原生薬としてコウボク 1.0g), リパーゼAP6 14.7mg	肝機能異常	1	第二類	薬局又は店舗販売
下剤、洗腸剤	1個(30g)中 グリセリン 15g	アナフィラキシーショック	1	第二類	薬局又は店舗販売
	3錠中センノシドカルシウム40mg(センノシドA・B 16mg), ピサコジル15mg, ゲンチアナ末50mg	アナフィラキシー反応	1	指定第二類	不明
		肝機能異常	1		
紅斑	1				
利胆剤	1包(2g)中ニンジン末・ハンゲ末・ショウキョウ末・ケイヒ末・サイコ末各270mg, カンゾウ末・オウゴン末・ブクリョウ末・ソウハクヒ末・タイソウ末・モッコウ末・リョウキョウ末・シソ末各81mg	肝機能異常	1	第二類	不明
複合胃腸剤	1包(1.5g)中 シュクシャ末 20mg, チョウジ末 35mg, ケイヒ末 80mg, カンゾウ末 100mg, ビオチン末100mg, リパーゼ 20mg, 炭酸水素ナトリウム 550mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 400mg	アナフィラキシー反応	1	第二類	不明
	1包(1.2g)中安中散700mg(ケイヒ200mg, エンゴサク・ボレイ各150mg, ウイキョウ75mg, シュクシャ・カンゾウ各50mg, リョウキョウ25mg), 芍薬甘草湯エキス末170mg(シャクヤク・カンゾウ各340mg)	肝機能異常	1	第二類	不明
	3包(3.9g)中タカチアスターゼN1150mg, リパーゼAP1260mg, 胞子性乳酸菌(ラクボン原末)45mg, アカメガシワエキス63mg(アカメガシワ504mg), カンゾウ末150mg, ケイ酸アルミン酸マグネシウム1200mg, 合成ヒドロタルサイト450mg, 水酸化マグネシウム600mg, オウバク末105mg, ケイヒ末225mg, ウイキョウ末60mg, チョウジ末30mg, ショウキョウ末75mg, l-メントール9mg	肝障害	1	第二類	不明
外皮用殺菌消毒剤	100mL中 日局エタノール 83mL	炎症	1	第三類	不明
		浮腫	1		
鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤	1g中 クロタミトン 20mg, ジフェンヒドラミン 10mg, グリチルリチン酸 10mg, イソプロピルメチルフェノール 5mg, 酢酸トコフェロール 5mg	全身紅斑	1	第三類	不明
寄生性皮膚疾患用剤	100g中硝酸ミコナゾール1g, クロタミトン10g, リドカイン2g, グリチルリチン酸二カリウム0.5g	接触性皮膚炎	1	第二類	不明
毛髪用剤	100mL中ミノキシジル5g	肝機能検査異常	1	第一類	不明
その他の歯科口腔用剤	6個中 クロルヘキシジン塩酸塩 30mg, アズレンスルホン酸ナトリウム 4.8mg, グリチルリチン酸二カリウム15mg, キキョウ流エキス 400mg	意識消失	1	第二類	不明
混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く)	9錠中胎盤加水分解物0.77mL, 胎盤乾燥微粉末1.08g, チアミンジスルフィド18mg	多形紅斑	1	第二類	不明
		薬物性肝障害	2		
	3錠中メコバラミン1500µg, 葉酸5mg, 酢酸d-α-トコフェロール100mg, 塩酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキシン100mg	肝障害	1	第三類	薬局又は店舗販売
1本(50mL)中 硝酸チアミン 10mg, リン酸リボフラビンナトリウム 5mg, 塩酸ピリドキシン 10mg, ニコチン酸アミド 20mg, 無水カフェイン 50mg, アミノエチルスルホン酸(タウリン) 1500mg, 塩酸L-アルギニン 50mg, ローヤルゼリー抽出液 200mg (ローヤルゼリー200mg), ゴオウ抽出液 50µL (牛黄1mg), ロクジョウチンキ 50µL (鹿茸14.3mg), イカリソウ流エキス0.15mL (イカリソウ150mg), ニンジンエキス 55mg (人参610mg)	アナフィラキシーショック	1	第二類	不明	
カルシウム剤	2錠中沈降炭酸カルシウム1.525g(カルシウム610mg), 炭酸マグネシウム118.4mg(マグネシウム30mg), コレカルシフェロール400IU	多形紅斑	1	第二類	不明
		脳梗塞	1		

総合代謝性製剤	2錠中 エゾウコギ乾燥エキス 12.0mg (エゾウコギ 300mg), オウギ乾燥エキス 30.0mg (オウギ240mg), オキソアミヂン末 50.0mg, L-アルギニン塩酸塩 50.0mg, チアミン硝化物 (V.B)	下痢	1	第三類	不明	
		血圧低下	1			
		嘔吐	1			
	1瓶 (30mL) 中硝酸チアミン10mg, リン酸リボフラビンナトリウム3mg, アミノエチルスルホン酸1g, 塩化カルニチン100mg, ニコチン酸アミド30mg, イノシトール50mg, 無水カフェイン50mg, ロクジョウチンキ10mg (ロクジョウ2. 857mg), コオウチンキ100mg (コオウ1mg), ニンジンエキス15mg (ニンジン100. 5mg)	薬物性肝障害	1	第二類	不明	
他に分類されない代謝性医薬品	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	急性肝炎	1	第三類	不明	
その他のアレルギー用剤	1錠 (成人1日量) 中 エピナスチン塩酸塩 10mg	てんかん	1	第一類	薬局又は店舗販売	
		100ml中 マレイン酸クロルフェニラミン500mg、塩酸ナファゾリン50mg、塩化ベンゼトニウム20mg	眼球突出症	1	第二類	不明
		眼痛	1			
嘔吐	1					
漢方製剤	12錠中防風通聖散料エキス末2. 85g (トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0. 6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, 乾燥硫酸ナトリウム0. 375g, ショウキョウ0. 2g, ダイオウ0. 75g, カッセキ1. 5g)	肝機能異常	1	第二類	不明	
	6g中加味逍遥散水製エキス2. 1g (トウキ1. 8g, シャクヤク1. 8g, ビャクジュツ1. 8g, プクリョウ1. 8g, サイコ1. 8g, カンゾウ1. 2g, ボタンピ1. 2g, サンシシ1. 2g, ショウキョウ0. 6g, ハッカ0. 6g)	特発性腸間膜静脈硬化症	1	第二類	不明	
	12錠中防風通聖散料乾燥エキス2. 50g (ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g)	肝機能異常	3	第二類	不明	
		間質性肺疾患	1			
		喘息	1			
	12錠中大柴胡湯乾燥エキス2. 25g (サイコ 3. 0g, ハンゲ 2. 0g, ショウキョウ 0. 5g, オウゴン 1. 5g, シャクヤク 1. 5g, タイソウ 1. 5g, キジツ 1. 0g, ダイオウ 0. 5g)	肝機能異常	2	第二類	不明	
		間質性肺疾患	1			
	防己黄耆湯エキス 3200mg (ポウイ・オウギ各5g, ビャクジュツ・タイソウ各3g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ1g)	肺炎	1	第二類	不明	
	12錠中 防風通聖散料エキス粉末 2850mg (トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.5g)	肝機能異常	1	第二類	薬局又は店舗販売	
		間質性肺疾患	1			
12錠中 竜胆瀉肝湯エキス粉末 2750mg (リュウタン・サンシシ・カンゾウ各0.75g, モクツウ・ジオウ・トウキ各2.5g, オウゴン・タクシャ・シャゼン各1.5gより抽出)	間質性肺疾患	1	第二類	不明		
3包(4.5g)中 竜胆瀉肝湯エキス粉末 2750mg (リュウタン・サンシシ・カンゾウ各0.75g, モクツウ・ジオウ・トウキ各2.5g, オウゴン・タクシャ・シャゼン各1.5g)	間質性肺疾患	1	第二類	薬局又は店舗販売		

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	3包(4.5g)中痛散湯水製乾燥エキス0.5g(マオウ0.7g, キョウニン・カンゾウ各0.5g, ヨクイニン1.3g, ポウイ2g, 動物胆0.1g), マオウ0.6g, ヨクイニン末1.4g, カンゾウ末0.4g, ポウイ末1.6g	薬疹	1	指定第二類	通信販売 (ネット販売を除く)
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚(20cm2)中ニコチン35mg	悪心	1	第一類	薬局又は 店舗販売
		下痢	1		
		感覚鈍麻	1		
		起立障害	1		
		多汗症	1		
	1個中 ニコチン 2mg	うつ病	1	指定第二類	薬局又は 店舗販売
		咽頭浮腫	1		
		扁桃癌	1		
	1個中ニコチン2mg	ニコチン依存	2	指定第二類	不明
ニコチン 2mg	ニコチン依存	1	指定第二類	不明	