


年齢/年齢群別麻疹抗体保有率 麻疹含有ワクチン接種歴別 抗体保有率

～2011年度感染症流行予測調査事業より～

厚生労働省健康局結核感染症課
国立感染症研究所感染症情報センター

年齢/年齢群別の麻疹抗体保有状況, 2011年※1

～ 2011年度感染症流行予測調査より ～



流行予測2011


※1 主に2011年7～9月に採取された血清の測定結果 (2012年3月現在暫定値)

【2011年度麻疹感受性調査実施都道府県】

北海道, 宮城県, 山形県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 千葉県, 東京都, 新潟県,
石川県, 長野県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 京都府, 大阪府, 山口県, 香川県, 高知県,
福岡県, 佐賀県, 宮崎県, 沖縄県

麻しんに対する推計感受性人口：麻しんPA抗体価<16の人口（2011年度感染症流行予測調査事業より推計）

推計感受性人口（人）



2011年度以降に定期接種として第1、2、3、4期の接種機会が残っている人

うち半分は既に定期接種として第2、3、4期の接種機会が終了

定期接種として第2、3、4期の2回目の接種機会が終了してしまった人

2


1978年度以降に、定期接種として1回のみ接種機会があった人

定期接種として接種機会がなかった人


年齢/年齢群別の麻疹抗体保有状況の年度比較, 2006～2011年※¹

～ 2011年度感染症流行予測調査より ～

※¹ 2011年度は2012年3月現在暫定値



流行予測2011




流行予測2011

麻疹ワクチン / MR(麻疹風疹混合)ワクチン / MMR(麻疹おたふくかぜ風疹混合)ワクチン

接種歴別の年齢/年齢群別麻疹抗体保有状況, 2011年^{※1}


～ 2011年度感染症流行予測調査より ～

※1 2012年3月現在暫定値



2回接種者

[抗体価測定：ゼラチン粒子凝集法 (PA法) / n = 1061]



未接種者

[抗体価測定：ゼラチン粒子凝集法 (PA法) / n = 583]

