

## 平成24年度需給計画の上半期（4月～9月）の実施状況（報告）

平成24年度の需給計画の実施状況について、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条第3項の規定を踏まえ、以下のとおり報告する。

1. 平成24年度に国内において製造又は輸入された血液製剤の種類及び目標量と製造・輸入量の実績（4月～9月）（別表の①欄のとおり）

○ 製造・輸入量は概ね順調に推移している。

2. 平成24年度に国内献血由来原料血漿から製造された血液製剤の種類及び目標量と製造量の実績（4月～9月）（別表の②欄のとおり）

○ 製造量は概ね順調に推移している。

3. 平成24年度に必要なと見込んだ血液製剤の種類及び見込量と供給量の実績（4月～9月）（別表の③欄のとおり）

○ 供給量は概ね順調に推移している。

4. 平成24年度の原料血漿確保目標量と実績（4月～9月）

○ 原料血漿の確保は、これまでのところほぼ順調に推移している。

確保目標量 95.0万リットル

確保量 48.3万リットル（達成率50.8%）

5. 原料血漿の配分について

○ 血液製剤の製造販売業者等への原料血漿配分については、今年度9月末までの原料血漿確保状況からみて、計画どおり実行できると見込まれる。

## 別表

## 平成24年度の血漿分画製剤の需給状況(4月～9月実績と需給計画との比較)

製剤名	換算規格・単位	製造・輸入量		③供給量	自給率(供給ベース)																																																																																																																																																			
		①計	②うち国産原料		23年度	24年度 (上半期)																																																																																																																																																		
		上段:実績(達成率) 下段:需給計画	上段:実績(達成率) 下段:需給計画	上段:実績(達成率) 下段:需給計画																																																																																																																																																				
アルブミン	25%50ml(瓶)	1,343,000 (42.1%)	818,400 (42.5%)	1,446,500 (45.6%)	58.5%	60.4%																																																																																																																																																		
		3,193,400	1,924,800	3,171,100			乾燥人フィブリノゲン	1g	3,200 (58.2%)	3,200 (58.2%)	3,100 (55.4%)	100.0%	100.0%	5,500	5,500	5,600	組織接着剤	接着面積(cm2)	6,309,600 (49.1%)	2,963,600 (48.7%)	5,614,300 (45.8%)	47.4%	44.7%	12,848,200	6,090,000	12,248,500	血液凝固第Ⅳ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	257,900 (57.3%)	43,200 (56.6%)	250,900 (59.8%)	19.0%	18.2%	449,700	76,300	419,800	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	25,000 (25.2%)	12,200 (26.2%)	34,400 (42.0%)	56.7%	37.5%	99,300	46,600	82,000	インヒビター製剤	延べ人数(人)	13,400 (73.2%)	0	13,400 (76.6%)	0.0%	0.0%	18,300	0	17,500	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%	136,000	0	126,000	トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%
乾燥人フィブリノゲン	1g	3,200 (58.2%)	3,200 (58.2%)	3,100 (55.4%)	100.0%	100.0%																																																																																																																																																		
		5,500	5,500	5,600			組織接着剤	接着面積(cm2)	6,309,600 (49.1%)	2,963,600 (48.7%)	5,614,300 (45.8%)	47.4%	44.7%	12,848,200	6,090,000	12,248,500	血液凝固第Ⅳ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	257,900 (57.3%)	43,200 (56.6%)	250,900 (59.8%)	19.0%	18.2%	449,700	76,300	419,800	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	25,000 (25.2%)	12,200 (26.2%)	34,400 (42.0%)	56.7%	37.5%	99,300	46,600	82,000	インヒビター製剤	延べ人数(人)	13,400 (73.2%)	0	13,400 (76.6%)	0.0%	0.0%	18,300	0	17,500	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%	136,000	0	126,000	トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900						
組織接着剤	接着面積(cm2)	6,309,600 (49.1%)	2,963,600 (48.7%)	5,614,300 (45.8%)	47.4%	44.7%																																																																																																																																																		
		12,848,200	6,090,000	12,248,500			血液凝固第Ⅳ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	257,900 (57.3%)	43,200 (56.6%)	250,900 (59.8%)	19.0%	18.2%	449,700	76,300	419,800	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	25,000 (25.2%)	12,200 (26.2%)	34,400 (42.0%)	56.7%	37.5%	99,300	46,600	82,000	インヒビター製剤	延べ人数(人)	13,400 (73.2%)	0	13,400 (76.6%)	0.0%	0.0%	18,300	0	17,500	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%	136,000	0	126,000	トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																
血液凝固第Ⅳ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	257,900 (57.3%)	43,200 (56.6%)	250,900 (59.8%)	19.0%	18.2%																																																																																																																																																		
		449,700	76,300	419,800			乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	25,000 (25.2%)	12,200 (26.2%)	34,400 (42.0%)	56.7%	37.5%	99,300	46,600	82,000	インヒビター製剤	延べ人数(人)	13,400 (73.2%)	0	13,400 (76.6%)	0.0%	0.0%	18,300	0	17,500	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%	136,000	0	126,000	トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																										
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子(遺伝子組換え型含む)	1000単位(瓶)	25,000 (25.2%)	12,200 (26.2%)	34,400 (42.0%)	56.7%	37.5%																																																																																																																																																		
		99,300	46,600	82,000			インヒビター製剤	延べ人数(人)	13,400 (73.2%)	0	13,400 (76.6%)	0.0%	0.0%	18,300	0	17,500	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%	136,000	0	126,000	トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																				
インヒビター製剤	延べ人数(人)	13,400 (73.2%)	0	13,400 (76.6%)	0.0%	0.0%																																																																																																																																																		
		18,300	0	17,500			ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%	136,000	0	126,000	トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																														
ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	(瓶)	58,200 (42.8%)	0	62,800 (49.8%)	0.0%	0.0%																																																																																																																																																		
		136,000	0	126,000			トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%	21,800	21,800	21,300	人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																								
トロンピン(人由来)	10000単位(瓶)	5,900 (27.1%)	5,900 (27.1%)	10,100 (47.4%)	100.0%	100.0%																																																																																																																																																		
		21,800	21,800	21,300			人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%	1,801,900	1,684,900	1,737,800	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																		
人免疫グロブリン	2.5g瓶(瓶)	833,100 (46.2%)	804,200 (47.7%)	899,600 (51.8%)	95.3%	95.8%																																																																																																																																																		
		1,801,900	1,684,900	1,737,800			抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%	14,900	400	17,900	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																												
抗HBs人免疫グロブリン	1000単位(瓶)	7,600 (51.0%)	0 (0.0%)	8,400 (46.9%)	2.0%	2.6%																																																																																																																																																		
		14,900	400	17,900			乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%	12,600	0	11,500	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																																						
乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1000倍	8,200 (65.1%)	0	6,200 (53.9%)	0.0%	0.0%																																																																																																																																																		
		12,600	0	11,500			抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%	79,000	0	67,300	乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																																																
抗破傷風人免疫グロブリン	250単位(瓶)	30,800 (39.0%)	0	32,600 (48.4%)	0.0%	0.0%																																																																																																																																																		
		79,000	0	67,300			乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%	442,800	442,800	438,000	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																																																										
乾燥濃縮人アンチトロンピンⅢ	500単位(瓶)	189,400 (42.8%)	189,400 (42.8%)	194,900 (44.5%)	100.0%	100.0%																																																																																																																																																		
		442,800	442,800	438,000			乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%	300	300	300	人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																																																																				
乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位(瓶)	300 (100.0%)	300 (100.0%)	200 (66.7%)	100.0%	100.0%																																																																																																																																																		
		300	300	300			人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%	39,400	39,400	40,000	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																																																																														
人ハプトグロビン	2000単位(瓶)	13,200 (33.5%)	13,200 (33.5%)	20,600 (51.5%)	100.0%	100.0%																																																																																																																																																		
		39,400	39,400	40,000			乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%	3,200	0	2,900																																																																																																																																								
乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	500倍(瓶)	2,000 (62.5%)	0	900 (31.0%)	0.0%	0.0%																																																																																																																																																		
		3,200	0	2,900																																																																																																																																																				

注1. 数値は、製品の規格別に報告された数量を集計し、代表的な規格・単位に換算したうえ、四捨五入により100の整数倍で表示した。

注2. 液状タイプの組織接着剤については、接着・閉鎖部位の面積当たりの使用量を勘案して換算し、インヒビター製剤については、体重50kgの人への投与量を標準として人数で算出した。