


表19 歯肉の所見の有無、年齢階級別

(%)

年齢階級 (歳)	所見のない者	所見のある者							対象歯のない者
		総数	プローピング後の出血	歯石の沈着 ^{注)}	歯周ポケット 4mm以上6mm未満		歯周ポケット 6mm以上		
					総数	歯石(+)	総数	歯石(+)	
5～9	57.1	38.9	22.9	16.0	-	-	-	-	4.0
10～14	48.8	51.2	24.9	25.4	1.0	0.5	-	-	-
15～19	33.9	66.1	25.4	35.6	5.1	0.8	-	-	-
20～24	23.8	76.2	15.2	51.4	9.5	1.0	-	-	-
25～29	25.3	74.7	14.4	42.0	17.8	7.5	0.6	0.6	-
30～34	19.7	80.3	11.8	44.5	23.5	9.7	0.4	-	-
35～39	20.1	79.9	11.3	44.8	19.6	7.2	4.1	2.1	-
40～44	15.4	84.6	9.8	45.9	25.6	10.2	3.3	2.4	-
45～49	12.1	87.2	9.7	34.6	34.6	12.8	8.2	2.7	0.8
50～54	10.8	87.5	9.8	36.0	34.3	11.4	7.4	3.7	1.7
55～59	11.3	85.7	7.9	29.6	38.4	14.5	9.9	4.4	3.0
60～64	10.2	84.4	7.2	26.0	37.7	14.7	13.5	6.3	5.3
65～69	8.5	80.4	6.1	25.1	34.9	11.7	14.3	7.5	11.1
70～74	6.5	73.2	5.4	19.4	37.3	16.7	11.2	5.8	20.3
75～79	4.4	59.4	3.1	14.8	28.9	11.9	12.6	6.3	36.2
80～84	2.3	49.1	4.7	11.1	26.9	10.5	6.4	3.5	48.5
85～	2.8	43.1	8.3	12.5	13.9	9.7	8.3	4.2	54.2



注) 歯石の沈着の項には、歯周ポケットが4mm以上の者は含まない。

図19 歯肉の所見の有無、年齢階級別