

51 廃用性筋萎縮で正しいのはどれか。

1. 筋原線維は保たれる。
2. 筋内神経線維は保たれる。
3. 筋張力は保たれる。
4. 筋線維の蛋白質合成は保たれる。
5. 筋萎縮の進行速度は神経切断後と同程度である。

52 代謝性疾患で誤っている組合せはどれか。

1. 糖原病——グリコーゲン
2. 痛風——尿酸
3. アミロイドーシス——グルコース
4. Wilson 病——銅
5. ポルフィリン症——ヘム

53 疾患と塞栓源との組合せで正しいのはどれか。

1. エコノミー症候群——心内血栓
2. 脳塞栓症——内頸動脈血栓
3. 潜函病——脂肪塞栓
4. 肺塞栓——空気塞栓
5. 腎梗塞——静脈血栓

54 炎症の仲介物質の作用で正しい組合せはどれか。

1. ヒスタミン——血管透過性の亢進
2. セロトニン——発熱
3. ブラジキニン——マクロファージの活性化
4. ロイコトリエン——疼痛作用
5. プロスタグランジン——白血球の活性化

55 病理学的な悪性度が最も高いのはどれか。

1. 髄膜腫
2. 血管芽腫
3. 神経鞘腫
4. 神経膠芽腫
5. 下垂体腺腫

56 転移・逆転移で適切なのはどれか。2つ選べ。

1. 逆転移は治療者の生活史を反映する。
2. 陽性転移は治療的接近の手がかりになる。
3. 患者の怒りに気付いたら治療者を交代する。
4. 行動化は患者が転移を意識したときに生じる。
5. 逆転移を認識したら患者にそのことを伝える。

57 好きな異性に意地悪をするという行動に関連する防衛機制はどれか。

1. 退行
2. 昇華
3. 投影
4. 合理化
5. 反動形成

58 手続き記憶で正しいのはどれか。

1. 陳述記憶に分類される。
2. 普遍的な概念に関連する。
3. 内容は常に意識化される。
4. 反復訓練によって獲得される。
5. 非言語的な表象として想起される。

59 青年期の心理的発達課題に関連するのはどれか。2つ選べ。

1. 自己中心性
2. 第一反抗期
3. 自我同一性
4. モラトリアム
5. ギャング・エイジ

60 正しい組合せはどれか。

1. ベンダー・ゲシュタルト・テスト———図形模写
2. コース立方体組合せテスト———投影法
3. SCT(文章完成法テスト)———質問紙法
4. 内田・クレペリンテスト———カテゴリー分類
5. P-F スタディ(絵画-欲求不満テスト)———描画法


61 「実のなる木を1本描いてください」と指示する手法はどれか。

1. 自由画法
2. 風景構成法
3. バウムテスト
4. スクイッグル法
5. 絵画統覚検査

62 系統的脱感作法はどの心理治療に分類されるか。

1. 森田療法
2. 集団精神療法
3. 精神分析療法
4. 認知行動療法
5. 支持的精神療法


63 活動制限に対する治療場面を示すのはどれか。2つ選べ。



1




2



3



4



5

64 エックス線写真(別冊No. 1)を別に示す。

この病態の原因で最も多いのはどれか。

1. 外 傷
2. 腫 瘍
3. 糖尿病
4. 閉塞性血栓血管炎(Buerger 病)
5. 閉塞性動脈硬化症

別 冊

No. 1

65 脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1. 急性期に高頻度にみられる。
2. 体位調節は誤嚥防止に役立つ。
3. 仮性球麻痺があると生じやすい。
4. 水はペーストよりも誤嚥しやすい。
5. 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

66 介護保険法における特定疾病はどれか。

1. 筋強直性ジストロフィー
2. 脊髄小脳変性症
3. Huntington 病
4. 多発性硬化症
5. 脳性麻痺

67 患者情報の取り扱いで適切でないのはどれか。

1. 保管庫に鍵をかける。
2. 利用目的を特定する。
3. 電子データを暗号化する。
4. 閲覧できる者を限定する。
5. 本人に電話で内容を開示する。

68 院内感染対策として適切でないのはどれか。

1. ワクチン接種
2. 二次感染の防止
3. 感染経路の把握
4. 抗菌薬の予防的投与
5. 院内ガイドラインの作成

69 改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査(DDST)で、通過率 75～90 % の期間がほぼ 11～12 か月なのはどれか。

1. ボールを蹴る。
2. 支えなしに座る。
3. 検者とボール遊び。
4. パパ、ママ以外に 3 語言う。
5. 両手の積み木を打ち合わせる。

70 心電図(別冊No. 2 ①～⑤)を別に示す。

正しいのはどれか。

1. ①正常洞調律
2. ②洞性徐脈
3. ③発作性上室性頻拍
4. ④心室性期外収縮
5. ⑤心房細動

別 冊
No. 2 ①～⑤

71 関節リウマチの診断基準(アメリカリウマチ協会 1987 年改訂)に含まれない項目はどれか。

1. 朝のこわばり
2. 対称性の関節炎
3. リウマトイド結節
4. 血清リウマトイド因子
5. CRP

72 閉塞性換気障害を呈するのはどれか。2つ選べ。

1. 肺気腫
2. 肺線維症
3. 慢性気管支炎
4. うっ血性心不全
5. 筋ジストロフィー

73 下肢の深部静脈血栓症で誤っているのはどれか。

1. 安静臥床の期間と密接な関係がある。
2. 足指が暗赤色に腫脹する。
3. 血液凝固能は亢進している。
4. 肺塞栓症を生じる。
5. 誘引として避妊用ピルがある。

74 正しい組合せはどれか。2つ選べ。

1. 性腺刺激ホルモン——Cushing 病
2. 甲状腺ホルモン——Basedow 病
3. プロラクチン——Addison 病
4. オキシトシン——尿崩症
5. 成長ホルモン——末端肥大症

75 女児に多い骨端症の罹患部位はどれか。

1. 大腿骨骨頭
2. 脛骨粗面
3. 踵 骨
4. 足の舟状骨
5. 第2中足骨

76 筋萎縮性側索硬化症でみられないのはどれか。

1. 舌の線維束攣縮
2. 流 涎
3. 肺活量低下
4. 深部感覚障害
5. 歩行障害

77 骨折について正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 回旋変形は自然矯正されやすい。
2. 小児では Colles 骨折の頻度が高い。
3. 上腕骨近位端骨折は高齢者に多い。
4. 癌の骨転移では疲労骨折が生じやすい。
5. 脂肪塞栓は大腿骨骨折後に起こりやすい。

78 コンパートメント症候群の症状で頻度が低いのはどれか。

1. 疼 痛
2. 発 赤
3. 腫 脹
4. 運動麻痺
5. 脈拍触知不能

79 中心性頸髄損傷で正しいのはどれか。2つ選べ。

1. 高齢者に多い。
2. 骨傷を伴うことが多い。
3. 灰白質の損傷は少ない。
4. 上肢よりも下肢の症状が強い。
5. 後縦靭帯骨化症があると生じやすい。

80 CT(別冊No. 3)を別に示す。

この症例でみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 筋線維束攣縮
2. 上腕三頭筋反射の低下
3. Hoffmann 反射陽性
4. Babinski 反射陽性
5. 舌の萎縮

別 冊

No. 3

81 肘部管症候群で筋力低下をきたすのはどれか。

1. 短母指外転筋
2. 長母指伸筋
3. 長母指屈筋
4. 母指対立筋
5. 母指内転筋

82 深部腱反射の亢進がみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 重症筋無力症
2. 多発性硬化症
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 筋強直性ジストロフィー
5. Duchenne 型筋ジストロフィー

83 運動失調がみられるのはどれか。

1. 辺縁系脳炎
2. Parkinson 病
3. 周期性四肢麻痺
4. Wallenberg 症候群
5. Lambert-Eaton 症候群

84 正常圧水頭症の症状でないのはどれか。

1. 複 視
2. 尿失禁
3. 計算力低下
4. 自発性低下
5. 歩行不安定

85 脳卒中片麻痺急性期のポジショニングで正しい組合せはどれか。

1. 頸 部———伸展位
2. 肩関節———内旋位
3. 手関節———背屈位
4. 股関節———外旋位
5. 足関節———底屈位

86 びまん性軸索損傷が最も起こりやすい部位はどれか。

1. 脳 梁
2. 側頭極
3. 側頭葉外側面
4. 側頭葉内側面
5. 前頭葉眼窩面

87 多発性硬化症について正しいのはどれか。

1. 高齢者に多い。
2. 脱髄が主病変である。
3. 症状に日内変動がみられる。
4. 初発症状として眼瞼下垂が多い。
5. 脳神経では聴覚が障害されやすい。

88 Duchenne 型筋ジストロフィーで頻度が低いのはどれか。

1. 兄弟発症
2. 呼吸不全
3. 心機能障害
4. 胸腰椎の変形
5. 脳萎縮

89 末梢神経とその損傷による症状との組合せで誤っているのはどれか。

1. 長胸神経———翼状肩甲
2. 後骨間神経———手指 MP 関節伸展の筋力低下
3. 大腿神経———股関節伸展の筋力低下
4. 総腓骨神経———下垂足
5. 閉鎖神経———股関節内転筋筋力低下

90 認知障害がみられるのはどれか。

1. 重症筋無力症
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. Guillain-Barré 症候群
4. 筋強直性ジストロフィー
5. 平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)

91 突然子どもを亡くし、その悲しい思い出が頭を離れず、それ以外のことが考えられない状態はどれか。

1. 強迫観念
2. 虚無妄想
3. 思考干渉
4. 思考制止
5. 支配観念

92 抗精神病薬の副作用で治療しても遷延する可能性が高いのはどれか。

1. 突進歩行
2. アカシジア
3. 悪性症候群
4. 全身倦怠感
5. 遅発性ジストニア

93 Alzheimer 型認知症と比べて Lewy 小体型認知症で特徴的な症状はどれか。

1. 失 認
2. 幻 視
3. 脱抑制
4. 反響言語
5. 感情失禁

94 Korsakoff 症候群の症状はどれか。2つ選べ。

1. 作 話
2. 解 離
3. 語健忘
4. 失見当識
5. もうろう状態

95 アルコール依存症患者が急激に断酒したときに起こりやすいのはどれか。2つ選べ。

1. せん妄
2. 躁状態
3. 嫉妬妄想
4. けいれん発作
5. 被害関係妄想

96 統合失調症に特徴的な訴えはどれか。2つ選べ。

1. 「考えが伝わっている」
2. 「考えが抜き取られる」
3. 「考えがまとまらない」
4. 「考えが先に進まない」
5. 「考えがよどみなく浮かぶ」

97 統合失調症で障害されない精神機能はどれか。

1. 意識
2. 知覚
3. 感情
4. 意欲
5. 思考

98 うつ病に特徴的な症状はどれか。2つ選べ。

1. 感情鈍麻
2. 激越症状
3. 早朝覚醒
4. 滞続言語
5. 滅裂思考

99 人前で発言することを恐れ、それを回避する場合に可能性が高いのはどれか。

1. 適応障害
2. 解離性障害
3. 強迫性障害
4. 社会恐怖症
5. 広場恐怖症

100 小児自閉症でみられるのはどれか。

1. ごっこ遊びをする。
2. 人見知りをしない。
3. 新しい環境を好む。
4. おとぎ話を聞きたがる。
5. 身振りで意思を伝える。