

Q&A

Q：「入力する場合は 010010、070030、... 160990 に該当する場合のみ」となっているが、これはどのような意味か。

A：診断群分類の頭 6 桁を指す。医療資源を最も投入した傷病名の ICD-10 がこれらの 6 桁に該当した場合である。例えば 010010 の場合、医療資源を最も投入した傷病名の ICD10 が C700, C709, C71\$, C722, C723, C724, C793, D320, D329, D330, D331, D332, D333, D337, D339, D420, D429, D430, D431, D432, D433, D437, D439, G131, G132 のいずれかの場合、対象になる。

Q&A

Q：「入力する場合は 010010、070030、... 160990 に該当する場合のみ」となっているが、医療資源を最も投入した傷病名が該当する場合のみ入力が必要なのか。入院時併存病名等が「010010、070030、... 160990」に該当する場合も必要なのか。

A：医療資源を最も投入した傷病名が該当する場合のみ入力する。

Q&A

Q：胸椎圧迫骨折で、脊椎麻痺が全くない場合（該当しない）は入力しなくてよいか。

A：よい。明らかに麻痺がなければ入力を要さない。

(17) Hugh-Jones分類

呼吸器疾患の患者について入院時に入力する。6歳未満の小児で分類不能の場合は入力不要。

“1”～“5”までの値を入力する。

値	分類	所見
1	I	同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並みにできる。
2	II	同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並みにはできない。
3	III	平地でも健康者並みに歩けないが、自分のペースなら1マイル(1.6km)以上歩ける。
4	IV	休み休みでなければ50m以上歩けない。
5	V	会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない。

Q&A

Q：寝たきりで分類不能な場合はどのようにするのか。

A：分類不能の場合は入力を要さない。

Q&A

Q：症状が一番悪い時点でよいか。

A：一番悪い時点でよい。

(18) 心不全のNYHA心機能分類

入院時又は心不全が発症した時点で、下表の分類にそって値を入力する。

心不全が1入院中に複数回生じた場合には、その中で最も重症な場合を入力する。

値	分類	所見
1	I	身体活動に制限のない心疾患患者（心疾患を有するがそのために身体活動が制限されることのない患者。通常の身体活動では疲労、動悸、呼吸困難あるいは強心症状はきたさない。）
2	II	身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。（心疾患を有し、そのために身体活動が軽度から中等度制限される患者。安静時は無症状である。通常の身体活動で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状をきたす。）
3	III	身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。（心疾患を有し、そのために身体活動が高度に制限される患者。安静時は無症状であるが、通常以下の身体活動で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状をきたす。）
4	IV	身体活動を制限し安静にしても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。（心疾患を有し、そのために非常に軽度の身体活動でも愁訴をきたす患者。安静時においても心不全あるいは狭心症状を示すことがある。少しの身体活動でも愁訴が増加する。）