



放射線の人への影響

年間で100ミリシーベルトまでゆっくりと被ばくした場合のがん死亡



がんの相対リスク




がんの相対リスク

がんのリスク -放射線、ダイオキシンと生活習慣(JPHC Study) -

相対リスク	全部位 * 固形がん:広島・長崎 ダイオキシン:職業曝露・伊工場爆発事故	特定部位 * チェルノブイリ18歳以下被ばく10-15年後
10~		C型肝炎感染者(肝臓:36) ピロリ菌感染既往者(胃:10)
2.50~9.99		650-1240mSv(甲状腺:4.0) 【1000mSv当たり3.2倍と推計】 喫煙者(肺:4.2-4.5) 大量飲酒(300g以上/週)※(食道:4.6)
1.50~2.49	1000-2000mSv(1.8) 【1000mSv当たり1.5倍と推計】 喫煙者(1.6) 大量飲酒(450g以上/週)※(1.6)	150-290mSv(甲状腺:2.1) 高塩分食品毎日(胃:2.5-3.5) 運動不足(結腸<男性>:1.7) 肥満(BMI>30)(大腸:1.5)(閉経後乳がん:2.3)
1.30~1.49	500-1000mSv(1.4) 2,3,7,8-TCDD血中濃度数千倍【職業曝露】(1.4) 大量飲酒(300-449g/週)※(1.4)	50-140mSv(甲状腺:1.4) 受動喫煙<非喫煙女性>(肺:1.3)
1.10~1.29	200-500mSv(1.19) 肥満(BMI≥30)(1.22) やせ(BMI<19)(1.29) 運動不足(1.15-1.19) 高塩分食品(1.11-1.15)	
1.01-1.09	100-200mSv(1.08) 野菜不足(1.06) 受動喫煙<非喫煙女性>(1.02-1.03)	
検出不可能	100mSv未満 2,3,7,8-TCDD血中濃度数百倍【農業工場爆発事故周辺住民】	

※飲酒については、エタノール換算量を示す

人が被ばくする放射線の目安



国際放射線防護委員会(ICRP)は専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際学術組織¹

食品中の放射能と安全基準

体内に入った放射性セシウムの行方

放射性セシウムの生物学的半減期

物理学的半減期は、30年であるが。

年齢	生物学的半減期
3ヶ月	16日
1歳	13日
5歳	30日
10歳	50日
15歳	93日
成人	110日

国際放射線防御委員会(ICRP)の公表値

水や食物中に存在する放射性物質からの放射線量の計算の例

次に、水や食物中に存在する放射性物質から受ける放射線量(体内の放射性物質によって将来受ける放射線量を含めた積算値)ですが、これは国際放射線防護委員会による係数を用いて、下記の計算式で推定できます。

受ける放射線量(マイクロシーベルト) = 実効線量係数(下の表の値) × 放射能濃度(ベクレル/kg) × 飲食した量(kg)

実効線量係数^{*}(マイクロシーベルト/ベクレル)

	ヨウ素-131	セシウム-137	セシウム-134
乳児(3ヶ月)	0.18	0.020	0.026
幼児(1-2歳)	0.18	0.012	0.016
子供(3-7歳)	0.10	0.0096	0.013
成人	0.022	0.013	0.019

※(経口摂取、ICRP Database of Dose Coefficients: Workers and Members of the public, CD-ROM,1998を基に放射線医学総合研究所で編集)

内部被ばく計算事例(1)

100Bq/kg (Cs-137) の食品を200グラム食べた場合の成人の内部被ばくは？

* 基準値は 100Bq/kg



$$0.013 \times 100\text{Bq/kg} \times 0.2\text{kg}$$

$$= 0.26 \quad \mu\text{Sv}$$

$$= 0.00026 \quad \text{mSv}$$

食品の安全基準

2012年 4月 1日より


食品区分	基準値 (Bq/kg)	備考
飲料水	10	WHOが示した飲料水の放射性セシウムのガイダンスレベル
一般食品	100	
牛乳	50	小児の期間については感受性が成人より高い可能性等を考慮し、区分を設定
乳児用食品	50	

基準値の考え方

「一般食品」の基準値の考え方

食品中の放射性物質からの線量が年間1mSvを超えないように設定

Cs134, Cs137以外の核種は測定に時間を要するために、Csとの比率を算出して、合計して1 mSVを超えないようにCsの基準値を設定




●当該線量を年齢区分別の年間摂取量と換算計数で割ることにより、限度値を算出する。（流通する食品の半分が基準値上限の放射性物質を含むと仮定）

基準値の考え方

年齢区分	限度値 (Bq/kg)	
	男	女
1歳未満	460	
1～6歳	310	320
7～12歳	190	210
13～18歳	120	150
19歳以上	130	160
妊婦	—	160
最小値	120	
基準値	100	


流通する食品の汚染割合を「一般食品」については50%と仮定

福島県における食品の検査体制



福島県の
ホームページ
より

生産地での検査



福島県の
ホームページ
より

農林水産物モニタリング情報
Monitoring Info

新発売ブログ
New-Fukushima Blog

野菜ソムリエ藤田が聞く
Vegetable Sommeliers

ふくしま動画放送局
New-Fukushima Broadcasting


「がんばろう 福島!」応援店一覧
Support Shop List

イベント情報
Event Info

「ふくしま 新発売。」は
未来へ向けて動き出している 福島のと
農林水産物のモニタリング情報
検索サイトです。

ふくしまの最新情報をお届けいたします。
ふくしま新発売。

雄国沼

農林水産物モニタリング情報 Monitoring Info in English

品目
から検索
Search by category

地図
から検索
Search by Area

- 出荷制限等一覧
List of shipping restrictions, etc.
- 新しい基準値について
Values for new regulations
- モニタリング検査に関する取組み
Monitoring inspection information
- よくあるお問い合わせとその回答
Questions and Answers

Information 2012.10.22 クイズに答えて、24年産米 福島県のオリジナル新品種「天のつぶ」を当てよう!

一覧へ▶

新 発 売 ブ ロ グ

個性豊かな情報員たちが、福島と首都圏から
地域の最新情報をいち早くレポート!!



ブロッカー一覧へ▶

野菜ソムリエ
藤田が聞く!!

