

○糖尿病の検査の受診と保健指導

第21表 糖尿病の検査の受診状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	あり	145	31.4	354	46.3	537	64.6	876	72.5	939	73.3	854	69.2	3,705	64.1
	なし	317	68.6	410	53.7	294	35.4	332	27.5	342	26.7	380	30.8	2,075	35.9
	—総数—	462	100.0	764	100.0	831	100.0	1,208	100.0	1,281	100.0	1,234	100.0	5,780	100.0
男 性	あり	61	33.3	159	54.5	224	69.6	379	79.8	449	77.7	388	75.6	1,660	70.2
	なし	122	66.7	133	45.5	98	30.4	96	20.2	129	22.3	125	24.4	703	29.8
	—総数—	183	100.0	292	100.0	322	100.0	475	100.0	578	100.0	513	100.0	2,363	100.0
女 性	あり	84	30.1	195	41.3	313	61.5	497	67.8	490	69.7	466	64.6	2,045	59.8
	なし	195	69.9	277	58.7	196	38.5	236	32.2	213	30.3	255	35.4	1,372	40.2
	—総数—	279	100.0	472	100.0	509	100.0	733	100.0	703	100.0	721	100.0	3,417	100.0

第22表-1 近隣地域の健康増進に関する場所の認知状況別、糖尿病の検査の受診状況  
(食生活について相談できる適当な場所について、性・年齢階級別)

	認知状況	糖尿病の検査 の受診状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	知っている	あり	81	34.9	231	49.5	378	65.5	641	74.4	724	76.3	647	72.1	2,702	67.8
		なし	151	65.1	236	50.5	199	34.5	220	25.6	225	23.7	250	27.9	1,281	32.2
		—総数—	232	100.0	467	100.0	577	100.0	861	100.0	949	100.0	897	100.0	3,983	100.0
	知らない	あり	64	27.8	123	41.4	159	62.6	235	67.7	214	64.7	205	61.4	1,000	55.8
		なし	166	72.2	174	58.6	95	37.4	112	32.3	117	35.3	129	38.6	793	44.2
		—総数—	230	100.0	297	100.0	254	100.0	347	100.0	331	100.0	334	100.0	1,793	100.0
男 性	知っている	あり	23	32.4	79	57.7	138	70.4	260	80.0	330	79.9	293	76.7	1,123	73.7
		なし	48	67.6	58	42.3	58	29.6	65	20.0	83	20.1	89	23.3	401	26.3
		—総数—	71	100.0	137	100.0	196	100.0	325	100.0	413	100.0	382	100.0	1,524	100.0
	知らない	あり	38	33.9	80	51.6	86	68.3	119	79.3	119	72.1	94	72.3	536	64.0
		なし	74	66.1	75	48.4	40	31.7	31	20.7	46	27.9	36	27.7	302	36.0
		—総数—	112	100.0	155	100.0	126	100.0	150	100.0	165	100.0	130	100.0	838	100.0
女 性	知っている	あり	58	36.0	152	46.1	240	63.0	381	71.1	394	73.5	354	68.7	1,579	64.2
		なし	103	64.0	178	53.9	141	37.0	155	28.9	142	26.5	161	31.3	880	35.8
		—総数—	161	100.0	330	100.0	381	100.0	536	100.0	536	100.0	515	100.0	2,459	100.0
	知らない	あり	26	22.0	43	30.3	73	57.0	116	58.9	95	57.2	111	54.4	464	48.6
		なし	92	78.0	99	69.7	55	43.0	81	41.1	71	42.8	93	45.6	491	51.4
		—総数—	118	100.0	142	100.0	128	100.0	197	100.0	166	100.0	204	100.0	955	100.0

第22表-2 近隣地域の健康増進に関する場所の認知状況別、糖尿病の検査の受診状況  
(運動を行うための適当な場所について、性・年齢階級別)

	認知状況	糖尿病の検査 の受診状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	知っている	あり	127	33.0	319	48.6	473	66.0	760	74.1	751	74.2	633	72.1	3,063	65.5
		なし	258	67.0	337	51.4	244	34.0	266	25.9	261	25.8	245	27.9	1,611	34.5
		—総数—	385	100.0	656	100.0	717	100.0	1,026	100.0	1,012	100.0	878	100.0	4,674	100.0
	知らない	あり	18	23.4	35	32.4	64	56.1	116	63.7	186	69.7	218	62.1	637	58.0
		なし	59	76.6	73	67.6	50	43.9	66	36.3	81	30.3	133	37.9	462	42.0
		—総数—	77	100.0	108	100.0	114	100.0	182	100.0	267	100.0	351	100.0	1,099	100.0
男 性	知っている	あり	52	34.4	138	57.0	196	73.4	324	82.0	364	79.1	307	78.3	1,381	72.4
		なし	99	65.6	104	43.0	71	26.6	71	18.0	96	20.9	85	21.7	526	27.6
		—総数—	151	100.0	242	100.0	267	100.0	395	100.0	460	100.0	392	100.0	1,907	100.0
	知らない	あり	9	28.1	21	42.0	28	50.9	55	68.8	85	72.0	79	66.4	277	61.0
		なし	23	71.9	29	58.0	27	49.1	25	31.3	33	28.0	40	33.6	177	39.0
		—総数—	32	100.0	50	100.0	55	100.0	80	100.0	118	100.0	119	100.0	454	100.0
女 性	知っている	あり	75	32.1	181	43.7	277	61.6	436	69.1	387	70.1	326	67.1	1,682	60.8
		なし	159	67.9	233	56.3	173	38.4	195	30.9	165	29.9	160	32.9	1,085	39.2
		—総数—	234	100.0	414	100.0	450	100.0	631	100.0	552	100.0	486	100.0	2,767	100.0
	知らない	あり	9	20.0	14	24.1	36	61.0	61	59.8	101	67.8	139	59.9	360	55.8
		なし	36	80.0	44	75.9	23	39.0	41	40.2	48	32.2	93	40.1	285	44.2
		—総数—	45	100.0	58	100.0	59	100.0	102	100.0	149	100.0	232	100.0	645	100.0

第23表 糖尿病の検査の受診機会（複数回答、性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	—総数—	145	100.0	354	100.0	537	100.0	876	100.0	939	100.0	854	100.0	3,705	100.0
	住民健診(病院・診療所)	14	9.7	52	14.7	141	26.3	330	37.7	536	57.1	613	71.8	1,686	45.5
	職場における健診	106	73.1	244	68.9	301	56.1	406	46.3	279	29.7	85	10.0	1,423	38.4
	学校における健診	15	10.3	6	1.7	2	0.4	3	0.3	4	0.4	2	0.2	33	0.9
	人間ドック	2	1.4	45	12.7	142	26.4	211	24.1	174	18.5	79	9.3	652	17.6
	その他	14	9.7	45	12.7	34	6.3	63	7.2	88	9.4	143	16.7	385	10.4
男性	—総数—	61	100.0	159	100.0	224	100.0	379	100.0	449	100.0	388	100.0	1,660	100.0
	住民健診(病院・診療所)	6	9.8	13	8.2	24	10.7	88	23.2	197	43.9	259	66.8	588	35.4
	職場における健診	44	72.1	128	80.5	160	71.4	228	60.2	190	42.3	76	19.6	827	49.8
	学校における健診	10	16.4	1	0.6	0	0	3	0.8	0	0	1	0.3	15	0.9
	人間ドック	0	0	19	11.9	74	33.0	103	27.2	114	25.4	50	12.9	360	21.7
	その他	5	8.2	9	5.7	10	4.5	22	5.8	41	9.1	58	14.9	144	8.7
女性	—総数—	84	100.0	195	100.0	313	100.0	497	100.0	490	100.0	466	100.0	2,045	100.0
	住民健診(病院・診療所)	8	9.5	39	20.0	117	37.4	242	48.7	339	69.2	354	76.0	1,098	53.7
	職場における健診	62	73.8	116	59.5	141	45.0	178	35.8	89	18.2	9	1.9	595	29.1
	学校における健診	5	6.0	5	2.6	2	0.6	0	0	4	0.8	1	0.2	16	0.8
	人間ドック	2	2.4	26	13.3	68	21.7	108	21.7	60	12.2	29	6.2	292	14.3
	その他	9	10.7	36	18.5	24	7.7	41	8.2	47	9.6	85	18.2	241	11.8

第24表 糖尿病の検査の受診結果（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	異常なし	135	93.1	342	96.6	474	88.4	717	82.2	707	76.0	664	78.1	3,039	82.4
	境界型	9	6.2	10	2.8	50	9.3	114	13.1	147	15.8	105	12.4	435	11.8
	糖尿病	1	0.7	2	0.6	12	2.2	41	4.7	76	8.2	81	9.5	213	5.8
	—総数—	145	100.0	354	100.0	536	100.0	872	100.0	930	100.0	850	100.0	3,687	100.0
男性	異常なし	56	91.8	151	95.0	186	83.0	272	72.0	299	67.3	279	72.5	1,243	75.3
	境界型	5	8.2	7	4.4	33	14.7	77	20.4	95	21.4	61	15.8	278	16.8
	糖尿病	0	0	1	0.6	5	2.2	29	7.7	50	11.3	45	11.7	130	7.9
	—総数—	61	100.0	159	100.0	224	100.0	378	100.0	444	100.0	385	100.0	1,651	100.0
女性	異常なし	79	94.0	191	97.9	288	92.3	445	90.1	408	84.0	385	82.8	1,796	88.2
	境界型	4	4.8	3	1.5	17	5.4	37	7.5	52	10.7	44	9.5	157	7.7
	糖尿病	1	1.2	1	0.5	7	2.2	12	2.4	26	5.3	36	7.7	83	4.1
	—総数—	84	100.0	195	100.0	312	100.0	494	100.0	486	100.0	465	100.0	2,036	100.0

第25表 糖尿病の状況別、糖尿病の検査の受診状況（性・年齢階級別）

	糖尿病の状況	糖尿病の検査 の受診状況	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	HbA1c 5.6%未満	あり	118	30.3	316	46.5	438	64.1	647	71.1	599	70.0	509	66.1	2,627	61.3
		なし	271	69.7	364	53.5	245	35.9	263	28.9	257	30.0	261	33.9	1,661	38.7
		—総数—	389	100.0	680	100.0	683	100.0	910	100.0	856	100.0	770	100.0	4,288	100.0
	HbA1c 5.6%以上 6.1%未満	あり	2	50.0	11	40.7	29	59.2	83	69.7	131	73.6	131	70.1	387	68.6
		なし	2	50.0	16	59.3	20	40.8	36	30.3	47	26.4	56	29.9	177	31.4
		—総数—	4	100.0	27	100.0	49	100.0	119	100.0	178	100.0	187	100.0	564	100.0
	HbA1c 6.1%以上 または現在治療を 受けている	あり	2	100.0	4	66.7	29	96.7	84	91.3	158	90.8	158	88.8	435	90.2
		なし	0	0	2	33.3	1	3.3	8	8.7	16	9.2	20	11.2	47	9.8
		—総数—	2	100.0	6	100.0	30	100.0	92	100.0	174	100.0	178	100.0	482	100.0
男 性	HbA1c 5.6%未満	あり	47	33.1	136	54.8	185	69.3	250	77.4	279	74.4	215	71.9	1,112	67.2
		なし	95	66.9	112	45.2	82	30.7	73	22.6	96	25.6	84	28.1	542	32.8
		—総数—	142	100.0	248	100.0	267	100.0	323	100.0	375	100.0	299	100.0	1,654	100.0
	HbA1c 5.6%以上 6.1%未満	あり	1	33.3	2	28.6	8	80.0	34	73.9	55	76.4	58	75.3	158	73.5
		なし	2	66.7	5	71.4	2	20.0	12	26.1	17	23.6	19	24.7	57	26.5
		—総数—	3	100.0	7	100.0	10	100.0	46	100.0	72	100.0	77	100.0	215	100.0
	HbA1c 6.1%以上 または現在治療を 受けている	あり	0	0	1	50.0	12	92.3	58	96.7	93	94.9	93	91.2	257	93.5
		なし	0	0	1	50.0	1	7.7	2	3.3	5	5.1	9	8.8	18	6.5
		—総数—	0	0	2	100.0	13	100.0	60	100.0	98	100.0	102	100.0	275	100.0
女 性	HbA1c 5.6%未満	あり	71	28.7	180	41.7	253	60.8	397	67.6	320	66.5	294	62.4	1,515	57.5
		なし	176	71.3	252	58.3	163	39.2	190	32.4	161	33.5	177	37.6	1,119	42.5
		—総数—	247	100.0	432	100.0	416	100.0	587	100.0	481	100.0	471	100.0	2,634	100.0
	HbA1c 5.6%以上 6.1%未満	あり	1	100.0	9	45.0	21	53.8	49	67.1	76	71.7	73	66.4	229	65.6
		なし	0	0	11	55.0	18	46.2	24	32.9	30	28.3	37	33.6	120	34.4
		—総数—	1	100.0	20	100.0	39	100.0	73	100.0	106	100.0	110	100.0	349	100.0
	HbA1c 6.1%以上 または現在治療を 受けている	あり	2	100.0	3	75.0	17	100.0	26	81.3	65	85.5	65	85.5	178	86.0
		なし	0	0	1	25.0	0	0	6	18.8	11	14.5	11	14.5	29	14.0
		—総数—	2	100.0	4	100.0	17	100.0	32	100.0	76	100.0	76	100.0	207	100.0

第26表 糖尿病の状況別、糖尿病の検査の受診結果（性・年齢階級別）

	糖尿病の状況	糖尿病の検査 の受診結果	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	HbA1c 5.6%未満	異常なし	112	94.9	308	97.5	409	93.4	587	91.0	549	92.4	476	93.7	2,441	93.2
		境界型	6	5.1	8	2.5	29	6.6	57	8.8	40	6.7	30	5.9	170	6.5
		糖尿病	0	0	0	0	0	0	1	0.2	5	0.8	2	0.4	8	0.3
		— 総数 —	118	100.0	316	100.0	438	100.0	645	100.0	594	100.0	508	100.0	2,619	100.0
	HbA1c 5.6%以上 6.1%未満	異常なし	1	50.0	11	100.0	23	79.3	65	78.3	99	76.2	110	84.0	309	80.1
		境界型	1	50.0	0	0	6	20.7	17	20.5	31	23.8	19	14.5	74	19.2
		糖尿病	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0	2	1.5	3	0.8
		— 総数 —	2	100.0	11	100.0	29	100.0	83	100.0	130	100.0	131	100.0	386	100.0
	HbA1c 6.1%以上 または現在治療を 受けている	異常なし	0	0	1	25.0	6	21.4	17	20.5	25	16.1	32	20.6	81	19.0
		境界型	1	50.0	1	25.0	11	39.3	33	39.8	66	42.6	51	32.9	163	38.2
		糖尿病	1	50.0	2	50.0	11	39.3	33	39.8	64	41.3	72	46.5	183	42.9
		— 総数 —	2	100.0	4	100.0	28	100.0	83	100.0	155	100.0	155	100.0	427	100.0
男 性	HbA1c 5.6%未満	異常なし	44	93.6	130	95.6	162	87.6	208	83.2	241	87.3	196	91.2	981	88.5
		境界型	3	6.4	6	4.4	23	12.4	42	16.8	32	11.6	18	8.4	124	11.2
		糖尿病	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.1	1	0.5	4	0.4
		— 総数 —	47	100.0	136	100.0	185	100.0	250	100.0	276	100.0	215	100.0	1,109	100.0
	HbA1c 5.6%以上 6.1%未満	異常なし	0	0	2	100.0	4	50.0	22	64.7	37	67.3	48	82.8	113	71.5
		境界型	1	100.0	0	0	4	50.0	11	32.4	18	32.7	9	15.5	43	27.2
		糖尿病	0	0	0	0	0	0	1	2.9	0	0	1	1.7	2	1.3
		— 総数 —	1	100.0	2	100.0	8	100.0	34	100.0	55	100.0	58	100.0	158	100.0
	HbA1c 6.1%以上 または現在治療を 受けている	異常なし	0	0	0	0	4	33.3	13	22.8	10	11.0	16	17.8	43	17.1
		境界型	0	0	0	0	4	33.3	21	36.8	37	40.7	32	35.6	94	37.5
		糖尿病	0	0	1	100.0	4	33.3	23	40.4	44	48.4	42	46.7	114	45.4
		— 総数 —	0	0	1	100.0	12	100.0	57	100.0	91	100.0	90	100.0	251	100.0
女 性	HbA1c 5.6%未満	異常なし	68	95.8	178	98.9	247	97.6	379	95.9	308	96.9	280	95.6	1,460	96.7
		境界型	3	4.2	2	1.1	6	2.4	15	3.8	8	2.5	12	4.1	46	3.0
		糖尿病	0	0	0	0	0	0	1	0.3	2	0.6	1	0.3	4	0.3
		— 総数 —	71	100.0	180	100.0	253	100.0	395	100.0	318	100.0	293	100.0	1,510	100.0
	HbA1c 5.6%以上 6.1%未満	異常なし	1	100.0	9	100.0	19	90.5	43	87.8	62	82.7	62	84.9	196	86.0
		境界型	0	0	0	0	2	9.5	6	12.2	13	17.3	10	13.7	31	13.6
		糖尿病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.4	1	0.4
		— 総数 —	1	100.0	9	100.0	21	100.0	49	100.0	75	100.0	73	100.0	228	100.0
	HbA1c 6.1%以上 または現在治療を 受けている	異常なし	0	0	1	33.3	2	12.5	4	15.4	15	23.4	16	24.6	38	21.6
		境界型	1	50.0	1	33.3	7	43.8	12	46.2	29	45.3	19	29.2	69	39.2
		糖尿病	1	50.0	1	33.3	7	43.8	10	38.5	20	31.3	30	46.2	69	39.2
		— 総数 —	2	100.0	3	100.0	16	100.0	26	100.0	64	100.0	65	100.0	176	100.0

第27表 糖尿病の検査において異常を指摘された年齢（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	7-14歳	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
	15-19歳	2	20.0	0	0	1	1.6	0	0	0	0	0	0	3	0.5
	20-29歳	7	70.0	3	25.0	2	3.2	1	0.6	0	0	1	0.5	14	2.2
	30-39歳	0	0	9	75.0	14	22.6	5	3.2	10	4.5	6	3.3	44	6.8
	40-49歳	0	0	0	0	45	72.6	66	42.9	36	16.2	16	8.7	163	25.3
	50-59歳	0	0	0	0	0	0	82	53.2	97	43.7	31	16.8	210	32.6
	60-69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	79	35.6	60	32.6	139	21.6
	70歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	38.0	70	10.9
	—総数—	10	100.0	12	100.0	62	100.0	154	100.0	222	100.0	184	100.0	644	100.0
男 性	7-14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-19歳	2	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5
	20-29歳	3	60.0	2	25.0	1	2.6	1	1.0	0	0	1	1.0	8	2.0
	30-39歳	0	0	6	75.0	8	21.1	5	4.8	9	6.3	4	3.8	32	7.9
	40-49歳	0	0	0	0	29	76.3	50	47.6	27	18.8	12	11.4	118	29.1
	50-59歳	0	0	0	0	0	0	49	46.7	61	42.4	22	21.0	132	32.6
	60-69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	47	32.6	31	29.5	78	19.3
	70歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	33.3	35	8.6
	—総数—	5	100.0	8	100.0	38	100.0	105	100.0	144	100.0	105	100.0	405	100.0
女 性	7-14歳	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
	15-19歳	0	0	0	0	1	4.2	0	0	0	0	0	0	1	0.4
	20-29歳	4	80.0	1	25.0	1	4.2	0	0	0	0	0	0	6	2.5
	30-39歳	0	0	3	75.0	6	25.0	0	0	1	1.3	2	2.5	12	5.0
	40-49歳	0	0	0	0	16	66.7	16	32.7	9	11.5	4	5.1	45	18.8
	50-59歳	0	0	0	0	0	0	33	67.3	36	46.2	9	11.4	78	32.6
	60-69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	32	41.0	29	36.7	61	25.5
	70歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	44.3	35	14.6
	—総数—	5	100.0	4	100.0	24	100.0	49	100.0	78	100.0	79	100.0	239	100.0

第28表 糖尿病の検査受診後の保健指導の状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	あり	4	40.0	5	41.7	39	65.0	106	70.7	178	80.5	141	77.5	473	74.5
	なし	6	60.0	7	58.3	21	35.0	44	29.3	43	19.5	41	22.5	162	25.5
	—総数—	10	100.0	12	100.0	60	100.0	150	100.0	221	100.0	182	100.0	635	100.0
男 性	あり	2	40.0	2	25.0	23	63.9	72	70.6	115	79.3	82	79.6	296	74.2
	なし	3	60.0	6	75.0	13	36.1	30	29.4	30	20.7	21	20.4	103	25.8
	—総数—	5	100.0	8	100.0	36	100.0	102	100.0	145	100.0	103	100.0	399	100.0
女 性	あり	2	40.0	3	75.0	16	66.7	34	70.8	63	82.9	59	74.7	177	75.0
	なし	3	60.0	1	25.0	8	33.3	14	29.2	13	17.1	20	25.3	59	25.0
	—総数—	5	100.0	4	100.0	24	100.0	48	100.0	76	100.0	79	100.0	236	100.0

第29表 糖尿病の検査受診後の保健指導の内容（複数回答、性・年齢階級別）

	保健指導の内容	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	—総数—	10	100.0	12	100.0	60	100.0	150	100.0	221	100.0	182	100.0	635	100.0
	糖尿病教室受講	1	10.0	2	16.7	9	15.0	33	22.0	62	28.1	61	33.5	168	26.5
	糖尿病のパンフレット	2	20.0	2	16.7	19	31.7	56	37.3	100	45.2	87	47.8	266	41.9
	医療機関への受診勧奨	3	30.0	2	16.7	26	43.3	68	45.3	117	52.9	101	55.5	317	49.9
	何も受けていない	6	60.0	7	58.3	21	35.0	44	29.3	43	19.5	41	22.5	162	25.5
男性	—総数—	5	100.0	8	100.0	36	100.0	102	100.0	145	100.0	103	100.0	399	100.0
	糖尿病教室受講	0	0	0	0	6	16.7	19	18.6	39	26.9	38	36.9	102	25.6
	糖尿病のパンフレット	1	20.0	1	12.5	10	27.8	41	40.2	62	42.8	53	51.5	168	42.1
	医療機関への受診勧奨	1	20.0	1	12.5	16	44.4	48	47.1	79	54.5	61	59.2	206	51.6
	何も受けていない	3	60.0	6	75.0	13	36.1	30	29.4	30	20.7	21	20.4	103	25.8
女性	—総数—	5	100.0	4	100.0	24	100.0	48	100.0	76	100.0	79	100.0	236	100.0
	糖尿病教室受講	1	20.0	2	50.0	3	12.5	14	29.2	23	30.3	23	29.1	66	28.0
	糖尿病のパンフレット	1	20.0	1	25.0	9	37.5	15	31.3	38	50.0	34	43.0	98	41.5
	医療機関への受診勧奨	2	40.0	1	25.0	10	41.7	20	41.7	38	50.0	40	50.6	111	47.0
	何も受けていない	3	60.0	1	25.0	8	33.3	14	29.2	13	17.1	20	25.3	59	25.0

第30表 糖尿病の検査結果別、保健指導の内容（複数回答、性別）

	保健指導の内容	糖尿病の検査の結果				一計	
		境界型		糖尿病		人数	%
		人数	%	人数	%		
男女計	—総数—	423	100.0	212	100.0	635	100.0
	糖尿病教室受講	67	15.8	101	47.6	168	26.5
	糖尿病のパンフレット	143	33.8	123	58.0	266	41.9
	医療機関への受診勧奨	159	37.6	158	74.5	317	49.9
	何も受けていない	154	36.4	8	3.8	162	25.5
男性	—総数—	270	100.0	129	100.0	399	100.0
	糖尿病教室受講	38	14.1	64	49.6	102	25.6
	糖尿病のパンフレット	92	34.1	76	58.9	168	42.1
	医療機関への受診勧奨	108	40.0	98	76.0	206	51.6
	何も受けていない	98	36.3	5	3.9	103	25.8
女性	—総数—	153	100.0	83	100.0	236	100.0
	糖尿病教室受講	29	19.0	37	44.6	66	28.0
	糖尿病のパンフレット	51	33.3	47	56.6	98	41.5
	医療機関への受診勧奨	51	33.3	60	72.3	111	47.0
	何も受けていない	56	36.6	3	3.6	59	25.0

第31表 糖尿病の検査受診後の生活習慣の改善状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	改めた	1	10.0	2	16.7	15	24.2	30	19.4	78	35.0	61	33.2	187	28.9
	多少は改めた	4	40.0	7	58.3	31	50.0	83	53.5	103	46.2	95	51.6	323	50.0
	改めなかった	5	50.0	3	25.0	16	25.8	42	27.1	42	18.8	28	15.2	136	21.1
	—総数—	10	100.0	12	100.0	62	100.0	155	100.0	223	100.0	184	100.0	646	100.0
男性	改めた	0	0	0	0	9	23.7	15	14.2	48	33.1	36	34.3	108	26.5
	多少は改めた	2	40.0	5	62.5	18	47.4	54	50.9	63	43.4	54	51.4	196	48.2
	改めなかった	3	60.0	3	37.5	11	28.9	37	34.9	34	23.4	15	14.3	103	25.3
	—総数—	5	100.0	8	100.0	38	100.0	106	100.0	145	100.0	105	100.0	407	100.0
女性	改めた	1	20.0	2	50.0	6	25.0	15	30.6	30	38.5	25	31.6	79	33.1
	多少は改めた	2	40.0	2	50.0	13	54.2	29	59.2	40	51.3	41	51.9	127	53.1
	改めなかった	2	40.0	0	0	5	20.8	5	10.2	8	10.3	13	16.5	33	13.8
	—総数—	5	100.0	4	100.0	24	100.0	49	100.0	78	100.0	79	100.0	239	100.0

第32表 糖尿病の検査受診後の医療機関への受診状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	あり	1	10.0	4	33.3	31	50.0	101	65.2	170	76.2	141	76.6	448	69.3
	なし	9	90.0	8	66.7	31	50.0	54	34.8	53	23.8	43	23.4	198	30.7
	—総数—	10	100.0	12	100.0	62	100.0	155	100.0	223	100.0	184	100.0	646	100.0
男性	あり	0	0	2	25.0	18	47.4	65	61.3	107	73.8	78	74.3	270	66.3
	なし	5	100.0	6	75.0	20	52.6	41	38.7	38	26.2	27	25.7	137	33.7
	—総数—	5	100.0	8	100.0	38	100.0	106	100.0	145	100.0	105	100.0	407	100.0
女性	あり	1	20.0	2	50.0	13	54.2	36	73.5	63	80.8	63	79.7	178	74.5
	なし	4	80.0	2	50.0	11	45.8	13	26.5	15	19.2	16	20.3	61	25.5
	—総数—	5	100.0	4	100.0	24	100.0	49	100.0	78	100.0	79	100.0	239	100.0

第33表 糖尿病の検査受診後の医療機関への受診と治療状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	医療機関を受診せず	9	90.0	8	66.7	31	50.0	54	34.8	53	23.8	43	23.1	198	30.6
	医療機関を受診し、現在治療を受けている	1	10.0	1	8.3	15	24.2	44	28.4	90	40.4	93	50.0	244	37.7
	医療機関を受診し、以前治療を受けたことがある	0	0	1	8.3	2	3.2	17	11.0	25	11.2	13	7.0	58	9.0
	医療機関を受診し、治療経験ほとんどなし	0	0	2	16.7	13	21.0	36	23.2	46	20.6	32	17.2	129	19.9
	医療機関を受診し、治療状況不明	0	0	0	0	1	1.6	4	2.6	9	4.0	3	1.6	17	2.6
	医療機関の受診状況が不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.1	2	0.3
	—総数—	10	100.0	12	100.0	62	100.0	155	100.0	223	100.0	186	100.0	648	100.0
男性	医療機関を受診せず	5	100.0	6	75.0	20	52.6	41	38.7	38	26.2	27	25.5	137	33.6
	医療機関を受診し、現在治療を受けている	0	0	0	0	5	13.2	27	25.5	56	38.6	53	50.0	141	34.6
	医療機関を受診し、以前治療を受けたことがある	0	0	0	0	2	5.3	10	9.4	15	10.3	8	7.5	35	8.6
	医療機関を受診し、治療経験ほとんどなし	0	0	2	25.0	11	28.9	25	23.6	30	20.7	16	15.1	84	20.6
	医療機関を受診し、治療状況不明	0	0	0	0	0	0	3	2.8	6	4.1	1	0.9	10	2.5
	医療機関の受診状況が不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.9	1	0.2
	—総数—	5	100.0	8	100.0	38	100.0	106	100.0	145	100.0	106	100.0	408	100.0
女性	医療機関を受診せず	4	80.0	2	50.0	11	45.8	13	26.5	15	19.2	16	20.0	61	25.4
	医療機関を受診し、現在治療を受けている	1	20.0	1	25.0	10	41.7	17	34.7	34	43.6	40	50.0	103	42.9
	医療機関を受診し、以前治療を受けたことがある	0	0	1	25.0	0	0	7	14.3	10	12.8	5	6.3	23	9.6
	医療機関を受診し、治療経験ほとんどなし	0	0	0	0	2	8.3	11	22.4	16	20.5	16	20.0	45	18.8
	医療機関を受診し、治療状況不明	0	0	0	0	1	4.2	1	2.0	3	3.8	2	2.5	7	2.9
	医療機関の受診状況が不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.3	1	0.4
	—総数—	5	100.0	4	100.0	24	100.0	49	100.0	78	100.0	80	100.0	240	100.0



第34表 糖尿病の検査において異常を指摘されてから、初めて治療を開始するまでの期間（性・年齢階級別）

	初めて治療を開始するまでの期間	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		—計—	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	1年未満	2	100.0	2	100.0	14	73.7	56	86.2	95	79.2	85	78.0	254	80.1
	1年以上3年未満	0	0	0	0	2	10.5	2	3.1	11	9.2	8	7.3	23	7.3
	3年以上5年未満	0	0	0	0	1	5.3	2	3.1	2	1.7	3	2.8	8	2.5
	5年以上	0	0	0	0	2	10.5	5	7.7	12	10.0	13	11.9	32	10.1
	—総数—	2	100.0	2	100.0	19	100.0	65	100.0	120	100.0	109	100.0	317	100.0
男性	1年未満	0	0	0	0	8	88.9	32	82.1	54	74.0	47	74.6	141	76.6
	1年以上3年未満	0	0	0	0	1	11.1	1	2.6	7	9.6	6	9.5	15	8.2
	3年以上5年未満	0	0	0	0	0	0	1	2.6	2	2.7	2	3.2	5	2.7
	5年以上	0	0	0	0	0	0	5	12.8	10	13.7	8	12.7	23	12.5
	—総数—	0	0	0	0	9	100.0	39	100.0	73	100.0	63	100.0	184	100.0
女性	1年未満	2	100.0	2	100.0	6	60.0	24	92.3	41	87.2	38	82.6	113	85.0
	1年以上3年未満	0	0	0	0	1	10.0	1	3.8	4	8.5	2	4.3	8	6.0
	3年以上5年未満	0	0	0	0	1	10.0	1	3.8	0	0	1	2.2	3	2.3
	5年以上	0	0	0	0	2	20.0	0	0	2	4.3	5	10.9	9	6.8
	—総数—	2	100.0	2	100.0	10	100.0	26	100.0	47	100.0	46	100.0	133	100.0

第35表 糖尿病の検査結果別、異常を指摘されてから、初めて治療を開始するまでの期間（性別）

	初めて治療を開始するまでの期間	糖尿病の検査の結果				—計—	
		境界型		糖尿病		人数	%
		人数	%	人数	%		
男女計	1年未満	100	77.5	154	81.9	254	80.1
	1年以上3年未満	10	7.8	13	6.9	23	7.3
	3年以上5年未満	5	3.9	3	1.6	8	2.5
	5年以上	14	10.9	18	9.6	32	10.1
	—総数—	129	100.0	188	100.0	317	100.0
男性	1年未満	54	72.0	87	79.8	141	76.6
	1年以上3年未満	7	9.3	8	7.3	15	8.2
	3年以上5年未満	3	4.0	2	1.8	5	2.7
	5年以上	11	14.7	12	11.0	23	12.5
	—総数—	75	100.0	109	100.0	184	100.0
女性	1年未満	46	85.2	67	84.8	113	85.0
	1年以上3年未満	3	5.6	5	6.3	8	6.0
	3年以上5年未満	2	3.7	1	1.3	3	2.3
	5年以上	3	5.6	6	7.6	9	6.8
	—総数—	54	100.0	79	100.0	133	100.0