

○糖尿病に関する医療サービス

第45表 医師により糖尿病と言われた人の状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	言われたことがある	7	1.5	13	1.7	57	6.8	145	12.0	224	17.5	200	16.3	646	11.2
	言われたことがない	458	98.5	749	98.3	777	93.2	1,063	88.0	1,057	82.5	1,029	83.7	5,133	88.8
	—総数—	465	100.0	762	100.0	834	100.0	1,208	100.0	1,281	100.0	1,229	100.0	5,779	100.0
男性	言われたことがある	3	1.6	9	3.1	33	10.1	101	21.3	139	24.0	119	23.3	404	17.1
	言われたことがない	180	98.4	282	96.9	294	89.9	373	78.7	440	76.0	391	76.7	1,960	82.9
	—総数—	183	100.0	291	100.0	327	100.0	474	100.0	579	100.0	510	100.0	2,364	100.0
女性	言われたことがある	4	1.4	4	0.8	24	4.7	44	6.0	85	12.1	81	11.3	242	7.1
	言われたことがない	278	98.6	467	99.2	483	95.3	690	94.0	617	87.9	638	88.7	3,173	92.9
	—総数—	282	100.0	471	100.0	507	100.0	734	100.0	702	100.0	719	100.0	3,415	100.0

第46表 医師により糖尿病と言われた人の治療状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	現在治療を受けている	2	28.6	1	7.7	17	30.4	48	33.8	101	47.4	104	53.3	273	43.6
	以前治療を受けたことがある	0	0	1	7.7	5	8.9	20	14.1	34	16.0	22	11.3	82	13.1
	ほとんど治療を受けたことがない	5	71.4	11	84.6	34	60.7	74	52.1	78	36.6	69	35.4	271	43.3
	—総数—	7	100.0	13	100.0	56	100.0	142	100.0	213	100.0	195	100.0	626	100.0
男性	現在治療を受けている	0	0	0	0	7	21.2	30	30.3	61	46.2	61	52.1	159	40.5
	以前治療を受けたことがある	0	0	0	0	3	9.1	11	11.1	22	16.7	13	11.1	49	12.5
	ほとんど治療を受けたことがない	3	100.0	9	100.0	23	69.7	58	58.6	49	37.1	43	36.8	185	47.1
	—総数—	3	100.0	9	100.0	33	100.0	99	100.0	132	100.0	117	100.0	393	100.0
女性	現在治療を受けている	2	50.0	1	25.0	10	43.5	18	41.9	40	49.4	43	55.1	114	48.9
	以前治療を受けたことがある	0	0	1	25.0	2	8.7	9	20.9	12	14.8	9	11.5	33	14.2
	ほとんど治療を受けたことがない	2	50.0	2	50.0	11	47.8	16	37.2	29	35.8	26	33.3	86	36.9
	—総数—	4	100.0	4	100.0	23	100.0	43	100.0	81	100.0	78	100.0	233	100.0

第47表-1 糖尿病の治療状況別、ヘモグロビンA1c値の分布（男女計）

Hb A1c (%)	糖尿病の治療状況						— 計 —	
	現在治療を受けている		以前治療を受けたことがある		ほとんど治療を受けたことがない			
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
4.0-4.1	0	0	1	1.3	0	0	1	0.2
4.2-4.3	0	0	0	0	1	0.4	1	0.2
4.4-4.5	0	0	0	0	4	1.6	4	0.7
4.6-4.7	2	0.8	0	0	10	3.9	12	2.1
4.8-4.9	1	0.4	1	1.3	13	5.0	15	2.6
5.0-5.1	5	2.0	7	8.9	37	14.3	49	8.4
5.2-5.3	4	1.6	8	10.1	36	14.0	48	8.3
5.4-5.5	8	3.3	10	12.7	30	11.6	48	8.3
5.6-5.7	7	2.9	4	5.1	30	11.6	41	7.1
5.8-5.9	16	6.6	8	10.1	19	7.4	43	7.4
6.0	6	2.5	4	5.1	9	3.5	19	3.3
6.1	6	2.5	4	5.1	13	5.0	23	4.0
6.2	11	4.5	3	3.8	7	2.7	21	3.6
6.3	6	2.5	3	3.8	3	1.2	12	2.1
6.4	9	3.7	2	2.5	6	2.3	17	2.9
6.5	5	2.0	1	1.3	5	1.9	11	1.9
6.6	12	4.9	0	0	2	0.8	14	2.4
6.7	9	3.7	2	2.5	1	0.4	12	2.1
6.8	13	5.3	1	1.3	2	0.8	16	2.8
6.9	12	4.9	1	1.3	3	1.2	16	2.8
7.0-7.1	9	3.7	0	0	5	1.9	14	2.4
7.2-7.3	17	7.0	1	1.3	4	1.6	22	3.8
7.4-7.5	16	6.6	3	3.8	4	1.6	23	4.0
7.6-7.7	12	4.9	0	0	1	0.4	13	2.2
7.8-7.9	7	2.9	2	2.5	2	0.8	11	1.9
8.0-8.1	8	3.3	1	1.3	2	0.8	11	1.9
8.2-8.3	8	3.3	3	3.8	2	0.8	13	2.2
8.4-8.5	5	2.0	2	2.5	2	0.8	9	1.5
8.6-8.7	5	2.0	0	0	1	0.4	6	1.0
8.8-8.9	2	0.8	1	1.3	0	0	3	0.5
9.0-9.1	3	1.2	1	1.3	1	0.4	5	0.9
9.2-9.3	0	0	1	1.3	0	0	1	0.2
9.4-9.5	5	2.0	1	1.3	0	0	6	1.0
9.6-9.7	2	0.8	0	0	2	0.8	4	0.7
9.8-9.9	1	0.4	0	0	0	0	1	0.2
10.0以上	12	4.9	3	3.8	1	0.4	16	2.8
— 総数 —	244	100.0	79	100.0	258	100.0	581	100.0
(再掲)								
5.6%未満	20	8.2	27	34.2	131	50.8	178	30.6
5.6%以上6.1%未満	29	11.9	16	20.3	58	22.5	103	17.7
6.1%以上	195	79.9	36	45.6	69	26.7	300	51.6

第47表-2 糖尿病の治療状況別、ヘモグロビンA1c値の分布（男性）

Hb A1c (%)	糖尿病の治療状況						— 計 —	
	現在治療を受けている		以前治療を受けたことがある		ほとんど治療を受けたことがない			
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
4.0-4.1	0	0	1	2.1	0	0	1	0.3
4.2-4.3	0	0	0	0	1	0.6	1	0.3
4.4-4.5	0	0	0	0	3	1.7	3	0.8
4.6-4.7	1	0.7	0	0	9	5.1	10	2.7
4.8-4.9	1	0.7	1	2.1	10	5.6	12	3.3
5.0-5.1	4	2.8	4	8.5	30	16.9	38	10.3
5.2-5.3	3	2.1	3	6.4	23	13.0	29	7.9
5.4-5.5	6	4.2	8	17.0	15	8.5	29	7.9
5.6-5.7	3	2.1	2	4.3	18	10.2	23	6.3
5.8-5.9	13	9.0	4	8.5	12	6.8	29	7.9
6.0	3	2.1	4	8.5	7	4.0	14	3.8
6.1	2	1.4	1	2.1	9	5.1	12	3.3
6.2	6	4.2	1	2.1	5	2.8	12	3.3
6.3	5	3.5	1	2.1	2	1.1	8	2.2
6.4	4	2.8	1	2.1	4	2.3	9	2.4
6.5	0	0	0	0	4	2.3	4	1.1
6.6	6	4.2	0	0	1	0.6	7	1.9
6.7	5	3.5	2	4.3	0	0	7	1.9
6.8	6	4.2	1	2.1	1	0.6	8	2.2
6.9	8	5.6	0	0	2	1.1	10	2.7
7.0-7.1	6	4.2	0	0	4	2.3	10	2.7
7.2-7.3	9	6.3	1	2.1	3	1.7	13	3.5
7.4-7.5	12	8.3	3	6.4	3	1.7	18	4.9
7.6-7.7	7	4.9	0	0	1	0.6	8	2.2
7.8-7.9	5	3.5	2	4.3	2	1.1	9	2.4
8.0-8.1	6	4.2	1	2.1	1	0.6	8	2.2
8.2-8.3	5	3.5	3	6.4	2	1.1	10	2.7
8.4-8.5	3	2.1	0	0	2	1.1	5	1.4
8.6-8.7	2	1.4	0	0	1	0.6	3	0.8
8.8-8.9	0	.0	0	0	0	0	0	0.0
9.0-9.1	2	1.4	0	0	0	0	2	0.5
9.2-9.3	0	0	1	2.1	0	0	1	0.3
9.4-9.5	3	2.1	1	2.1	0	0	4	1.1
9.6-9.7	1	0.7	0	0	1	0.6	2	0.5
9.8-9.9	1	0.7	0	0	0	0	1	0.3
10.0以上	6	4.2	1	2.1	1	0.6	8	2.2
— 総数 —	144	100.0	47	100.0	177	100.0	368	100.0
(再掲)								
5.6%未満	15	10.4	17	36.2	91	51.4	123	33.4
5.6%以上6.1%未満	19	13.2	10	21.3	37	20.9	66	17.9
6.1%以上	110	76.4	20	42.6	49	27.7	179	48.6

第47表-3 糖尿病の治療状況別、ヘモグロビンA1c値の分布（女性）

Hb A1c (%)	糖尿病の治療状況						— 計 —	
	現在受けている		以前受けたことがある		ほとんど受けたことがない			
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
4.4～4.5	0	0	0	0	1	1.2	1	0.5
4.6～4.7	1	1.0	0	0	1	1.2	2	0.9
4.8～4.9	0	0	0	0	3	3.7	3	1.4
5.0～5.1	1	1.0	3	9.4	7	8.6	11	5.2
5.2～5.3	1	1.0	5	15.6	13	16.0	19	8.9
5.4～5.5	2	2.0	2	6.3	15	18.5	19	8.9
5.6～5.7	4	4.0	2	6.3	12	14.8	18	8.5
5.8～5.9	3	3.0	4	12.5	7	8.6	14	6.6
6.0	3	3.0	0	0	2	2.5	5	2.3
6.1	4	4.0	3	9.4	4	4.9	11	5.2
6.2	5	5.0	2	6.3	2	2.5	9	4.2
6.3	1	1.0	2	6.3	1	1.2	4	1.9
6.4	5	5.0	1	3.1	2	2.5	8	3.8
6.5	5	5.0	1	3.1	1	1.2	7	3.3
6.6	6	6.0	0	0	1	1.2	7	3.3
6.7	4	4.0	0	0	1	1.2	5	2.3
6.8	7	7.0	0	0	1	1.2	8	3.8
6.9	4	4.0	1	3.1	1	1.2	6	2.8
7.0～7.1	3	3.0	0	0	1	1.2	4	1.9
7.2～7.3	8	8.0	0	0	1	1.2	9	4.2
7.4～7.5	4	4.0	0	0	1	1.2	5	2.3
7.6～7.7	5	5.0	0	0	0	0	5	2.3
7.8～7.9	2	2.0	0	0	0	0	2	0.9
8.0～8.1	2	2.0	0	0	1	1.2	3	1.4
8.2～8.3	3	3.0	0	0	0	0	3	1.4
8.4～8.5	2	2.0	2	6.3	0	0	4	1.9
8.6～8.7	3	3.0	0	0	0	0	3	1.4
8.8～8.9	2	2.0	1	3.1	0	0	3	1.4
9.0～9.1	1	1.0	1	3.1	1	1.2	3	1.4
9.2～9.3	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9.4～9.5	2	2.0	0	0	0	0	2	0.9
9.6～9.7	1	1.0	0	0	1	1.2	2	0.9
9.8～9.9	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10.0以上	6	6.0	2	6.3	0	0	8	3.8
— 総数 —	100	100.0	32	100.0	81	100.0	213	100.0
(再掲)								
5.6%未満	5	5.0	10	31.3	40	49.4	55	25.8
5.6%以上6.1%未満	10	10.0	6	18.8	21	25.9	37	17.4
6.1%以上	85	85.0	16	50.0	20	24.7	121	56.8

第48表 医師により糖尿病と言われた人の治療内容（複数回答、性・年齢階級別）

	治療内容	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		— 計 —	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	—総数—	2	100.0	2	100.0	22	100.0	68	100.0	135	100.0	126	100.0	355	100.0
	食事指導	1	50.0	1	50.0	20	90.9	46	67.6	98	72.6	95	75.4	261	73.5
	運動指導	0	0	0	0	13	59.1	28	41.2	65	48.1	57	45.2	163	45.9
	飲みぐすり	1	50.0	2	100.0	9	40.9	42	61.8	79	58.5	81	64.3	214	60.3
	インスリン注射	1	50.0	0	0	2	9.1	6	8.8	15	11.1	9	7.1	33	9.3
	その他	0	0	0	0	0	0	2	2.9	4	3.0	4	3.2	10	2.8
男性	—総数—	0	0	0	0	10	100.0	41	100.0	83	100.0	74	100.0	208	100.0
	食事指導	0	0	0	0	9	90.0	29	70.7	60	72.3	59	79.7	157	75.5
	運動指導	0	0	0	0	8	80.0	19	46.3	42	50.6	34	45.9	103	49.5
	飲みぐすり	0	0	0	0	4	40.0	26	63.4	47	56.6	42	56.8	119	57.2
	インスリン注射	0	0	0	0	1	10.0	4	9.8	10	12.0	3	4.1	18	8.7
	その他	0	0	0	0	0	0	1	2.4	3	3.6	2	2.7	6	2.9
女性	—総数—	2	100.0	2	100.0	12	100.0	27	100.0	52	100.0	52	100.0	147	100.0
	食事指導	1	50.0	1	50.0	11	91.7	17	63.0	38	73.1	36	69.2	104	70.7
	運動指導	0	0	0	0	5	41.7	9	33.3	23	44.2	23	44.2	60	40.8
	飲みぐすり	1	50.0	2	100.0	5	41.7	16	59.3	32	61.5	39	75.0	95	64.6
	インスリン注射	1	50.0	0	0	1	8.3	2	7.4	5	9.6	6	11.5	15	10.2
	その他	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	1.9	2	3.8	4	2.7

第49表 糖尿病の治療状況別、治療内容（複数回答、性別）

	治療内容	糖尿病の治療状況						— 計 —	
		現在治療を受けている		以前治療を受けたことがある		ほとんど治療を受けたことがない			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	—総数—	273	100.0	82	100.0	0	0	355	100.0
	食事指導	194	71.1	67	81.7	0	0	261	73.5
	運動指導	130	47.6	33	40.2	0	0	163	45.9
	飲みぐすり	196	71.8	18	22.0	0	0	214	60.3
	インスリン注射	31	11.4	2	2.4	0	0	33	9.3
	その他	5	1.8	5	6.1	0	0	10	2.8
男性	—総数—	159	100.0	49	100.0	0	0	208	100.0
	食事指導	117	73.6	40	81.6	0	0	157	75.5
	運動指導	82	51.6	21	42.9	0	0	103	49.5
	飲みぐすり	106	66.7	13	26.5	0	0	119	57.2
	インスリン注射	16	10.1	2	4.1	0	0	18	8.7
	その他	3	1.9	3	6.1	0	0	6	2.9
女性	—総数—	114	100.0	33	100.0	0	0	147	100.0
	食事指導	77	67.5	27	81.8	0	0	104	70.7
	運動指導	48	42.1	12	36.4	0	0	60	40.8
	飲みぐすり	90	78.9	5	15.2	0	0	95	64.6
	インスリン注射	15	13.2	0	0	0	0	15	10.2
	その他	2	1.8	2	6.1	0	0	4	2.7

第50表 糖尿病の治療を初めて開始した年齢（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	7-14歳	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
	15-19歳	0	0	0	0	1	4.8	0	0	0	0	0	0	1	0.3
	20-29歳	1	50.0	1	50.0	1	4.8	0	0	0	0	1	0.8	4	1.1
	30-39歳	0	0	1	50.0	4	19.0	1	1.5	3	2.3	6	4.9	15	4.3
	40-49歳	0	0	0	0	15	71.4	35	51.5	19	14.4	13	10.6	82	23.6
	50-59歳	0	0	0	0	0	0	31	45.6	55	41.7	21	17.1	107	30.7
	60-69歳	0	0	0	0	0	0	1	1.5	55	41.7	46	37.4	102	29.3
	70歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	29.3	36	10.3
	—総数—	2	100.0	2	100.0	21	100.0	68	100.0	132	100.0	123	100.0	348	100.0
男性	7-14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15-19歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-29歳	0	0	0	0	1	10.0	0	0	0	0	1	1.4	2	1.0
	30-39歳	0	0	0	0	2	20.0	1	2.4	2	2.5	3	4.2	8	3.9
	40-49歳	0	0	0	0	7	70.0	25	61.0	13	16.3	9	12.5	54	26.6
	50-59歳	0	0	0	0	0	0	14	34.1	35	43.8	14	19.4	63	31.0
	60-69歳	0	0	0	0	0	0	1	2.4	30	37.5	27	37.5	58	28.6
	70歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	25.0	18	8.9
	—総数—	0	0	0	0	10	100.0	41	100.0	80	100.0	72	100.0	203	100.0
女性	7-14歳	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	15-19歳	0	0	0	0	1	9.1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	20-29歳	1	50.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.4
	30-39歳	0	0	1	50.0	2	18.2	0	0	1	1.9	3	5.9	7	4.8
	40-49歳	0	0	0	0	8	72.7	10	37.0	6	11.5	4	7.8	28	19.3
	50-59歳	0	0	0	0	0	0	17	63.0	20	38.5	7	13.7	44	30.3
	60-69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	25	48.1	19	37.3	44	30.3
	70歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	35.3	18	12.4
	—総数—	2	100.0	2	100.0	11	100.0	27	100.0	52	100.0	51	100.0	145	100.0

第51表 糖尿病診療における眼底検査の状況（性・年齢階級別）

		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		一計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男女計	あり	3	50.0	4	30.8	36	64.3	90	63.4	164	74.9	145	73.2	442	69.7
	なし	3	50.0	9	69.2	20	35.7	52	36.6	55	25.1	53	26.8	192	30.3
	—総数—	6	100.0	13	100.0	56	100.0	142	100.0	219	100.0	198	100.0	634	100.0
男性	あり	0	0	3	33.3	21	65.6	61	62.2	102	75.0	85	72.6	272	69.0
	なし	2	100.0	6	66.7	11	34.4	37	37.8	34	25.0	32	27.4	122	31.0
	—総数—	2	100.0	9	100.0	32	100.0	98	100.0	136	100.0	117	100.0	394	100.0
女性	あり	3	75.0	1	25.0	15	62.5	29	65.9	62	74.7	60	74.1	170	70.8
	なし	1	25.0	3	75.0	9	37.5	15	34.1	21	25.3	21	25.9	70	29.2
	—総数—	4	100.0	4	100.0	24	100.0	44	100.0	83	100.0	81	100.0	240	100.0