

8 結果の推計と標準誤差率

(1) 推計方法

ア 診療行為分

この調査は、層化無作為二段抽出法によるので、以下の方法により総点数、総件数、1件当たり点数を推計した。また、全薬剤点数、全薬剤件数、1件当たり全薬剤点数についても同様の方法により推計した。

(推計式の総点数、総件数、1件当たり点数を、それぞれ全薬剤点数、全薬剤件数、1件当たり全薬剤点数と置き換えること。)

$$\text{総点数} \quad \hat{T} = \sum_{i=1}^L \frac{M_i}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{N_{ij}}{n_{ij}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} = \sum_{i=1}^L R1_i \sum_{j=1}^{m_i} R2_{ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk}$$

$$\text{総件数} \quad \hat{N} = \sum_{i=1}^L \frac{M_i}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{N_{ij}}{n_{ij}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} y_{ijk} = \sum_{i=1}^L R1_i \sum_{j=1}^{m_i} R2_{ij} n_{ij}$$

$$\text{1件当たり点数} \quad \hat{R} = \frac{\hat{T}}{\hat{N}}$$

標準誤差は、以下の方法により計算した。

$$\text{総点数の標準誤差 } C_{\hat{T}} = \sqrt{V(\hat{T})}$$

$$\begin{aligned} V(\hat{T}) &= \sum_{i=1}^L \left\{ M_i (M_i - m_i) \frac{(S_i^T)^2}{m_i} + \frac{M_i}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} N_{ij} (N_{ij} - n_{ij}) \frac{(S_{ij}^x)^2}{n_{ij}} \right\} \\ &= \sum_{i=1}^L \left\{ m_i R_{1i} (R_{1i} - 1) (S_i^T)^2 + R_{1i} \sum_{j=1}^{m_i} n_{ij} R_{2ij} (R_{2ij} - 1) (S_{ij}^x)^2 \right\} \end{aligned}$$

$$\text{総件数の標準誤差 } C_{\hat{N}} = \sqrt{V(\hat{N})}$$

$$\begin{aligned} V(\hat{N}) &= \sum_{i=1}^L \left\{ M_i (M_i - m_i) \frac{(S_i^N)^2}{m_i} + \frac{M_i}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} N_{ij} (N_{ij} - n_{ij}) \frac{(S_{ij}^y)^2}{n_{ij}} \right\} \\ &= \sum_{i=1}^L \left\{ m_i R_{1i} (R_{1i} - 1) (S_i^N)^2 \right\} \end{aligned}$$

$$\text{1件当たり点数の標準誤差 } C_{\hat{R}} = \sqrt{V(\hat{R})}$$

$$\begin{aligned} V(\hat{R}) &= \frac{1}{\hat{N}^2} \sum_{i=1}^L \left\{ \frac{M_i (M_i - m_i)}{m_i} \left((S_i^T)^2 - 2\hat{R} \text{Cov}(\hat{T}_{ij}, N_{ij}) + \hat{R}^2 (S_i^N)^2 \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{M_i}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{N_{ij} (N_{ij} - n_{ij})}{n_{ij}} \left((S_{ij}^x)^2 - 2\hat{R} \text{Cov}(x_{ijk}, y_{ijk}) + \hat{R}^2 (S_{ij}^y)^2 \right) \right\} \frac{1}{(\mu_i^y)^2} \\ &= \frac{1}{\hat{N}^2} \hat{N}^2 \hat{R}^2 \sum_{i=1}^L \left\{ m_i R_{1i} (R_{1i} - 1) \left(\frac{(S_i^T)^2}{\hat{T}^2} + \frac{(S_i^N)^2}{\hat{N}^2} - 2 \frac{\text{Cov}(\hat{T}_{ij}, N_{ij})}{\hat{T}\hat{N}} \right) \right. \\ &\quad \left. + R_{1i} \sum_{j=1}^{m_i} n_{ij} R_{2ij} (R_{2ij} - 1) \left(\frac{(S_{ij}^x)^2}{\hat{T}^2} + \frac{(S_{ij}^y)^2}{\hat{N}^2} - 2 \frac{\text{Cov}(x_{ijk}, y_{ijk})}{\hat{T}\hat{N}} \right) \right\} \frac{1}{1} \\ &= \hat{R}^2 \sum_{i=1}^L \left\{ m_i R_{1i} (R_{1i} - 1) \left(\frac{(S_i^T)^2}{\hat{T}^2} + \frac{(S_i^N)^2}{\hat{N}^2} - 2 \frac{\text{Cov}(\hat{T}_{ij}, N_{ij})}{\hat{T}\hat{N}} \right) \right. \\ &\quad \left. + R_{1i} \sum_{j=1}^{m_i} n_{ij} R_{2ij} (R_{2ij} - 1) \frac{(S_{ij}^x)^2}{\hat{T}^2} \right\} \end{aligned}$$

$$(S_i^T)^2 = \frac{1}{m_i - 1} \sum_{j=1}^{m_i} (\hat{T}_{ij} - \hat{T}_i)^2 = \frac{1}{m_i - 1} \sum_{j=1}^{m_i} \left(R_{2ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} \right)^2 - \frac{1}{m_i (m_i - 1)} \left(\sum_{j=1}^{m_i} R_{2ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} \right)^2$$

$$\hat{T}_{ij} = \frac{N_{ij}}{n_{ij}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} = R_{2ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk}$$

$$\hat{T}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \hat{T}_{ij} = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} R_{2ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk}$$

$$(S_{ij}^x)^2 = \frac{1}{n_{ij}-1} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})^2 = \frac{1}{n_{ij}-1} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk}^2 - \frac{1}{n_{ij}(n_{ij}-1)} \left(\sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} \right)^2$$

$$\bar{x}_{ij} = \frac{1}{n_{ij}} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk}$$

$$(S_i^N)^2 = \frac{1}{m_i-1} \sum_{j=1}^{m_i} (N_{ij} - \bar{N}_i)^2 = \frac{1}{m_i-1} \sum_{j=1}^{m_i} (n_{ij} R2_{ij})^2 - \frac{1}{m_i(m_i-1)} \left(\sum_{j=1}^{m_i} n_{ij} R2_{ij} \right)^2$$

$$\bar{N}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} N_{ij}$$

$$(S_{ij}^y)^2 = \frac{1}{n_{ij}-1} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (y_{ijk} - \bar{y}_{ij})^2 = \frac{1}{n_{ij}-1} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (1-1)^2 = 0$$

$$\text{Cov}(\hat{T}_{ij}, N_{ij}) = \frac{1}{m_i-1} \sum_{j=1}^{m_i} (\hat{T}_{ij} - \hat{T}_i)(N_{ij} - \bar{N}_i) = \frac{1}{m_i-1} \sum_{j=1}^{m_i} \hat{T}_{ij} N_{ij} - \frac{m_i}{m_i-1} \hat{T}_i \bar{N}_i$$

$$= \frac{1}{m_i-1} \sum_{j=1}^{m_i} R2_{ij}^2 n_{ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} - \frac{1}{m_i(m_i-1)} \left(\sum_{j=1}^{m_i} R2_{ij} \sum_{k=1}^{n_{ij}} x_{ijk} \right) \left(\sum_{j=1}^{m_i} n_{ij} R2_{ij} \right)$$

$$\text{Cov}(x_{ijk}, y_{ijk}) = \frac{1}{n_{ij}-1} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})(y_{ijk} - \bar{y}_{ij}) = \frac{1}{n_{ij}-1} \sum_{k=1}^{n_{ij}} (x_{ijk} - \bar{x}_{ij})(1-1) = 0$$

$$\mu_i^y = \frac{1}{\sum_{j=1}^{m_i} N_{ij}} \sum_{j=1}^{m_i} N_{ij} = 1$$

L	: 層数	y_{ijk}	: $y_{ijk} = 1$ for $1 \leq i \leq L, 1 \leq j \leq m_i,$ $1 \leq k \leq n_{ij}$
$R1_i$: 第 i 層第 1 次抽出率逆数	\hat{T}_{ij}	: 第 i 層第 j 施設の総点数
	(標本抽出時から調査時までの間の施設の 種類の変更等を考慮し、補整を加えている)	\hat{T}_i	: 第 i 層の 1 施設当たりの平均総点数
$R2_{ij}$: 第 i 層第 j 施設第 2 次抽出率逆数	\bar{N}_i	: 第 i 層の 1 施設当たりの平均総件数
m_i	: 第 i 層標本施設数	\bar{x}_{ij}	: 第 i 層第 j 施設の 1 件当たりの平均点数
M_i	: 第 i 層母施設数 $M_i = m_i R1_i$	$(S_i^T)^2$: 第 i 層の施設ごとの総点数間の分散
n_{ij}	: 第 i 層第 j 施設標本件数(レセプト件数)	$(S_i^N)^2$: 第 i 層の施設ごとの総件数間の分散
N_{ij}	: 第 i 層第 j 施設母件数 (レセプト件数)	$(S_{ij}^x)^2$: 第 i 層第 j 施設の点数間の分散
	$N_{ij} = n_{ij} R2_{ij}$	$\text{Cov}(\hat{T}_{ij}, N_{ij})$: 第 i 層の施設ごとの総点数と総件 数間の共分散
x_{ijk}	: 第 i 層第 j 施設第 k 件の点数		

イ 調剤行為分

調剤行為分の調査も、層化無作為二段抽出法によっているので、「ア 診療行為分」と同様の方法により推計した。ただし、1 件当たり全薬剤点数については、全薬剤点数を総件数で除して推計した。

(2) 標準誤差率

この調査は標本調査であるため、推計値のもつ誤差のひとつとして、標本抽出に起因する標本誤差がある。標本誤差の大きさは、調査項目の種類によって異なるが、以下の表はそれらを「標準誤差率（推計値の大きさに対する標準誤差の百分率）」で示したものである。推計値を中心としてその前後に標準誤差の2倍ずつの幅をとれば、その中に、全数調査から得られるはずの値が約95%の確率で存在すると考えてよい。

ア 診療報酬明細書（医科診療・歯科診療）分

総点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数			一 般 医 療			後 期 医 療		
	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所
医 科 診 療									
総 数	1.1	1.4	1.0	1.4	1.9	1.2	1.8	2.2	2.0
入 院	1.7	1.7	2.0	2.3	2.4	2.6	2.5	2.6	2.9
入 院 外	1.2	2.6	1.1	1.6	3.3	1.2	2.0	3.8	2.2
歯 科 診 療	2.0			2.1			5.4		

総件数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数			一 般 医 療			後 期 医 療		
	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所
医 科 診 療									
総 数	0.7	1.3	0.8	0.8	1.6	0.9	1.4	2.1	1.8
入 院	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.4
入 院 外	0.7	1.4	0.8	0.8	1.7	0.9	1.5	2.4	1.8
歯 科 診 療	1.8			2.0			4.4		

1件当たり点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数			一 般 医 療			後 期 医 療		
	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所
医 科 診 療									
総 数	1.1	1.6	0.8	1.3	2.0	0.9	1.8	2.5	1.5
入 院	1.1	1.1	1.6	1.5	1.5	2.2	1.5	1.5	2.1
入 院 外	1.0	2.1	0.8	1.3	2.7	0.9	1.6	2.9	1.5
歯 科 診 療	1.1			1.2			2.9		

イ 診療報酬明細書（薬剤）分

全薬剤点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数			一 般 医 療			後 期 医 療		
	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所
総 数	2.7	4.3	2.1	3.8	6.1	2.6	3.2	4.8	3.6
入 院	3.9	4.1	2.5	5.5	5.7	3.3	5.5	6.0	3.6
入 院 外	3.2	5.9	2.2	4.4	8.0	2.7	3.8	6.9	3.7

全薬剤件数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数			一 般 医 療			後 期 医 療		
	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所
総 数	1.1	2.1	1.3	1.3	2.5	1.5	2.2	3.8	2.7
入 院	1.5	1.7	1.2	2.0	2.2	1.7	2.4	2.7	1.6
入 院 外	1.2	2.3	1.3	1.3	2.7	1.5	2.3	4.6	2.7

1件当たり全薬剤点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数			一 般 医 療			後 期 医 療		
	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所	総 数	病 院	診 療 所
総 数	2.4	3.8	1.4	3.5	5.6	1.9	2.4	3.6	1.8
入 院	3.4	3.6	2.2	5.0	5.2	3.1	4.6	5.0	2.8
入 院 外	2.9	5.3	1.4	4.1	7.3	1.9	2.6	4.7	1.9

ウ 調剤報酬明細書分

総点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数	一 般 医 療	後 期 医 療
総 数	0.9	1.2	1.4

総件数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数	一 般 医 療	後 期 医 療
総 数	0.6	0.7	1.1

1件当たり点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数	一 般 医 療	後 期 医 療
総 数	0.7	1.0	0.9

全薬剤点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数	一 般 医 療	後 期 医 療
総 数	1.1	1.5	1.6

全薬剤件数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数	一 般 医 療	後 期 医 療
総 数	0.6	0.7	1.1

1件当たり全薬剤点数の標準誤差率

(単位：%)

(平成22年6月審査分)

	総 数	一 般 医 療	後 期 医 療
総 数	0.9	1.3	1.1