

第6表 性別にみた死因順位（第10位まで）別 死亡数・死亡率（人口10万対）・構成割合

死 因 <sup>1)</sup>	平成 29 年				平成 28 年				対前年増減	
	死 <sup>2)</sup> 因 順 位	死亡数 (人)	死亡率	死亡総数に 占める割合 (%)	死 <sup>2)</sup> 因 順 位	死亡数 (人)	死亡率	死亡総数に 占める割合 (%)	死亡数 (人)	死亡率
総 数										
全 死 因		1 340 397	1 075.3	100.0		1 307 748	1 046.0	100.0	32 649	29.3
悪性新生物<腫瘍>	(1)	373 334	299.5	27.9	(1)	372 986	298.3	28.5	348	1.2
心疾患 <sup>4)</sup>	(2)	204 837	164.3	15.3	(2)	198 006	158.4	15.1	6 831	5.9
脳血管疾患	(3)	109 880	88.2	8.2	(4)	109 320	87.4	8.4	560	0.8
老衰	(4)	101 396	81.3	7.6	(5)	92 806	74.2	7.1	8 590	7.1
肺炎 <sup>5)</sup>	(5)	96 841	77.7	7.2	(3)	119 300	95.4	9.1	△22 459	△ 17.7
不慮の事故	(6)	40 329	32.4	3.0	(6)	38 306	30.6	2.9	2 023	1.8
誤嚥性肺炎 <sup>3)</sup>	(7)	35 788	28.7	2.7		38 650	30.9	3.0	△ 2 862	△ 2.2
腎不全	(8)	25 134	20.2	1.9	(7)	24 612	19.7	1.9	522	0.5
自殺	(9)	20 465	16.4	1.5	(8)	21 017	16.8	1.6	△ 552	△ 0.4
血管性等の認知症 <sup>4)</sup>	(10)	19 546	15.7	1.5	(14)	11 894	9.5	1.2	7 652	6.2
男										
全 死 因		690 683	1 138.3	100.0		674 733	1 108.5	100.0	15 950	29.8
悪性新生物<腫瘍>	(1)	220 398	363.2	31.9	(1)	219 785	361.1	32.6	613	2.1
心疾患 <sup>4)</sup>	(2)	96 319	158.7	13.9	(2)	93 419	153.5	13.8	2 900	5.2
脳血管疾患	(3)	53 188	87.7	7.7	(4)	52 706	86.6	7.8	482	1.1
肺炎 <sup>5)</sup>	(4)	53 134	87.6	7.7	(3)	65 636	107.8	9.7	△12 502	△ 20.2
老衰	(5)	25 807	42.5	3.7	(5)	23 077	37.9	3.4	2 730	4.6
不慮の事故	(6)	23 091	38.1	3.3	(6)	22 066	36.3	3.3	1 025	1.8
誤嚥性肺炎 <sup>3)</sup>	(7)	20 091	33.1	2.9		21 730	35.7	3.2	△ 1 639	△ 2.6
慢性閉塞性肺疾患(COPD)	(8)	15 266	25.2	2.2	(8)	12 649	20.8	1.9	2 617	4.4
自殺	(9)	14 333	23.6	2.1	(7)	14 639	24.1	2.2	△ 306	△ 0.5
腎不全	(10)	12 569	20.7	1.8	(9)	12 231	20.1	1.8	338	0.6
女										
全 死 因		649 714	1 015.6	100.0		633 015	986.7	100.0	16 699	28.9
悪性新生物<腫瘍>	(1)	152 936	239.1	23.5	(1)	153 201	238.8	24.2	△ 265	0.3
心疾患 <sup>4)</sup>	(2)	108 518	169.6	16.7	(2)	104 587	163.0	16.5	3 931	6.6
老衰	(3)	75 589	118.2	11.6	(3)	69 729	108.7	11.0	5 860	9.5
脳血管疾患	(4)	56 692	88.6	8.7	(4)	56 614	88.2	8.9	78	0.4
肺炎 <sup>5)</sup>	(5)	43 707	68.3	6.7	(5)	53 664	83.6	8.5	△ 9 957	△ 15.3
不慮の事故	(6)	17 238	26.9	2.7	(6)	16 240	25.3	2.6	998	1.6
誤嚥性肺炎 <sup>3)</sup>	(7)	15 697	24.5	2.4		16 920	26.4	2.7	△ 1 223	△ 1.9
腎不全	(8)	12 565	19.6	1.9	(7)	12 381	19.3	2.0	184	0.3
血管性等の認知症 <sup>4)</sup>	(9)	12 551	19.6	1.9	(9)	8 517	13.3	1.3	4 034	6.3
アルツハイマー病	(10)	11 177	17.5	1.7	(10)	8 222	12.8	1.3	2 955	4.7

注：1) 死因分類は、平成29年は「ICD-10（2013年版）」（平成29年適用）、平成28年は「ICD-10（2003年版）」（平成18年適用）によるものである。

2) ( )内の数字は、死因順位を示す。

3) 「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年の順位はつけていない。また、平成28年の死亡数（人）は「J69 固形物及び液状物による肺臓炎」の数値である。

4) 「心疾患」は「心疾患（高血圧性を除く）」、「血管性等の認知症」は「血管性及び詳細不明の認知症」である。

5) 平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、「ICD-10（2013年版）」（平成29年適用）による原死因選択ルールの特異化によるものと考えられる。