

【照会先】

政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室
統計管理官 楠田
室長補佐 黒木（内線 7470）
計析第一係 （内線 7471）
（代表電話） 03（5253） 1111
（直通電話） 03（3595） 2812

令和7(2025)年簡易生命表の概況

目 次

	頁
簡易生命表について.....	1
1 主な年齢の平均余命.....	2
2 寿命中位数等生命表上の生存状況.....	3
3 平均寿命の国際比較.....	4
4 死因分析.....	6
令和7(2025)年簡易生命表（男）.....	8
令和7(2025)年簡易生命表（女）.....	10
参考資料1 生命表諸関数の定義.....	12
参考資料2 主な年齢の平均余命の年次推移.....	13
参考資料3-1 死因別死亡確率の推移.....	14
参考資料3-2 特定死因を除去した場合の平均余命の延びの推移.....	15

この資料は、厚生労働省のホームページに掲載しています。

(URL) <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life25/index.html>

簡易生命表について

(1) 生命表とは

生命表は、ある期間における死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものである。

これらの指標は、男女別に各年齢の人口と死亡数を基にして計算しており、現実の年齢構成には左右されず、死亡状況のみを表している。したがって、死亡状況を厳密に分析する上で不可欠なものとなっている。また、0歳の平均余命である「平均寿命」は、全ての年齢の死亡状況を集約したものとなっており、保健福祉水準を総合的に示す指標として広く活用されている。

(2) 令和7(2025)年簡易生命表

令和7(2025)年簡易生命表は、令和7年1月1日から12月31日までの1年間を作成基礎期間としている。

(3) 基礎資料

令和7(2025)年簡易生命表は、人口動態統計月報年計(概数)による日本における日本人の死亡数(令和7年)及び出生数(令和6～7年)、令和7年人口推計による日本人人口を基礎資料としている。

<利用上の注意>

① 表章記号の規約

減少数(率)の場合	△
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	...

② 掲載の数値は四捨五入して記載していることから、これらの数値の四則演算結果が対応する数値と合わない場合がある。

③ 公表している生命表の資料は次のとおりである。

簡易生命表(基幹統計) 作成頻度：毎年 作成方法：人口推計による 日本人人口、人口動態統計 (概数)をもとに作成	完全生命表(基幹統計) 作成頻度：5年ごと 作成方法：国勢調査による 日本人人口(確定数)、人口動態統計 (確定数)をもとに作成	都道府県別生命表 作成頻度：5年ごと 作成方法：国勢調査による 日本人人口(確定数)、国勢調査年を含む 前後3年間の人口動態統計(確定数)をもとに作成	市区町村別生命表 作成頻度：5年ごと 作成方法：国勢調査による 日本人人口(確定数)、国勢調査年を含む 前後3年間の人口動態統計(確定数)をもとに作成
--	--	---	---

※本概況は太線の部分である。

※令和7(2025)年は国勢調査実施年であり、完全生命表を作成予定である。

1 主な年齢の平均余命

令和7(2025)年簡易生命表によると、男の平均寿命(0歳の平均余命のこと。以下同じ。)は81.35年、女の平均寿命は87.33年となり、前年と比較して男は0.25年、女は0.20年上回っている。平均寿命の男女差は5.98年で、前年より0.05年縮小している。また、主な年齢の平均余命をみると、男女ともに全年齢で前年を上回っている。(表1、表2)

平均寿命の前年との差を死因別に分解すると、男女ともに悪性新生物<腫瘍>、心疾患(高血圧性を除く)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの死亡率の変化が平均寿命を延ばす方向に働いている。一方、肺炎、老衰などの死亡率の変化が平均寿命を縮める方向に働いている。(図1)

表1 主な年齢の平均余命


年齢	男			女		
	令和7年	令和6年	前年との差	令和7年	令和6年	前年との差
0歳	81.35	81.09	0.25	87.33	87.13	0.20
5	76.57	76.29	0.28	82.54	82.34	0.19
10	71.60	71.32	0.28	77.56	77.37	0.19
15	66.63	66.36	0.28	72.60	72.41	0.19
20	61.72	61.44	0.28	67.67	67.48	0.19
25	56.85	56.58	0.27	62.77	62.58	0.19
30	51.98	51.71	0.28	57.85	57.67	0.18
35	47.12	46.85	0.27	52.94	52.76	0.18
40	42.29	42.03	0.27	48.05	47.88	0.18
45	37.52	37.26	0.26	43.20	43.03	0.17
50	32.82	32.57	0.25	38.41	38.24	0.17
55	28.26	28.01	0.25	33.70	33.54	0.16
60	23.86	23.63	0.23	29.07	28.92	0.15
65	19.68	19.47	0.22	24.52	24.38	0.14
70	15.78	15.60	0.18	20.10	19.97	0.13
75	12.24	12.08	0.16	15.88	15.75	0.13
80	9.10	8.96	0.14	11.95	11.83	0.12
85	6.44	6.31	0.13	8.47	8.37	0.11
90	4.38	4.27	0.11	5.66	5.55	0.10

表2 平均寿命の年次推移

和暦	男	女	男女差
昭和22年	50.06	53.96	3.90
25-27	59.57	62.97	3.40
30	63.60	67.75	4.15
35	65.32	70.19	4.87
40	67.74	72.92	5.18
45	69.31	74.66	5.35
50	71.73	76.89	5.16
55	73.35	78.76	5.41
60	74.78	80.48	5.70
平成2	75.92	81.90	5.98
7	76.38	82.85	6.47
12	77.72	84.60	6.88
17	78.56	85.52	6.96
22	79.55	86.30	6.75
27	80.75	86.99	6.24
令和2	81.56	87.71	6.15
3	81.47	87.57	6.10
4	81.05	87.09	6.03
5	81.09	87.14	6.05
6	81.09	87.13	6.03
7	81.35	87.33	5.98

注:1) 令和2年以前は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

図1 平均寿命の前年との差に対する死因別寄与年数(令和7年)



注: 交通事故は、不慮の事故の再掲である。

死 因		(単位:年)	
計(前年との差)		男	女
悪性新生物<腫瘍>		0.10	0.05
糖尿病		0.00	0.00
高血圧性疾患		△ 0.00	0.00
心疾患(高血圧性を除く)		0.05	0.06
脳血管疾患		0.02	0.01
大動脈瘤及び解離		0.00	△ 0.00
肺炎		△ 0.02	△ 0.01
肝疾患		0.01	0.00
腎不全		0.00	0.00
老衰		△ 0.01	△ 0.01
不慮の事故		0.01	0.01
交通事故(再掲)		0.00	△ 0.00
自殺		0.01	0.02
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		0.08	0.06
その他		△ 0.00	0.01
悪性新生物<腫瘍>、心疾患(高血圧性を除く)及び脳血管疾患(再掲)		0.17	0.12

2 寿命中位数等生命表上の生存状況

令和7(2025)年簡易生命表によると、男女それぞれ10万人の出生に対して65歳の生存数は、男89,892人、女94,533人となっている。これは65歳まで生存する者の割合が男は89.9%、女は94.5%であることを示している。同様に、75歳まで生存する者の割合は男76.0%、女88.1%、90歳まで生存する者の割合は男26.7%、女50.8%となっている。(令和7(2025)年簡易生命表(p 8～11)、表3、図2)


生命表上で、出生者のうちちょうど半数が生存すると期待される年数を寿命中位数という。令和7年においては、男84.13年、女90.17年となっており、平均寿命を男は2.78年、女は2.84年上回っている。(表4、図3)

表3 生命表上の特定年齢まで生存する者の割合の年次推移

和暦	男					女				
	40歳	65歳	75歳	90歳	95歳	40歳	65歳	75歳	90歳	95歳
昭和22年	68.0	39.8	18.5	0.9	0.1	70.9	49.1	29.0	2.0	0.2
25-27	81.8	55.1	29.4	2.0	0.3	83.2	62.8	40.5	4.0	0.6
30	87.0	61.8	34.6	2.7	0.5	89.0	70.6	47.6	6.2	1.3
35	89.7	64.8	36.1	2.3	0.4	92.2	75.2	51.5	6.0	1.2
40	92.6	69.1	39.9	2.3	0.3	95.0	80.0	57.1	6.5	1.2
45	93.7	72.1	43.5	3.5	0.6	96.1	82.6	61.2	8.6	1.9
50	95.1	76.8	51.0	5.4	1.1	96.9	86.1	67.8	12.0	2.9
55	96.1	79.4	55.7	7.1	1.5	97.6	88.5	72.7	16.0	4.2
60	96.7	81.1	60.2	9.4	2.2	98.0	90.1	76.9	21.2	6.4
平成2	97.1	82.6	63.0	11.6	3.0	98.3	91.3	79.8	26.3	9.0
7	97.2	83.3	63.8	12.8	3.4	98.4	91.6	81.2	30.9	11.9
12	97.5	84.7	66.7	17.3	5.7	98.6	92.6	83.7	38.8	17.7
17	97.7	85.7	69.3	19.3	6.5	98.7	93.1	85.1	42.7	20.8
22	97.9	87.0	72.2	21.5	7.3	98.8	93.6	86.5	46.2	22.8
27	98.2	88.8	74.6	24.9	8.6	99.0	94.2	87.7	49.1	24.5
令和2	98.4	89.7	76.0	28.1	10.5	99.0	94.6	88.4	52.6	27.9
3	98.4	89.8	76.0	27.5	10.1	99.0	94.6	88.3	52.0	27.1
4	98.4	89.6	75.3	25.5	8.7	98.9	94.4	87.9	49.8	25.0
5	98.3	89.5	75.3	26.0	9.2	98.9	94.4	87.9	50.1	25.5
6	98.4	89.6	75.3	25.8	9.3	98.9	94.4	87.9	50.2	25.6
7	98.4	89.9	76.0	26.7	9.9	98.9	94.5	88.1	50.8	26.4

注：1) 令和2年以前は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

図2 生命表上の特定年齢まで生存する者の割合の年次推移




注：1) 平成27年以前及び令和2年は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

表4 寿命中位数と平均寿命の年次推移

和暦	男			女		
	寿命中位数	平均寿命	寿命中位数と平均寿命の差	寿命中位数	平均寿命	寿命中位数と平均寿命の差
昭和22年	59.28	50.06	9.22	64.45	53.96	10.49
25-27	67.22	59.57	7.65	71.31	62.97	8.34
30	69.79	63.60	6.19	74.19	67.75	6.44
35	70.66	65.32	5.34	75.44	70.19	5.25
40	72.00	67.74	4.26	77.04	72.92	4.12
45	73.10	69.31	3.79	78.19	74.66	3.53
50	75.31	71.73	3.58	80.17	76.89	3.28
55	76.69	73.35	3.34	81.75	78.76	2.99
60	78.06	74.78	3.28	83.38	80.48	2.90
平成2	79.13	75.92	3.21	84.71	81.90	2.81
7	79.49	76.38	3.11	85.73	82.85	2.88
12	80.74	77.72	3.02	87.41	84.60	2.81
17	81.56	78.56	3.00	88.34	85.52	2.82
22	82.60	79.55	3.05	89.17	86.30	2.87
27	83.76	80.75	3.01	89.79	86.99	2.80
令和2	84.51	81.56	2.95	90.55	87.71	2.84
3	84.39	81.47	2.92	90.42	87.57	2.85
4	83.93	81.05	2.88	89.96	87.09	2.88
5	83.99	81.09	2.90	90.02	87.14	2.88
6	83.89	81.09	2.79	90.04	87.13	2.91
7	84.13	81.35	2.78	90.17	87.33	2.84

注：1) 令和2年以前は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

図3 寿命中位数と平均寿命の年次推移



注：1) 平成27年以前及び令和2年は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

3 平均寿命の国際比較

平均寿命の諸外国との比較は、国によって作成基礎期間や作成方法が異なるため、厳密な比較は困難であるが、現在入手している資料を用いて比較すると、表5のとおりである。

図4は、主な国の平均寿命の年次推移を図示したものである。

表5 平均寿命の国際比較

		(単位：年)			
	国名	作成基礎期間	男	女	(参考)人口 (万人)
	日本 (Japan)	2025	81.35	87.33	11 938
アフリカ (AFRICA)	アルジェリア (Algeria)	2023*	78.2	81.0	4 634
	コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo)	2018*	56.5	59.7	10 525
	エジプト (Egypt)	2025	69.4	74.4	10 656
	南アフリカ (South Africa)	2024*	65.08	71.23	6 302
	チュニジア (Tunisia)	2023	74.7	79.3	1 183
北アメリカ (NORTH AMERICA)	カナダ (Canada)	2022 - 2024	79.47	83.79	4 129
	コスタリカ (Costa Rica)	2024*	78.45	83.38	531
	メキシコ (Mexico)	2025	72.6	79.0	13 227
	アメリカ合衆国 (United States of America)	2024	76.5	81.4	34 203
南アメリカ (SOUTH AMERICA)	アルゼンチン (Argentina)	2020*	74.90	81.44	4 707
	ブラジル (Brazil)	2024	73.31	79.87	21 768
	チリ (Chile)	2023 - 2024*	74.40	80.45	2 009
	コロンビア (Colombia)	2022 - 2023*	74.48	80.13	5 270
	ペルー (Peru)	2022*	74.4	79.7	3 404
アジア (ASIA)	バングラデシュ (Bangladesh)	2020*	71.2	74.5	17 292
	中国 (China)	2020	75.37	80.88	140 898
	キプロス (Cyprus)	2024	81.44	85.83	97
	インド (India)	2019 - 2023	68.5	72.5	136 717
	インドネシア (Indonesia)	2025	71.32	75.75	28 160
	イラン (Islamic Republic of Iran)	2016*	72.5	75.5	8 596
	イスラエル (Israel)	2019 - 2013	80.81	84.97	976
	マレーシア (Malaysia)	2025	73.06	77.92	3 406
	フィリピン (Philippines)	2020 - 2025	71.26	77.54	11 288
	カタール (Qatar)	2022	80.01	83.40	306
	韓国 (Republic of Korea)	2024	80.8	86.6	5 175
	シンガポール (Singapore)	2024	81.23	85.57	604
	タイ (Thailand)	2024	71.9	80.0	6 701
	トルコ (Turkey)	2023*	74.8	79.8	8 581
ヨーロッパ (EUROPE)	オーストリア (Austria)	2024	79.84	84.32	916
	ベルギー (Belgium)	2024	80.26	84.40	1 182
	チェコ (Czech Republic)	2025	77.49	83.19	1 090
	デンマーク (Denmark)	2024 - 2025	80.25	83.90	596
	フィンランド (Finland)	2025	79.81	84.73	560
	フランス (France)	2025	80.3	85.9	6 619
	ドイツ (Germany)	2022 - 2024	78.47	83.19	8 346
	ギリシャ (Greece)	2023*	79.2	84.4	1 040
	アイスランド (Iceland)	2024	80.9	84.3	38
	イタリア (Italy)	2025	81.744	85.729	5 897
	オランダ (Netherlands)	2024	80.52	83.28	1 794
	ノルウェー (Norway)	2025	81.61	84.85	555
	ポーランド (Poland)	2024	74.93	82.26	3 662
	ロシア (Russian Federation)	2023	68.04	78.74	14 614
	スペイン (Spain)	2024	81.38	86.53	4 862
	スウェーデン (Sweden)	2025	82.52	85.55	1 055
	スイス (Switzerland)	2024	82.4	85.9	896
	ウクライナ (Ukraine)	2021*	65.16	74.36	4 100
	イギリス (United Kingdom)	2022 - 2024	79.12	83.02	6 827
オセアニア (OCEANIA)	オーストラリア (Australia)	2022 - 2024	81.06	85.10	2 719
	ニュージーランド (New Zealand)	2023 - 2025	80.39	83.75	529



参考：香港 (Hong Kong) の平均寿命は2025年で、男が 83.27 年、女が 88.73 年である。（人口 750万人）

注：平均寿命は、当該政府の資料 (2026年5月までに入手したもの) による。ただし、*印は国連「Demographic Yearbook 2024」による。

人口は、国連「Demographic Yearbook 2024」における2024年の値（アルジェリア、バングラデシュ、カタール、スイス、イギリスは2023年、チュニジア、ウクライナは2022年、コンゴ民主共和国、インドは2021年。）による。

ただし、日本は人口推計による令和7(2025)年10月1日現在日本人人口である。

図4 主な国の平均寿命の年次推移 -1985~2025 年-



資料：国連「Demographic Yearbook」等

注：1990年以前のドイツは、旧西ドイツの数値である。

4 死因分析

(1) 死因別死亡確率

人はいずれ何らかの死因で死亡することになるが、「生命表上で、ある年齢の者が“将来”どの死因で死亡するかを計算し、確率の形で表したもの」が死因別死亡確率である。

令和7年の死因別死亡確率を主要死因についてみると、0歳では男は悪性新生物<腫瘍>が最も高く、次いで心疾患（高血圧性を除く。以下同じ。）、老衰、肺炎、脳血管疾患の順、女は老衰が最も高く、次いで悪性新生物<腫瘍>、心疾患、脳血管疾患、肺炎の順になっている。65歳では男女とも0歳に比べ悪性新生物<腫瘍>の死亡確率は低く、老衰の死亡確率は高くなっており、75歳及び90歳ではこの死亡確率の差がさらに広がっている。また、心疾患、脳血管疾患及び肺炎で、その死亡確率を0歳、65歳、75歳及び90歳の年齢間で比べると、ほぼ同程度となっている。

0歳、65歳、75歳及び90歳の年齢における死亡確率を前年と比較すると、悪性新生物<腫瘍>は男では0歳、65歳、女では0歳、65歳、75歳で低下しており、心疾患及び脳血管疾患は、男女ともすべての年齢で低下している。また、肺炎及び老衰の死亡確率は、男女ともすべての年齢で上昇している。

「悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患」の0歳における死亡確率は、男女とも4割程度となっており、これは生まれた者の4割程度が将来「悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患」で死亡することを表している。また、前年と比較すると、男女ともすべての年齢で低下している。（図5、表6）

図5 死因別死亡確率（主要死因）（令和7年）




表6 死因別死亡確率（主要死因）の推移

主要死因		年齢	男					女				
			令和3年	4年	5年	6年	7年	令和3年	4年	5年	6年	7年
悪性新生物<腫瘍>	0歳		27.66	26.30	25.93	25.59	25.41	19.86	19.34	19.09	19.06	18.95
	65		27.55	26.16	25.87	25.50	25.38	18.28	17.72	17.53	17.51	17.43
	75		24.76	23.49	23.26	23.02	23.06	16.12	15.50	15.37	15.38	15.35
	90		15.43	14.43	14.15	13.99	14.30	9.68	9.02	8.96	8.97	9.03
心疾患 (高血圧性を除く)	0歳		14.38	14.28	14.24	13.70	13.60	16.20	15.79	15.44	14.77	14.42
	65		14.43	14.31	14.24	13.69	13.60	16.75	16.32	15.95	15.25	14.88
	75		14.71	14.50	14.41	13.81	13.72	17.22	16.76	16.38	15.64	15.26
	90		16.63	15.94	15.86	15.19	15.08	18.19	17.61	17.23	16.47	16.09
脳血管疾患	0歳		6.86	6.55	6.30	6.12	6.03	7.46	6.97	6.73	6.46	6.33
	65		6.84	6.48	6.21	6.01	5.90	7.55	7.05	6.78	6.51	6.36
	75		6.87	6.46	6.16	5.92	5.81	7.64	7.11	6.81	6.55	6.37
	90		6.12	5.67	5.28	5.23	5.01	7.31	6.70	6.38	6.11	5.90
肺炎	0歳		6.25	5.64	5.68	5.89	6.26	4.56	4.14	4.24	4.35	4.58
	65		6.81	6.13	6.18	6.38	6.75	4.78	4.34	4.44	4.54	4.78
	75		7.48	6.73	6.76	6.98	7.33	4.98	4.52	4.62	4.71	4.95
	90		9.12	8.09	8.08	8.24	8.67	5.32	4.86	4.92	5.01	5.24
老衰	0歳		7.41	7.45	7.93	8.39	9.02	18.80	18.68	19.61	20.75	21.74
	65		8.25	8.31	8.85	9.36	10.02	19.88	19.79	20.77	21.99	23.00
	75		9.63	9.73	10.36	10.95	11.66	21.23	21.18	22.22	23.52	24.57
	90		17.61	17.91	18.79	19.87	20.69	29.34	29.51	30.64	32.31	33.53
悪性新生物<腫瘍>、 心疾患(高血圧性を除く) 及び脳血管疾患 (再掲)		0歳	48.90	47.12	46.47	45.41	45.03	43.52	42.10	41.26	40.29	39.70
		65	48.82	46.95	46.32	45.20	44.88	42.59	41.08	40.27	39.27	38.67
		75	46.34	44.45	43.83	42.74	42.59	40.98	39.37	38.56	37.57	36.99
		90	38.19	36.04	35.29	34.41	34.39	35.18	33.33	32.57	31.54	31.02

(2) 特定死因を除去した場合の平均余命の伸び

ある死因で死亡することがなくなったとすると、その死因によって死亡していた者は、その死亡年齢以後に他の死因で死亡することになる。その結果、死亡時期が繰り越され、平均余命が延びることになる。この伸びは、その死因のために失われた平均余命としてみることができ、これによって各死因がどの程度平均余命に影響しているかを測ることができる。また、老衰を他の死因と同様にとらえ、老衰についてもどの程度平均余命に影響しているかを測ることとする。

令和7年の特定死因を除去した場合の平均余命の伸びを主要死因についてみると、0歳では、男女とも悪性新生物〈腫瘍〉が最も大きく、次いで男は、心疾患、脳血管疾患の順に、女は老衰、心疾患の順になっている。90歳においては男女とも老衰が最も大きく、次いで心疾患、悪性新生物〈腫瘍〉の順になっている。

また、0歳、65歳、75歳及び90歳の年齢において前年と比較すると、悪性新生物〈腫瘍〉は男女とも0歳、65歳では短く、75歳、90歳では長くなっており、心疾患及び脳血管疾患は、男女ともおおむね短く、肺炎及び老衰は、男女とも長くなっている。

「悪性新生物〈腫瘍〉、心疾患及び脳血管疾患」を除去した場合の伸びは、0歳では男5.84年、女4.77年となっている。また、65歳では男4.77年、女3.77年、75歳では男3.60年、女3.02年、90歳では男1.47年、女1.42年となっている。（表7）

表7 特定死因を除去した場合の平均余命の伸び（主要死因）の推移

（単位：年）

除去する主要死因	年齢	男					女				
		令和3年	4年	5年	6年	7年	令和3年	4年	5年	6年	7年
悪性新生物〈腫瘍〉	0歳	3.43	3.19	3.16	3.11	3.07	2.81	2.74	2.69	2.68	2.66
	65	2.83	2.62	2.61	2.57	2.56	1.97	1.89	1.87	1.87	1.87
	75	1.95	1.80	1.80	1.79	1.81	1.37	1.29	1.28	1.29	1.30
	90	0.57	0.50	0.50	0.50	0.53	0.42	0.37	0.37	0.37	0.38
心疾患 （高血圧性を除く）	0歳	1.42	1.41	1.42	1.37	1.36	1.23	1.19	1.17	1.12	1.08
	65	1.10	1.09	1.09	1.06	1.06	1.16	1.11	1.09	1.04	1.01
	75	0.92	0.89	0.89	0.86	0.86	1.09	1.04	1.02	0.97	0.94
	90	0.60	0.54	0.55	0.52	0.53	0.77	0.71	0.69	0.65	0.64
脳血管疾患	0歳	0.69	0.66	0.65	0.64	0.64	0.62	0.58	0.57	0.55	0.55
	65	0.53	0.50	0.49	0.47	0.47	0.54	0.50	0.49	0.47	0.46
	75	0.44	0.40	0.39	0.37	0.37	0.48	0.45	0.43	0.41	0.41
	90	0.21	0.18	0.17	0.17	0.17	0.29	0.25	0.24	0.23	0.22
肺炎	0歳	0.43	0.38	0.39	0.42	0.45	0.29	0.26	0.27	0.29	0.30
	65	0.43	0.38	0.39	0.41	0.44	0.29	0.26	0.27	0.28	0.30
	75	0.42	0.37	0.38	0.39	0.42	0.29	0.25	0.26	0.27	0.28
	90	0.31	0.26	0.26	0.27	0.29	0.20	0.18	0.18	0.18	0.19
老衰	0歳	0.36	0.36	0.39	0.42	0.47	1.08	1.04	1.11	1.19	1.25
	65	0.40	0.40	0.44	0.47	0.52	1.14	1.10	1.18	1.26	1.32
	75	0.46	0.45	0.50	0.53	0.59	1.21	1.17	1.25	1.33	1.40
	90	0.64	0.61	0.66	0.71	0.77	1.44	1.35	1.43	1.51	1.56
悪性新生物〈腫瘍〉、 心疾患(高血圧性を除く) 及び脳血管疾患	0歳	6.49	6.11	6.06	5.90	5.84	5.28	5.07	4.96	4.86	4.77
	65	5.32	4.97	4.93	4.79	4.77	4.24	4.01	3.93	3.83	3.77
	75	4.01	3.70	3.67	3.57	3.60	3.44	3.22	3.15	3.06	3.02
	90	1.70	1.48	1.47	1.42	1.47	1.75	1.55	1.51	1.44	1.42

注：「悪性新生物〈腫瘍〉、心疾患(高血圧性を除く。以下同じ。)及び脳血管疾患」の数値は、以下の理由により「悪性新生物〈腫瘍〉」、「心疾患」及び「脳血管疾患」のそれぞれを合計した数値にはならない。

○「悪性新生物〈腫瘍〉、心疾患及び脳血管疾患」の数値：3つの死因を同時に除去していることから、3つのどの死因による死亡も発生しないものとして伸びが計算される。

○「悪性新生物〈腫瘍〉」「心疾患」「脳血管疾患」それぞれの数値：単独に死因を除去し、他の2つの死因を除去していないことから、当該2つの死因による死亡が発生するものとして伸びが計算される。

令和7(2025)年簡易生命表(男)

年齢 x	死亡率 nq_x	生存数 l_x	死亡数 nd_x	定常人口		平均余命 $^o e_x$
				nL_x	T_x	
0(週)	0.00066	100 000	66	1 917	8 134 600	81.35
1	0.00005	99 934	5	1 916	8 132 683	81.38
2	0.00008	99 929	8	1 916	8 130 767	81.37
3	0.00008	99 921	8	1 916	8 128 850	81.35
4	0.00024	99 913	24	8 986	8 126 934	81.34
2(月)	0.00013	99 889	13	8 324	8 117 948	81.27
3	0.00039	99 876	39	24 965	8 109 624	81.20
6	0.00037	99 837	37	49 906	8 084 659	80.98
0(年)	0.00200	100 000	200	99 847	8 134 600	81.35
1	0.00031	99 800	31	99 785	8 034 753	80.51
2	0.00022	99 770	22	99 759	7 934 968	79.53
3	0.00015	99 748	15	99 740	7 835 209	78.55
4	0.00011	99 733	11	99 727	7 735 469	77.56
5	0.00009	99 721	9	99 717	7 635 742	76.57
6	0.00008	99 712	8	99 708	7 536 025	75.58
7	0.00007	99 704	7	99 701	7 436 317	74.58
8	0.00006	99 697	6	99 694	7 336 617	73.59
9	0.00006	99 691	6	99 688	7 236 923	72.59
10	0.00006	99 686	6	99 683	7 137 234	71.60
11	0.00007	99 680	7	99 676	7 037 552	70.60
12	0.00009	99 673	9	99 668	6 937 875	69.61
13	0.00012	99 664	12	99 658	6 838 207	68.61
14	0.00015	99 652	15	99 645	6 738 549	67.62
15	0.00018	99 637	18	99 628	6 638 905	66.63
16	0.00022	99 618	22	99 608	6 539 277	65.64
17	0.00026	99 597	26	99 584	6 439 669	64.66
18	0.00031	99 571	31	99 556	6 340 085	63.67
19	0.00036	99 540	36	99 522	6 240 529	62.69
20	0.00041	99 504	41	99 484	6 141 007	61.72
21	0.00045	99 463	44	99 441	6 041 523	60.74
22	0.00047	99 419	47	99 396	5 942 082	59.77
23	0.00048	99 372	47	99 348	5 842 686	58.80
24	0.00047	99 325	47	99 301	5 743 338	57.82
25	0.00047	99 278	46	99 255	5 644 037	56.85
26	0.00047	99 231	46	99 208	5 544 782	55.88
27	0.00048	99 185	48	99 162	5 445 574	54.90
28	0.00050	99 138	49	99 113	5 346 412	53.93
29	0.00051	99 089	50	99 064	5 247 299	52.96
30	0.00051	99 038	51	99 013	5 148 236	51.98
31	0.00054	98 987	53	98 961	5 049 223	51.01
32	0.00057	98 934	56	98 906	4 950 261	50.04
33	0.00061	98 878	60	98 848	4 851 355	49.06
34	0.00064	98 818	64	98 786	4 752 507	48.09
35	0.00068	98 754	67	98 721	4 653 720	47.12
36	0.00071	98 687	70	98 653	4 554 999	46.16
37	0.00075	98 617	74	98 581	4 456 347	45.19
38	0.00081	98 543	80	98 504	4 357 766	44.22
39	0.00088	98 463	86	98 421	4 259 262	43.26
40	0.00095	98 377	93	98 331	4 160 841	42.29
41	0.00102	98 284	101	98 234	4 062 510	41.33
42	0.00111	98 184	109	98 130	3 964 276	40.38
43	0.00120	98 075	118	98 017	3 866 146	39.42
44	0.00131	97 957	128	97 894	3 768 129	38.47
45	0.00142	97 829	139	97 760	3 670 235	37.52
46	0.00155	97 690	151	97 615	3 572 475	36.57
47	0.00170	97 538	166	97 457	3 474 860	35.63
48	0.00189	97 372	184	97 282	3 377 403	34.69
49	0.00210	97 188	204	97 088	3 280 121	33.75

注：1) nq_x 等の生命表諸関数の定義については、「参考資料1」を参照。

2) nq_x 、 nd_x 、 nL_x において各 x に対応する n は以下のとおり。

$n=1$ 週($x=0\sim3$ 週)、 $n=2$ 月-4週($x=4$ 週)、 $n=1$ 月($x=2$ 月)、 $n=3$ 月($x=3$ 月)、 $n=6$ 月($x=6$ 月)、

$n=1$ 年($x=0\sim104$ 年)、 $n=\infty$ ($x=105$ 年)

年齡 x	死亡率 nq_x	生存数 l_x	死亡数 nd_x	定常人口		平均余命 $^{\circ}e_x$
				nL_x	T_x	
50	0.00234	96 984	227	96 873	3 183 033	32.82
51	0.00259	96 757	251	96 634	3 086 160	31.90
52	0.00285	96 506	275	96 371	2 989 526	30.98
53	0.00311	96 232	299	96 084	2 893 155	30.06
54	0.00343	95 932	329	95 770	2 797 071	29.16
55	0.00379	95 603	362	95 425	2 701 301	28.26
56	0.00418	95 241	398	95 045	2 605 876	27.36
57	0.00464	94 843	440	94 626	2 510 831	26.47
58	0.00514	94 403	485	94 164	2 416 204	25.59
59	0.00565	93 918	530	93 656	2 322 040	24.72
60	0.00617	93 387	576	93 103	2 228 384	23.86
61	0.00677	92 811	628	92 502	2 135 281	23.01
62	0.00747	92 183	688	91 844	2 042 779	22.16
63	0.00832	91 495	761	91 120	1 950 935	21.32
64	0.00928	90 733	842	90 319	1 859 815	20.50
65	0.01024	89 892	921	89 438	1 769 495	19.68
66	0.01121	88 971	998	88 478	1 680 058	18.88
67	0.01224	87 973	1 077	87 442	1 591 579	18.09
68	0.01343	86 896	1 167	86 321	1 504 138	17.31
69	0.01489	85 729	1 276	85 101	1 417 817	16.54
70	0.01660	84 453	1 402	83 763	1 332 716	15.78
71	0.01854	83 051	1 540	82 293	1 248 952	15.04
72	0.02070	81 511	1 687	80 680	1 166 660	14.31
73	0.02303	79 824	1 838	78 918	1 085 979	13.60
74	0.02558	77 986	1 995	77 001	1 007 062	12.91
75	0.02836	75 991	2 155	74 927	930 060	12.24
76	0.03122	73 836	2 305	72 695	855 134	11.58
77	0.03428	71 531	2 452	70 317	782 438	10.94
78	0.03790	69 079	2 618	67 785	712 121	10.31
79	0.04228	66 461	2 810	65 073	644 336	9.69
80	0.04745	63 651	3 020	62 159	579 263	9.10
81	0.05318	60 631	3 224	59 035	517 104	8.53
82	0.05926	57 407	3 402	55 719	458 069	7.98
83	0.06550	54 005	3 537	52 247	402 350	7.45
84	0.07279	50 468	3 673	48 643	350 103	6.94
85	0.08168	46 795	3 822	44 896	301 460	6.44
86	0.09237	42 972	3 969	40 999	256 564	5.97
87	0.10473	39 003	4 085	36 968	215 565	5.53
88	0.11823	34 918	4 128	32 854	178 597	5.11
89	0.13267	30 790	4 085	28 740	145 743	4.73
90	0.14814	26 705	3 956	24 711	117 003	4.38
91	0.16146	22 749	3 673	20 886	92 292	4.06
92	0.17770	19 076	3 390	17 356	71 405	3.74
93	0.19569	15 686	3 070	14 123	54 049	3.45
94	0.21558	12 616	2 720	11 226	39 926	3.16
95	0.23750	9 897	2 350	8 690	28 699	2.90
96	0.26156	7 546	1 974	6 528	20 009	2.65
97	0.28787	5 572	1 604	4 740	13 481	2.42
98	0.31652	3 968	1 256	3 313	8 741	2.20
99	0.34754	2 712	943	2 217	5 428	2.00
100	0.38096	1 770	674	1 412	3 212	1.81
101	0.41672	1 095	457	851	1 800	1.64
102	0.45469	639	291	482	948	1.48
103	0.49469	348	172	254	467	1.34
104	0.53643	176	94	124	212	1.21
105	1.00000	82	82	89	89	1.08

令和7(2025)年簡易生命表(女)

年齢 x	死亡率 nq_x	生存数 l_x	死亡数 nd_x	定常人口		平均余命 ${}^{\circ}e_x$
				nL_x	T_x	
0(週)	0.00063	100 000	63	1 917	8 733 067	87.33
1	0.00008	99 937	8	1 916	8 731 150	87.37
2	0.00008	99 929	8	1 916	8 729 234	87.35
3	0.00005	99 920	5	1 916	8 727 317	87.34
4	0.00015	99 916	15	8 987	8 725 401	87.33
2(月)	0.00012	99 901	12	8 325	8 716 414	87.25
3	0.00031	99 889	31	24 968	8 708 089	87.18
6	0.00030	99 858	30	49 919	8 683 121	86.95
0(年)	0.00173	100 000	173	99 866	8 733 067	87.33
1	0.00028	99 827	28	99 814	8 633 201	86.48
2	0.00018	99 800	18	99 791	8 533 388	85.51
3	0.00011	99 782	11	99 776	8 433 597	84.52
4	0.00008	99 771	8	99 767	8 333 822	83.53
5	0.00007	99 763	6	99 760	8 234 055	82.54
6	0.00006	99 757	6	99 753	8 134 295	81.54
7	0.00006	99 750	6	99 747	8 034 541	80.55
8	0.00006	99 744	6	99 741	7 934 794	79.55
9	0.00006	99 738	6	99 734	7 835 054	78.56
10	0.00006	99 731	6	99 728	7 735 319	77.56
11	0.00007	99 725	7	99 722	7 635 591	76.57
12	0.00008	99 718	8	99 714	7 535 869	75.57
13	0.00011	99 710	11	99 705	7 436 155	74.58
14	0.00014	99 699	14	99 693	7 336 450	73.59
15	0.00017	99 685	17	99 677	7 236 758	72.60
16	0.00020	99 668	20	99 659	7 137 081	71.61
17	0.00022	99 649	22	99 638	7 037 422	70.62
18	0.00025	99 626	25	99 614	6 937 784	69.64
19	0.00028	99 601	28	99 588	6 838 170	68.66
20	0.00030	99 574	29	99 559	6 738 583	67.67
21	0.00030	99 544	30	99 529	6 639 024	66.69
22	0.00029	99 514	28	99 500	6 539 494	65.71
23	0.00027	99 486	27	99 472	6 439 994	64.73
24	0.00027	99 459	27	99 445	6 340 522	63.75
25	0.00028	99 432	28	99 418	6 241 077	62.77
26	0.00028	99 404	28	99 390	6 141 659	61.78
27	0.00027	99 376	27	99 363	6 042 269	60.80
28	0.00026	99 349	26	99 336	5 942 906	59.82
29	0.00026	99 323	26	99 310	5 843 570	58.83
30	0.00028	99 297	27	99 283	5 744 260	57.85
31	0.00030	99 269	29	99 255	5 644 977	56.87
32	0.00032	99 240	31	99 225	5 545 722	55.88
33	0.00034	99 209	34	99 192	5 446 497	54.90
34	0.00037	99 175	37	99 157	5 347 305	53.92
35	0.00040	99 138	40	99 119	5 248 148	52.94
36	0.00043	99 099	42	99 078	5 149 029	51.96
37	0.00045	99 056	45	99 034	5 049 952	50.98
38	0.00048	99 011	48	98 988	4 950 918	50.00
39	0.00052	98 964	51	98 939	4 851 930	49.03
40	0.00055	98 913	55	98 886	4 752 991	48.05
41	0.00060	98 858	59	98 829	4 654 105	47.08
42	0.00065	98 799	64	98 767	4 555 277	46.11
43	0.00071	98 735	70	98 701	4 456 509	45.14
44	0.00078	98 665	77	98 627	4 357 808	44.17
45	0.00085	98 588	84	98 547	4 259 181	43.20
46	0.00092	98 504	91	98 459	4 160 634	42.24
47	0.00100	98 413	99	98 364	4 062 175	41.28
48	0.00110	98 314	108	98 261	3 963 810	40.32
49	0.00121	98 207	118	98 149	3 865 549	39.36

注：1) nq_x 等の生命表諸関数の定義については、「参考資料1」を参照。

2) nq_x 、 nd_x 、 nL_x において各 x に対応する n は以下のとおり。

$n=1$ 週($x=0\sim3$ 週)、 $n=2$ 月-4週($x=4$ 週)、 $n=1$ 月($x=2$ 月)、 $n=3$ 月($x=3$ 月)、 $n=6$ 月($x=6$ 月)、

$n=1$ 年($x=0\sim104$ 年)、 $n=\infty$ ($x=105$ 年)

年齡 x	死亡率 nq_x	生存数 l_x	死亡数 nd_x	定常人口		平均余命 ${}^{\circ}e_x$
				nL_x	T_x	
50	0.00134	98 088	131	98 024	3 767 401	38.41
51	0.00149	97 957	146	97 885	3 669 377	37.46
52	0.00163	97 811	160	97 732	3 571 492	36.51
53	0.00177	97 651	172	97 566	3 473 759	35.57
54	0.00190	97 479	185	97 387	3 376 194	34.64
55	0.00204	97 293	198	97 196	3 278 806	33.70
56	0.00218	97 095	211	96 991	3 181 611	32.77
57	0.00233	96 884	226	96 773	3 084 620	31.84
58	0.00251	96 658	242	96 538	2 987 847	30.91
59	0.00269	96 416	259	96 288	2 891 309	29.99
60	0.00288	96 157	277	96 020	2 795 021	29.07
61	0.00311	95 880	298	95 732	2 699 001	28.15
62	0.00336	95 581	321	95 423	2 603 269	27.24
63	0.00365	95 260	348	95 089	2 507 846	26.33
64	0.00400	94 912	379	94 726	2 412 757	25.42
65	0.00438	94 533	414	94 329	2 318 032	24.52
66	0.00475	94 119	447	93 899	2 223 703	23.63
67	0.00515	93 673	482	93 435	2 129 804	22.74
68	0.00565	93 190	526	92 931	2 036 369	21.85
69	0.00627	92 664	581	92 379	1 943 438	20.97
70	0.00698	92 083	643	91 767	1 851 059	20.10
71	0.00774	91 440	708	91 092	1 759 292	19.24
72	0.00857	90 733	777	90 350	1 668 200	18.39
73	0.00951	89 956	856	89 535	1 577 849	17.54
74	0.01067	89 100	951	88 633	1 488 314	16.70
75	0.01205	88 149	1 062	87 628	1 399 681	15.88
76	0.01356	87 087	1 181	86 507	1 312 053	15.07
77	0.01525	85 906	1 310	85 262	1 225 546	14.27
78	0.01722	84 596	1 457	83 881	1 140 284	13.48
79	0.01956	83 140	1 626	82 342	1 056 403	12.71
80	0.02235	81 514	1 822	80 620	974 061	11.95
81	0.02567	79 692	2 046	78 689	893 441	11.21
82	0.02955	77 646	2 295	76 520	814 752	10.49
83	0.03392	75 351	2 556	74 096	738 231	9.80
84	0.03909	72 795	2 845	71 398	664 135	9.12
85	0.04524	69 950	3 164	68 395	592 738	8.47
86	0.05243	66 786	3 501	65 063	524 342	7.85
87	0.06068	63 284	3 840	61 392	459 279	7.26
88	0.07001	59 444	4 162	57 389	397 887	6.69
89	0.08074	55 282	4 464	53 074	340 498	6.16
90	0.09311	50 819	4 732	48 473	287 424	5.66
91	0.10705	46 087	4 933	43 633	238 951	5.18
92	0.12220	41 153	5 029	38 642	195 318	4.75
93	0.13809	36 124	4 989	33 620	156 676	4.34
94	0.15366	31 136	4 784	28 724	123 056	3.95
95	0.17388	26 352	4 582	24 041	94 332	3.58
96	0.19696	21 769	4 288	19 597	70 291	3.23
97	0.22347	17 482	3 907	15 493	50 693	2.90
98	0.25375	13 575	3 445	11 811	35 200	2.59
99	0.28809	10 130	2 918	8 625	23 389	2.31
100	0.32673	7 212	2 356	5 986	14 763	2.05
101	0.36980	4 856	1 796	3 912	8 777	1.81
102	0.41728	3 060	1 277	2 381	4 865	1.59
103	0.46892	1 783	836	1 332	2 484	1.39
104	0.52420	947	496	675	1 152	1.22
105	1.00000	451	451	477	477	1.06

参考資料 1 生命表諸関数の定義

死 亡 率	${}_nq_x$	: ちょうど x 歳に達した者が $x + n$ 歳に達しないで死亡する確率を x 歳以上 $x + n$ 歳未満における死亡率といい、これを ${}_nq_x$ で表す。特に ${}_1q_x$ を x 歳における死亡率といい、これを q_x で表す。
生 存 数	l_x	: 生命表上で一定の出生数 l_0 (簡易生命表では 100 000 人) が、上記の死亡率に従って死亡減少していくと考えた場合、 x 歳に達するまで生きると期待される者の数を x 歳における生存数といい、これを l_x で表す。
死 亡 数	${}_nd_x$	: x 歳における生存数 l_x のうち $x + n$ 歳に達しないで死亡すると期待される者の数を x 歳以上 $x + n$ 歳未満における死亡数といい、これを ${}_nd_x$ で表す。特に ${}_1d_x$ を x 歳における死亡数といい、これを d_x で表す。
定常人口	${}_nL_x$ 及び T_x	: x 歳における生存数 l_x について、これらの者が x 歳から $x + n$ 歳に達するまでの間に生存すると期待される年数の和を x 歳以上 $x + n$ 歳未満における定常人口といい、これを ${}_nL_x$ で表す。即ち、常に一定の出生があつて、これらの者が上記の死亡率に従って死亡すると仮定すると、一定期間経過後、一定の年齢構造をもつ人口集団が得られるが、その集団の x 歳以上 $x + n$ 歳未満の人口に相当する。特に ${}_1L_x$ を x 歳における定常人口といい、これを L_x で表す。更に x 歳における生存数 l_x について、これらの者が x 歳以後死亡に至るまでの間に生存すると期待される年数の和を x 歳以上の定常人口といい、これを T_x で表す。即ち、上記の人口集団の x 歳以上の人口に相当する。 ${}_nL_x$ 及び T_x は

$${}_nL_x = \int_x^{x+n} l_t dt \quad , \quad T_x = \int_x^{\infty} l_t dt$$

により与えられる。


平均余命	$\overset{\circ}{e}_x$	: x 歳における生存数 l_x について、これらの者が x 歳以降に生存する年数の平均を x 歳における平均余命といい、これを $\overset{\circ}{e}_x$ で表す。 x 歳における平均余命は次式により与えられる。
------	------------------------	--

$$\overset{\circ}{e}_x = \frac{T_x}{l_x}$$

平均寿命	$\overset{\circ}{e}_0$	: 0歳における平均余命 $\overset{\circ}{e}_0$ を平均寿命という。
------	------------------------	---

寿命中位数		: 生命表上で、出生者のうち、ちょうど半数が生存し、半数が死亡すると期待される年数を寿命中位数という。これは次式を満たす α として与えられる。
-------	--	---

$$l_{\alpha} = \frac{l_0}{2}$$



参考資料2 主な年齢の平均余命の年次推移

(単位：年)

年次		男						女					
西暦	和暦	0歳	20	40	65	75	90	0歳	20	40	65	75	90
*1947 年	*昭和22 年	50.06	40.89	26.88	10.16	6.09	2.56	53.96	44.87	30.39	12.22	7.03	2.45
48	23	55.6	43.6	29.1	12.0	8.0	...	59.4	47.3	32.5	14.2	9.3	...
49	24	56.2	44.3	29.2	11.7	7.6	...	59.8	47.9	32.6	14.0	8.9	...
50	25	58.0	45.3	29.4	11.5	7.6	...	61.5	48.7	32.7	13.9	9.0	...
*1950-1952	*25-27	59.57	46.43	29.65	11.35	6.73	2.70	62.97	49.58	32.77	13.36	7.76	2.72
1951	26	60.8	47.9	31.4	...	...	...	64.9	51.9	35.4	...	...	...
52	27	61.9	48.0	30.9	12.5	8.4	...	65.5	51.4	34.2	14.8	9.8	...
53	28	61.9	48.0	30.6	11.9	7.6	...	65.7	51.4	33.9	14.2	9.1	...
54	29	63.41	48.87	31.45	12.88	8.20	...	67.69	52.86	35.22	15.00	9.24	...
*1955	*30	63.60	48.47	30.85	11.82	6.97	2.87	67.75	52.25	34.34	14.13	8.28	3.12
56	31	63.59	48.21	30.45	11.36	6.26	...	67.54	51.92	33.85	13.54	7.61	...
57	32	63.24	47.87	30.04	11.01	6.27	...	67.60	51.48	33.39	12.93	6.90	...
58	33	64.98	49.19	31.29	12.12	7.33	...	69.61	53.48	35.23	14.71	8.93	...
59	34	65.21	49.31	31.30	11.91	6.81	...	69.88	53.45	35.08	14.37	8.28	...
*1960	*35	65.32	49.08	31.02	11.62	6.60	2.69	70.19	53.39	34.90	14.10	8.01	2.99
61	36	66.03	49.58	31.44	11.88	6.69	...	70.79	53.72	35.10	14.10	7.77	...
62	37	66.23	49.44	31.19	11.55	6.33	...	71.16	53.85	35.15	14.09	7.76	...
63	38	67.21	50.10	31.79	12.10	6.84	...	72.34	54.70	35.89	14.70	8.33	...
64	39	67.67	50.33	31.96	12.19	6.92	...	72.87	54.99	36.11	14.83	8.42	...
*1965	*40	67.74	50.18	31.73	11.88	6.63	2.56	72.92	54.85	35.91	14.56	8.11	2.96
66	41	68.35	50.78	32.33	12.42	7.11	...	73.61	55.53	36.55	15.11	8.62	...
67	42	68.91	51.06	32.56	12.50	7.11	...	74.15	55.82	36.79	15.26	8.69	...
68	43	69.05	51.17	32.61	12.48	7.03	...	74.30	55.93	36.86	15.26	8.61	...
69	44	69.18	51.24	32.71	12.53	7.11	...	74.67	56.24	37.17	15.51	8.89	...
*1970	*45	69.31	51.26	32.68	12.50	7.14	2.75	74.66	56.11	37.01	15.34	8.70	3.26
71	46	70.17	52.05	33.42	13.08	7.54	...	75.58	56.99	37.85	16.00	9.23	...
72	47	70.50	52.33	33.67	13.25	7.57	...	75.94	57.28	38.11	16.17	9.26	...
73	48	70.70	52.46	33.74	13.22	7.44	...	76.02	57.33	38.12	16.10	9.12	...
74	49	71.16	52.79	33.99	13.38	7.55	...	76.31	57.54	38.30	16.18	9.15	...
*1975	*50	71.73	53.27	34.41	13.72	7.85	3.05	76.89	58.04	38.76	16.56	9.47	3.39
76	51	72.15	53.60	34.68	13.91	7.97	...	77.35	58.43	39.11	16.80	9.63	...
77	52	72.69	54.07	35.12	14.29	8.23	...	77.95	58.99	39.63	17.24	9.99	...
78	53	72.97	54.32	35.32	14.40	8.26	...	78.33	59.32	39.95	17.48	10.17	...
79	54	73.46	54.72	35.70	14.75	8.54	...	78.89	59.83	40.42	17.92	10.51	...
*1980	*55	73.35	54.56	35.52	14.56	8.34	3.17	78.76	59.66	40.23	17.68	10.24	3.55
81	56	73.79	54.95	35.88	14.85	8.55	3.28	79.13	60.00	40.55	17.93	10.41	3.50
82	57	74.22	55.33	36.24	15.18	8.79	3.28	79.66	60.48	41.02	18.35	10.75	3.59
83	58	74.20	55.25	36.20	15.19	8.74	3.21	79.78	60.56	41.10	18.40	10.75	3.49
84	59	74.54	55.56	36.47	15.43	8.89	3.27	80.18	60.93	41.46	18.71	11.00	3.58
*1985	*60	74.78	55.74	36.63	15.52	8.93	3.28	80.48	61.20	41.72	18.94	11.19	3.82
86	61	75.23	56.15	37.02	15.86	9.24	3.38	80.93	61.62	42.13	19.29	11.45	3.78
87	62	75.61	56.50	37.35	16.12	9.43	3.51	81.39	62.05	42.54	19.67	11.77	3.92
88	63	75.54	56.40	37.24	15.95	9.26	3.31	81.30	61.96	42.44	19.54	11.62	3.82
89	平成元	75.91	56.74	37.56	16.22	9.52	3.44	81.77	62.41	42.89	19.95	12.00	4.02
*1990	*2	75.92	56.77	37.58	16.22	9.50	3.51	81.90	62.54	43.00	20.03	12.06	4.18
91	3	76.11	56.90	37.70	16.31	9.59	3.37	82.11	62.73	43.18	20.20	12.18	3.95
92	4	76.09	56.91	37.70	16.31	9.61	3.30	82.22	62.84	43.29	20.31	12.28	3.98
93	5	76.25	57.02	37.80	16.41	9.74	3.60	82.51	63.13	43.55	20.57	12.55	4.45
94	6	76.57	57.35	38.13	16.67	9.96	3.73	82.98	63.56	44.00	20.97	12.89	4.63
*1995	*7	76.38	57.16	37.96	16.48	9.81	3.58	82.85	63.46	43.91	20.94	12.88	4.64
96	8	77.01	57.71	38.48	16.94	10.25	3.83	83.59	64.13	44.55	21.53	13.40	4.95
97	9	77.19	57.86	38.62	17.02	10.29	3.81	83.82	64.36	44.79	21.75	13.58	5.03
98	10	77.16	57.85	38.66	17.13	10.43	3.86	84.01	64.56	45.01	21.96	13.79	5.15
99	11	77.10	57.74	38.56	17.02	10.28	3.76	83.99	64.50	44.94	21.89	13.71	5.05
*2000	*12	77.72	58.33	39.13	17.54	10.75	4.10	84.60	65.08	45.52	22.42	14.19	5.29
01	13	78.07	58.64	39.43	17.78	10.95	4.19	84.93	65.39	45.82	22.68	14.42	5.41
02	14	78.32	58.87	39.64	17.96	11.07	4.29	85.23	65.69	46.12	22.96	14.67	5.56
03	15	78.36	58.89	39.67	18.02	11.09	4.26	85.33	65.79	46.22	23.04	14.72	5.57
04	16	78.64	59.15	39.93	18.21	11.23	4.36	85.59	66.01	46.44	23.28	14.93	5.69
*2005	*17	78.56	59.08	39.86	18.13	11.07	4.15	85.52	65.93	46.38	23.19	14.83	5.53
06	18	79.00	59.49	40.25	18.45	11.31	4.32	85.81	66.22	46.66	23.44	15.04	5.66
07	19	79.19	59.66	40.40	18.56	11.40	4.40	85.99	66.39	46.82	23.59	15.16	5.72
08	20	79.29	59.75	40.49	18.60	11.40	4.36	86.05	66.45	46.89	23.64	15.18	5.71
09	21	79.59	60.04	40.78	18.88	11.63	4.48	86.44	66.81	47.25	23.97	15.46	5.86
*2010	*22	79.55	59.99	40.73	18.74	11.45	4.19	86.30	66.67	47.08	23.80	15.27	5.53
11	23	79.44	59.93	40.69	18.69	11.43	4.14	85.90	66.35	46.84	23.66	15.16	5.46
12	24	79.94	60.36	41.05	18.89	11.57	4.16	86.41	66.78	47.17	23.82	15.27	5.47
13	25	80.21	60.61	41.29	19.08	11.74	4.26	86.61	66.94	47.32	23.97	15.39	5.53
14	26	80.50	60.90	41.57	19.29	11.94	4.35	86.83	67.16	47.55	24.18	15.60	5.66
*2015	*27	80.75	61.13	41.77	19.41	12.03	4.27	86.99	67.31	47.67	24.24	15.64	5.56
16	28	80.98	61.34	41.96	19.55	12.14	4.28	87.14	67.46	47.82	24.38	15.76	5.62
17	29	81.09	61.45	42.05	19.57	12.18	4.25	87.26	67.57	47.90	24.43	15.79	5.61
18	30	81.25	61.61	42.20	19.70	12.29	4.33	87.32	67.63	47.97	24.50	15.86	5.66
19	令和元	81.41	61.77	42.35	19.83	12.41	4.41	87.45	67.77	48.11	24.63	15.97	5.71
*2020	*2	81.56	61.90	42.50	19.97	12.54	4.49	87.71	68.01	48.37	24.88	16.22	5.85
21	3	81.47	61.81	42.40	19.85	12.42	4.38	87.57	67.87	48.24	24.73	16.08	5.74
22	4	81.05	61.39	41.97	19.44	12.04	4.14	87.09	67.39	47.77	24.30	15.67	5.47
23	5	81.09	61.45	42.06	19.52	12.13	4.22	87.14	67.48	47.85	24.38	15.74	5.53
24	6	81.09	61.44	42.03	19.47	12.08	4.27	87.13	67.48	47.88	24.38	15.75	5.55
25	7	81.35	61.72	42.29	19.68	12.24	4.38	87.33	67.67	48.05	24.52	15.88	5.66

注：1) *印は完全生命表による。
2) 昭和46年(1971年)以前は、沖縄県を除く値である。

参考資料３－１ 死因別死亡確率の推移

(単位: %)

死 因	年 齢	男					女				
		令和3年	4年	5年	6年	7年	令和3年	4年	5年	6年	7年
悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	0歳	27.66	26.30	25.93	25.59	25.41	19.86	19.34	19.09	19.06	18.95
	65	27.55	26.16	25.87	25.50	25.38	18.28	17.72	17.53	17.51	17.43
	75	24.76	23.49	23.26	23.02	23.06	16.12	15.50	15.37	15.38	15.35
	90	15.43	14.43	14.15	13.99	14.30	9.68	9.02	8.96	8.97	9.03
心 疾 患 (高 血 圧 性 を 除 く)	0歳	14.38	14.28	14.24	13.70	13.60	16.20	15.79	15.44	14.77	14.42
	65	14.43	14.31	14.24	13.69	13.60	16.75	16.32	15.95	15.25	14.88
	75	14.71	14.50	14.41	13.81	13.72	17.22	16.76	16.38	15.64	15.26
	90	16.63	15.94	15.86	15.19	15.08	18.19	17.61	17.23	16.47	16.09
脳 血 管 疾 患	0歳	6.86	6.55	6.30	6.12	6.03	7.46	6.97	6.73	6.46	6.33
	65	6.84	6.48	6.21	6.01	5.90	7.55	7.05	6.78	6.51	6.36
	75	6.87	6.46	6.16	5.92	5.81	7.64	7.11	6.81	6.55	6.37
	90	6.12	5.67	5.28	5.23	5.01	7.31	6.70	6.38	6.11	5.90
肺 炎	0歳	6.25	5.64	5.68	5.89	6.26	4.56	4.14	4.24	4.35	4.58
	65	6.81	6.13	6.18	6.38	6.75	4.78	4.34	4.44	4.54	4.78
	75	7.48	6.73	6.76	6.98	7.33	4.98	4.52	4.62	4.71	4.95
	90	9.12	8.09	8.08	8.24	8.67	5.32	4.86	4.92	5.01	5.24
不 慮 の 事 故	0歳	2.98	3.08	3.20	3.18	3.17	2.24	2.38	2.38	2.45	2.42
	65	2.79	2.88	2.99	2.97	2.99	2.20	2.33	2.34	2.39	2.37
	75	2.81	2.89	2.99	2.98	2.97	2.18	2.30	2.31	2.36	2.33
	90	2.71	2.75	2.91	2.80	2.87	1.89	1.92	1.94	1.96	1.91
交通事故(再掲)	0歳	0.31	0.29	0.31	0.30	0.28	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13
	65	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
	75	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
	90	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
自 殺	0歳	1.71	1.80	1.81	1.69	1.64	0.88	0.89	0.87	0.83	0.78
	65	0.51	0.53	0.52	0.50	0.47	0.28	0.28	0.26	0.24	0.21
	75	0.36	0.38	0.37	0.35	0.33	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14
	90	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 (C O P D)	0歳	1.89	1.76	1.77	1.68	1.62	0.37	0.33	0.33	0.32	0.30
	65	2.07	1.93	1.94	1.84	1.76	0.38	0.35	0.34	0.34	0.31
	75	2.21	2.06	2.05	1.93	1.84	0.38	0.34	0.33	0.33	0.30
	90	2.08	1.83	1.81	1.66	1.46	0.31	0.27	0.26	0.24	0.21
腎 不 全	0歳	2.16	2.09	2.04	1.99	2.01	1.93	1.88	1.82	1.71	1.69
	65	2.31	2.24	2.18	2.12	2.13	2.01	1.96	1.89	1.78	1.76
	75	2.46	2.38	2.32	2.25	2.25	2.05	2.00	1.93	1.82	1.79
	90	2.82	2.67	2.57	2.46	2.45	1.99	1.93	1.85	1.75	1.69
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	0歳	1.24	1.21	1.19	1.19	1.19	1.27	1.21	1.22	1.23	1.24
	65	1.20	1.14	1.12	1.12	1.11	1.29	1.23	1.25	1.25	1.26
	75	1.13	1.08	1.05	1.05	1.03	1.24	1.17	1.20	1.21	1.21
	90	0.91	0.85	0.86	0.81	0.79	0.91	0.83	0.84	0.88	0.86
肝 疾 患	0歳	1.39	1.43	1.40	1.41	1.37	0.77	0.77	0.76	0.77	0.77
	65	0.97	1.00	0.98	0.99	0.98	0.67	0.65	0.65	0.65	0.66
	75	0.71	0.72	0.70	0.71	0.70	0.58	0.57	0.56	0.56	0.57
	90	0.32	0.35	0.32	0.33	0.33	0.30	0.28	0.29	0.29	0.28
糖 尿 病	0歳	1.01	1.07	1.03	1.00	0.99	0.86	0.86	0.84	0.77	0.74
	65	0.96	1.02	0.99	0.95	0.93	0.87	0.87	0.84	0.77	0.74
	75	0.89	0.94	0.91	0.87	0.85	0.85	0.86	0.82	0.76	0.73
	90	0.64	0.66	0.63	0.60	0.59	0.67	0.66	0.66	0.59	0.56
高 血 圧 性 疾 患	0歳	0.60	0.64	0.63	0.64	0.66	0.91	0.90	0.87	0.86	0.84
	65	0.60	0.64	0.63	0.64	0.65	0.95	0.94	0.90	0.90	0.87
	75	0.60	0.63	0.62	0.63	0.62	0.99	0.97	0.94	0.93	0.90
	90	0.72	0.76	0.74	0.73	0.68	1.13	1.12	1.07	1.04	0.98
結 核	0歳	0.16	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08
	65	0.17	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.09	0.09	0.08	0.08
	75	0.19	0.16	0.15	0.13	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.08
	90	0.25	0.20	0.19	0.17	0.17	0.12	0.09	0.08	0.08	0.08
新型コロナウイルス感染症 (C O V I D - 1 9)	0歳	1.27	3.28	2.64	2.58	1.56	0.95	3.03	2.37	2.01	1.24
	65	1.21	3.50	2.84	2.79	1.68	0.96	3.14	2.46	2.09	1.29
	75	1.18	3.76	3.05	3.02	1.84	0.95	3.26	2.54	2.16	1.34
	90	1.01	4.45	3.65	3.54	2.22	0.77	3.67	2.79	2.34	1.46
老 衰	0歳	7.41	7.45	7.93	8.39	9.02	18.80	18.68	19.61	20.75	21.74
	65	8.25	8.31	8.85	9.36	10.02	19.88	19.79	20.77	21.99	23.00
	75	9.63	9.73	10.36	10.95	11.66	21.23	21.18	22.22	23.52	24.57
	90	17.61	17.91	18.79	19.87	20.69	29.34	29.51	30.64	32.31	33.53
悪性新生物<腫瘍>、 心疾患(高血圧性を除く) 及び脳血管疾患 (再掲)	0歳	48.90	47.12	46.47	45.41	45.03	43.52	42.10	41.26	40.29	39.70
	65	48.82	46.95	46.32	45.20	44.88	42.59	41.08	40.27	39.27	38.67
	75	46.34	44.45	43.83	42.74	42.59	40.98	39.37	38.56	37.57	36.99
	90	38.19	36.04	35.29	34.41	34.39	35.18	33.33	32.57	31.54	31.02

注：令和3年の新型コロナウイルス感染症には、新型コロナワクチンの副反応を原死因としたものを含めて計上している。

参考資料 3-2 特定死因を除去した場合の平均余命の延びの推移

(単位：年)											
除去する死因	年齢	男					女				
		令和3年	4年	5年	6年	7年	令和3年	4年	5年	6年	7年
悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	0歳	3.43	3.19	3.16	3.11	3.07	2.81	2.74	2.69	2.68	2.66
	65	2.83	2.62	2.61	2.57	2.56	1.97	1.89	1.87	1.87	1.87
	75	1.95	1.80	1.80	1.79	1.81	1.37	1.29	1.28	1.29	1.30
	90	0.57	0.50	0.50	0.50	0.53	0.42	0.37	0.37	0.37	0.38
心 疾 患 (高 血 圧 性 を 除 く)	0歳	1.42	1.41	1.42	1.37	1.36	1.23	1.19	1.17	1.12	1.08
	65	1.10	1.09	1.09	1.06	1.06	1.16	1.11	1.09	1.04	1.01
	75	0.92	0.89	0.89	0.86	0.86	1.09	1.04	1.02	0.97	0.94
	90	0.60	0.54	0.55	0.52	0.53	0.77	0.71	0.69	0.65	0.64
脳 血 管 疾 患	0歳	0.69	0.66	0.65	0.64	0.64	0.62	0.58	0.57	0.55	0.55
	65	0.53	0.50	0.49	0.47	0.47	0.54	0.50	0.49	0.47	0.46
	75	0.44	0.40	0.39	0.37	0.37	0.48	0.45	0.43	0.41	0.41
	90	0.21	0.18	0.17	0.17	0.17	0.29	0.25	0.24	0.23	0.22
肺 炎	0歳	0.43	0.38	0.39	0.42	0.45	0.29	0.26	0.27	0.29	0.30
	65	0.43	0.38	0.39	0.41	0.44	0.29	0.26	0.27	0.28	0.30
	75	0.42	0.37	0.38	0.39	0.42	0.29	0.25	0.26	0.27	0.28
	90	0.31	0.26	0.26	0.27	0.29	0.20	0.18	0.18	0.18	0.19
不 慮 の 事 故	0歳	0.37	0.38	0.40	0.39	0.39	0.23	0.25	0.25	0.26	0.26
	65	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18
	75	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
	90	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
交通事故(再掲)	0歳	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	65	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	75	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自 殺	0歳	0.58	0.60	0.60	0.56	0.55	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32
	65	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
	75	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	90	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 (C O P D)	0歳	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	65	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	75	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	90	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
腎 不 全	0歳	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12
	65	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
	75	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
	90	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	0歳	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
	65	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11
	75	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
	90	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
肝 疾 患	0歳	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
	65	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	75	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	90	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
糖 尿 病	0歳	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
	65	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
	75	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	90	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
高 血 圧 性 疾 患	0歳	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	65	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	75	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	90	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
結 核	0歳	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	65	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	75	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	90	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型コロナウイルス感染症 (C O V I D - 1 9)	0歳	0.14	0.24	0.19	0.18	0.11	0.09	0.20	0.16	0.13	0.08
	65	0.10	0.22	0.18	0.18	0.10	0.07	0.18	0.15	0.12	0.08
	75	0.07	0.21	0.17	0.17	0.10	0.06	0.17	0.14	0.12	0.07
	90	0.03	0.14	0.11	0.11	0.07	0.03	0.13	0.10	0.08	0.05
老 衰	0歳	0.36	0.36	0.39	0.42	0.47	1.08	1.04	1.11	1.19	1.25
	65	0.40	0.40	0.44	0.47	0.52	1.14	1.10	1.18	1.26	1.32
	75	0.46	0.45	0.50	0.53	0.59	1.21	1.17	1.25	1.33	1.40
	90	0.64	0.61	0.66	0.71	0.77	1.44	1.35	1.43	1.51	1.56
悪性新生物<腫瘍>、 心疾患(高血圧性を除く) 及び脳血管疾患	0歳	6.49	6.11	6.06	5.90	5.84	5.28	5.07	4.96	4.86	4.77
	65	5.32	4.97	4.93	4.79	4.77	4.24	4.01	3.93	3.83	3.77
	75	4.01	3.70	3.67	3.57	3.60	3.44	3.22	3.15	3.06	3.02
	90	1.70	1.48	1.47	1.42	1.47	1.75	1.55	1.51	1.44	1.42

注：1) 令和3年の新型コロナウイルス感染症には、新型コロナワクチンの副反応を原死因としたものを含めて計上している。
2) 「悪性新生物<腫瘍>、心疾患(高血圧性を除く。以下同じ。)&及び脳血管疾患」の数値は、以下の理由により「悪性新生物<腫瘍>」、「心疾患」及び「脳血管疾患」のそれぞれを合計した数値にはならない。
○「悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患」の数値：3つの死因を同時に除去していることから、3つのどの死因による死亡も発生しないものとして延びが計算される。
○「悪性新生物<腫瘍>」「心疾患」「脳血管疾患」それぞれの数値：単独に死因を除去し、他の2つの死因を除去していないことから、当該2つの死因による死亡が発生するものとして延びが計算される。

除去する死因	左記特定死因を除去した場合におけるその死因で死亡していた者の死亡状況
悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>以外で亡くなる(心疾患・脳血管疾患でも亡くなる)
心 疾 患	心疾患以外で亡くなる(悪性新生物<腫瘍>・脳血管疾患でも亡くなる)
脳血管疾患	脳血管疾患以外で亡くなる(悪性新生物<腫瘍>・心疾患でも亡くなる)
悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患	悪性新生物<腫瘍>、心疾患及び脳血管疾患以外で亡くなる