

# 3

## 使用上の注意の改訂について (その211)

平成21年10月27日に改訂を指導した医薬品の使用上の注意（本号の「2 重要な副作用等に関する情報」で紹介したものをお除く。）について、改訂内容、主な該当販売名等をお知らせいたします。

1 〈解熱鎮痛消炎剤〉

### 1 インドメタシン（経口剤）

[販売名] インテバンSP25, 同SP37.5 (大日本住友製薬) 他

[副作用  
(重大な副作用)] 消化管穿孔, 消化管出血, 消化管潰瘍, 腸管の狭窄・閉塞, 潰瘍性大腸炎

2 〈解熱鎮痛消炎剤〉

### 2 インドメタシン（坐剤）

[販売名] インテバン坐剤25, 同坐剤50 (大日本住友製薬) 他

[副作用  
(重大な副作用)] 消化管穿孔, 消化管出血, 消化管潰瘍, 腸管の狭窄・閉塞, 潰瘍性大腸炎

3 〈解熱鎮痛消炎剤〉

### 3 インドメタシンファルネシリ

[販売名] インフリーカプセル100mg, 同Sカプセル200mg (エーザイ)

[副作用  
(重大な副作用)] 消化管穿孔, 消化管出血, 消化管潰瘍, 出血性大腸炎, 腸管の狭窄・閉塞, 潰瘍性大腸炎 :  
消化管穿孔, 消化管出血, 消化管潰瘍, 出血性大腸炎, 腸管の狭窄及び閉塞があらわれるこ  
とがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。  
なお、本剤の活性代謝物であるインドメタシンで、潰瘍性大腸炎があらわれたとの報告があ  
る。

4 〈解熱鎮痛消炎剤〉

### 4 プログルメタシンマレイン酸塩

[販売名] ミリダシン錠90mg (大鵬薬品工業)

[副作用  
(重大な副作用)] 消化管穿孔, 消化管出血, 消化管潰瘍 : 消化管穿孔, 消化管出血, 消化管潰瘍があらわれる  
ことがあるので、このような症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を  
を行うこと。

[重大な副作用  
(活性代謝物)] 腸管の狭窄・閉塞, 潰瘍性大腸炎

〈血圧降下剤〉

## 5 リシノプリル水和物

[販売名] ゼストリル錠5, 同錠10, 同錠20 (アストラゼネカ), ロンゲス錠5mg, 同錠10mg, 同錠20mg (塩野義製薬) 他

[副作用  
(重大な副作用)] 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) : 低ナトリウム血症, 低浸透圧血症, 尿中ナトリウム排泄量の増加, 高張尿, 痉攣, 意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) があらわれることがあるので, このような場合には投与を中止し, 水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。

〈その他の循環器官用薬〉

## 6 炭酸ランタン水和物

[販売名] ホスレノールチュアブル錠250mg, 同錠500mg (バイエル薬品)

[用法・用量に関する使用上の注意] 本剤は嚥み碎かずに服用すると溶けにくいので, 口内で十分に嚥み碎き, 唾液又は少量の水で飲み込むよう指導すること。なお, 嚥み碎くことが困難な患者 (高齢者等) には, 本剤を粉碎して投与することが望ましい。

[適用上の注意] 服用時 : 本剤は口中で十分に嚥み碎いて服用させること。

〈血液凝固阻止剤〉

## 7 パルナパリンナトリウム

[販売名] ローヘパ透析用100単位/mLシリソジ20mL, 同透析用150単位/mLシリソジ20mL, 同透析用200単位/mLシリソジ20mL, 同透析用500単位/mLバイアル10mL (味の素) 他

[副作用  
(重大な副作用)] ショック, アナフィラキシー様症状 : ショック, アナフィラキシー様症状があらわれがあるので, 観察を十分に行い, 血圧低下, 意識低下, 呼吸困難, チアノーゼ, 莽麻疹等の異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

〈抗ウイルス剤〉

## 8 ザナミビル水和物

[販売名] リレンザ (グラクソ・スミスクライン)

[副作用  
(重大な副作用)] 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群), 中毒性表皮壊死症 (Lyell症候群もしくは toxic epidermal necrolysis : TEN), 多形紅斑 : 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群), 中毒性表皮壊死症 (Lyell症候群・TEN), 多形紅斑等の重篤な皮膚障害があらわれがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。